

バップフォーレディ セルフチェックシート

初回購入用

バップフォーレディは、女性における尿意切迫感(急におしっこがしたくなり、もれそうになる感じ)及びそれを伴う頻尿(尿の回数が多い)、尿もれを改善するお薬です。

お薬を購入する前に以下のチェック項目を確認し、薬剤師にお渡しください。不明な点がある場合は薬剤師にご相談ください。

該当項目にチェック☑をしてください。

- 女性である
- 15～69歳である
- 尿意切迫感(急におしっこがしたくなり、もれそうになる感じ)がある

↓ 全ての項目に**該当する**

- 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある
- 妊婦である、又は妊娠していると思われる
- 排尿困難、尿閉(尿意があるのに排尿しづらい、できない状態)の症状がある
- 血尿、排尿痛、膀胱痛の症状がある
- 胃アトニー(胃下垂に伴う胃のはたらきの低下)、腸アトニー(腸の運動低下)の診断を受けている
- 幽門・腸管の閉塞の診断を受けている
- パーキンソン病、脳血管障害(脳梗塞、脳出血等)の診断を受けている
- 緑内障、認知症、重症筋無力症、重篤な心疾患の診断を受けている

↓ 該当する**項目がない**

- 医師の治療を受けている
- 年齢が65歳以上(高齢者)である
- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある
- 頻尿や尿もれの症状が発症後1ヵ月以内である
- 夜間頻尿のみで日中には頻尿がない
- 不整脈、肝機能障害、腎障害、潰瘍性大腸炎、甲状腺機能亢進症の診断を受けている
- 排尿困難、尿閉、血尿、排尿痛、膀胱痛の症状が起きたことがある(現在はこれら症状がない)
- 子宮癌、直腸癌等の骨盤内手術を受けたことがある
- 現在、下記のお薬を服用中である
胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する胃腸薬、乗物酔い薬、
鼻炎用内服薬、かぜ薬

↓ 該当する**項目がない**

→
該当しない
項目が**1つ**
でもある

本剤を服用することはできません。

→
1項目でも
該当する

本剤を服用することはできません。

→
1項目でも
該当する

本剤が服用できない場合があるため、医師又は薬剤師にご相談ください。

バップフォーレディを服用できます。

バップフォーレディを服用するにあたり、薬剤師からの説明を受け、お薬に添付されている説明書を必ずお読みください。本剤を服用中、胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する胃腸薬、乗物酔い薬、鼻炎用内服薬、かぜ薬と併用はしないでください。また、服用後、乗物又は機械類の運転操作はしないでください。授乳中の人は服用しないか、服用中は授乳を避けてください。

◆服用後、何か気になることがある場合は、医師又は薬剤師にご相談ください。