TAIHO 大鵬薬品

# 添付文書・説明文書集

# 目次


## 総 製品総覧 1～3

## Ⅰ 第 1 類医薬品
バップフォーレディ …… Ⅰ-1

## Ⅱ 第2類医薬品
ハルンケア内服液 …… Ⅱ-1
ハルンケア顆粒 …… Ⅱ-5
ソルマック　キュアールD …… Ⅱ-9

## Ⅲ 第 2 類医薬品
チオビタゴールド …… Ⅲ-1
ソルマックプラス …… Ⅲ-4
ハルンケア　ベアベリー錠 …… Ⅲ-7
ゼノールエクサムFX …… Ⅲ-10
ゼノールエクサムSX …… Ⅲ-13
ゼノールエクサム液ゲル …… Ⅲ-16
ゼノールジクロダイレクトR …… Ⅲ-19
ウレパールプラスクリーム …… Ⅲ-22
ウレパールプラスローション10 …… Ⅲ-26
扁　鵲 …… Ⅲ-30
肝　生 …… Ⅲ-34
ピタスせきトローチ …… Ⅲ-38

## Ⅳ 第 3 類医薬品
チオビタドリンクアイビタス …… Ⅳ-1
チオビタドリンクアイビタスゼロ …… Ⅳ-4
ゼノールチックE …… Ⅳ-7

## Ⅴ 指定医薬部外品
チオビタ・ドリンク …… Ⅴ-1
チオビタドリンク2000 …… Ⅴ-3
ソルマック胃腸液プラスR …… Ⅴ-5
ソルマック5 …… Ⅴ-7
ピタスのどトローチ …… Ⅴ-9
ピタスのどトローチO …… Ⅴ-11
ピタスのどトローチL …… Ⅴ-13
ピタスクールトローチS …… Ⅴ-15
ピタスメディカルトローチ …… Ⅴ-17


2026年9月作成

## Ⅵ 雑貨

Efil（エフィル） …… Ⅵ-1

## Ⅶ 特定先用

チオビタドリンクブイスーパー …… Ⅶ-1
チオビタドリンク2000 …… Ⅶ-4
チオビタドリンク3000 …… Ⅶ-6
チオビタドリンク3000ZERO …… Ⅶ-8
チオビタドリンク3000ZERO …… Ⅶ-10

# 製品総覧

## 一般用医薬品

### 第1類医薬品




バップフォーレディ

Ⅰ-1 ページ

### 第2類医薬品




ハルンケア内服液

Ⅱ-1 ページ




ハルンケア顆粒

Ⅱ-5 ページ




ソルマック キュアールD

Ⅱ-9 ページ

### 第2類医薬品




チオビタゴールド

Ⅲ-1 ページ




ソルマックプラス

Ⅲ-4 ページ




ハルンケア
ベアベリー錠

Ⅲ-7 ページ




ゼノール
エクサムFX

Ⅲ-10 ページ




ゼノール
エクサムSX

Ⅲ-13 ページ




ゼノール
エクサム液ゲル

Ⅲ-16 ページ




ゼノール
ジクロダイレクトR

Ⅲ-19 ページ




ウレパール
プラスクリーム

Ⅲ-22 ページ




ウレパール
プラスローション10

Ⅲ-26 ページ




扁鵲

Ⅲ-30 ページ



2026年9月作成

## 一般用医薬品

### 第2類医薬品



肝生

Ⅲ-34 ページ



ピタスせきトローチ

Ⅲ-38 ページ

### 第3類医薬品



チオビタドリンク
アイビタス

Ⅳ-1 ページ



チオビタドリンク
アイビタスゼロ

Ⅳ-4 ページ



ゼノールチックE

Ⅳ-7 ページ

## 指定医薬部外品



チオビタ・ドリンク

V-1 ページ



チオビタドリンク
2000

V-3 ページ



ソルマック
胃腸液プラスR

V-5 ページ



ソルマック5

V-7 ページ



ピタスのどトローチ

V-9 ページ



ピタスのどトローチO

V-11 ページ



ピタスのどトローチL

V-13 ページ



ピタス
クールトローチS

V-15 ページ



ピタス
メディカルトローチ

V-17 ページ



2026年9月作成

## 雑貨




Efil エフィル

Ⅵ-1 ページ

## 特定先用

### 第3類医薬品




チオビタドリンク
ブイスーパー

Ⅶ-1 ページ

### 指定医薬部外品




チオビタドリンク
2000

Ⅶ-4 ページ




チオビタドリンク
3000

Ⅶ-6 ページ




チオビタドリンク
3000ZERO

Ⅶ-8 ページ




チオビタドリンク
3000ZERO

Ⅶ-10 ページ



2026年9月作成

# Ⅰ

# 第１類 医 薬 品

添付文書・説明文書集

TAIHO 大鵬薬品

## 女性用の過活動膀胱治療薬

# 販売名：バップフォーレディ

### ●1箱（7錠）




| 包　　装 | 1箱（7錠） | 梱（7錠×5×12） |
|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 65×138×21 | 337×288×148 |
| 重量（g） | 18 | 1,364 |
| 使用期限 | 3年 | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 2,500円 | 150,000円 |
| JANコード | 4987117 614008 | 4987117 614015 |
| ITFコード | — | 1 4987117 614012 |

### 参考画像




PTPシート




錠剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ（単位：mm）



2026年9月作成

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

商品情報はこちら↑

女性用の過活動膀胱治療薬

第１類医薬品

# バップフォーレディ®

## 日本薬局方　プロピベリン塩酸塩錠

### 製品の特徴

バップフォーレディは、膀胱の異常収縮を抑制することで、尿意切迫感、尿意切迫感を伴う頻尿や尿もれを改善する女性専用のお薬です。これら過活動膀胱症状によって低下した日常生活を向上することができます。

### ⚠ 使用上の注意

#### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. **次の人は服用しないでください。**
   (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
   (2) 男性
   (3) 70歳以上の女性
   (4) 15歳未満の小児
   (5) 妊婦又は妊娠していると思われる人
   (6) 次の症状のある人
   ・排尿困難、尿閉（尿意があるのに排尿しづらい、できない状態）
   ・血尿、排尿痛、膀胱痛
   (7) 医療機関にて次の診断を受けた人
   ・胃アトニー（胃下垂に伴う胃のはたらきの低下）、腸アトニー（腸の運動低下）
   ・幽門・腸管の閉塞
   ・パーキンソン病、脳血管障害（脳梗塞、脳出血等）
   ・緑内障、認知症、重症筋無力症、重篤な心疾患
2. **本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。**
   胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する胃腸薬、乗物酔い薬、鼻炎用内服薬、かぜ薬
3. **服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。**
   （眠気、目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります）
4. **授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。**
5. **長期連用しないでください。**

#### 相談すること

1. **次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。**
   (1) 医師の治療を受けている人
   (2) 高齢者（65歳以上）
   (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
   (4) 次の症状のある人
   ・頻尿や尿もれの症状が急性（発症後1ヵ月以内）
   ・夜間頻尿のみで日中には頻尿がない人
   (5) 不整脈、肝機能障害、腎障害、潰瘍性大腸炎、甲状腺機能亢進症の診断を受けた人
   (6) 排尿困難、尿閉、血尿、排尿痛又は膀胱痛の症状を起こしたことがある人（現在も症状がある人は服用できません）
   (7) 子宮癌、直腸癌等の骨盤内手術を受けたことがある人
2. **服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。**

| 関係部位 | 症　状 |
|---|---|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ、じんましん |
| 消化器 | 食欲不振、吐き気・嘔吐、腹痛、消化不良、口内炎 |
| 精神神経系 | 頭痛、めまい、脱力感、しびれ、足がすくむ、歩幅がせまくなる、手足の震え、意識の低下、見当識障害 |
| 循環器 | 動悸、胸の苦しさ、血圧上昇、脈のみだれ |
| 泌尿器 | 排尿困難、残尿感 |
| その他 | 舌のもつれ、舌の痛み、のどの痛み、しわがれ声、味覚異常、痰のからみ、腰痛、目のかわき、異常なまぶしさ、むくみ、からだがだるい |

3. **服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師の診療を受けてください。**

| 症状の名称 | 症　状 |
|---|---|
| 尿閉（にょうへい） | 尿意があるのに排尿できない状態で、痛みを伴う。 |

（裏面へつづく）

| 症状の名称 | 症　状 |
|---|---|
| 幻覚、せん妄 | 実際にはないものが存在するように感じる、注意力、認識力、認知機能の低下等があらわれる。 |
| 急性緑内障発作 | 急激な吐き気、頭痛を伴う眼の痛み、目がみにくい等があらわれる。 |
| 麻痺性イレウス<br>(腸閉塞様症状) | 激しい腹痛、ガス排出(おなら)の停止、嘔吐、腹部膨満感を伴う著しい便秘があらわれる。 |
| 横紋筋融解症(おうもんきんゆうかいしょう) | 手足・肩・腰等の筋肉が痛む、手足がしびれる、力が入らない、こわばる、全身がだるい、赤褐色尿等があらわれる。 |
| 腎 障 害 | 発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。 |
| 肝 機 能 障 害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |
| 血 小 板 減 少 | 血液中の成分である血小板の数が減ることにより、鼻血、歯ぐきからの出血、青あざ等の出血症状があらわれる。 |
| 皮 膚 粘 膜 眼 症 候 群<br>(スティーブンス・<br>ジョンソン症候群) | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。 |
| QT延長、心室性頻拍 | めまい、動悸、胸が痛む、心拍数の増加、意識がなくなる等の症状があらわれる。 |

**4. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。**
口のかわき、便秘、下痢、眠気、目のかすみ、一時的な物忘れ

**5. 2週間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。**

## 効能・効果

尿意切迫感(急に尿がしたいとの我慢し難い訴え)、尿意切迫感を伴う頻尿(尿の回数が多い)・尿もれ

## 用法・用量

成人女性(15歳以上70歳未満)、1回1錠を1日1回食後に服用してください。

| 年　　齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|---|---|---|
| 成人女性(15歳以上、70歳未満) | 1錠 | 1回 |
| 成人女性(70歳以上) | 服用しないでください | |
| 成人男性(15歳以上) | | |
| 小　　児(15歳未満) | | |

**〈用法・用量に関連する注意〉**
(1)用法・用量を厳守してください。
(2)毎回 同じ時間帯に服用してください。
(3)錠剤の取り出し方：
錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)。




## 成分・分量

1錠中

| 成分 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| プロピベリン塩酸塩 | 10mg | 尿意切迫感の原因となる膀胱の異常な収縮を抑え、尿意切迫感、頻尿(尿の回数が多い)及び尿もれを改善します |

添加物
乳糖水和物、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルスターチ、カルメロースCa、ヒプロメロース、タルク、
マクロゴール6000、酸化チタン、ステアリン酸Mg、カルナウバロウ

## 保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わったりします)。
(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

## お問い合わせ先

お問い合わせはお買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
連絡先　大鵬薬品工業株式会社　お客様相談室
〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27
電話番号　0120-4527-66
受付時間　9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元：TAIHO 大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27

BL251003

バップフォーレディ

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第1類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 名　　称 | バップフォーレディ |
| 2 | 成分・分量 | 1錠中<br>プロピベリン塩酸塩 …… 10mg |
| 3 | 用法・用量 | 成人女性（15歳以上70歳未満）、1回1錠を1日1回食後に服用してください。 |
| 4 | 効能･効果 | 尿意切迫感（急に尿がしたいとの我慢し難い訴え）、<br>尿意切迫感を伴う頻尿（尿の回数が多い）・尿もれ |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために必要な事項 | 1.次の人は使用しないでください。<br>(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人<br>(2) 男性<br>(3)70歳以上の女性<br>(4)15歳未満の小児<br>(5) 妊婦又は妊娠していると思われる人<br>(6) 次の症状のある人<br>・排尿困難、尿閉（尿意があるのに排尿しづらい、できない状態）<br>・血尿、排尿痛、膀胱痛<br>(7) 医療機関にて次の診断を受けた人<br>・胃アトニー（胃下垂に伴う胃のはたらきの低下）、腸アトニー（腸の運動低下）<br>・幽門・腸管の閉塞<br>・パーキンソン病、脳血管障害（脳梗塞、脳出血等）<br>・緑内障、認知症、重症筋無力症、重篤な心疾患<br>2.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。<br>胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する胃腸薬、乗物酔い薬、鼻炎用内服薬、かぜ薬<br>3.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。<br>（眠気、目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります）<br>4.授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。<br>5.長期連用しないでください。<br><br>次に該当する人はお申し出ください。<br>(1) 医師の治療を受けている人<br>(2) 高齢者（65歳以上）<br>(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人<br>(4) 次の症状のある人<br>・頻尿や尿もれの症状が急性（発症後1ヵ月以内）<br>・夜間頻尿のみで日中には頻尿がない人<br>(5) 不整脈、肝機能障害、腎障害、潰瘍性大腸炎、甲状腺機能亢進症の診断を受けた人<br>(6) 排尿困難、尿閉、血尿、排尿痛又は膀胱痛の症状を起こしたことがある人<br>（現在も症状がある人は服用できません）<br>(7) 子宮癌、直腸癌等の骨盤内手術を受けたことがある人 |



2026年9月作成

| | | |
|---|---|---|
| 6 | 薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項 | |

［注意事項］

1.本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。

2.法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。

3.使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。



2026年9月作成

# Ⅱ

# 第2類医薬品

添付文書・説明文書集

大鵬薬品

## 生薬製剤／軽い尿もれ・頻尿用薬

# 販売名: ハルンケア内服液

### ●1箱（30mL×2本）




| 包　　装 | 1箱（30mL×2本） | 梱［（30mL×2本）×40箱］ |
|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 33×62×93 | 262×354×100 |
| 重量（g） | 176 | 7300 |
| 使用期限 | 3年 | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 1,012円 | 40,480円 |
| JANコード | 4987117 612028 | 4987117 612042 |
| ITFコード | — | 1 4987117 612049 |

### ●1箱（30mL×10本）




| 包　　装 | 1箱（30mL×10本） | 梱［（30mL×10本）×10箱］ |
|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 62×154×93 | 325×320×100 |
| 重量（g） | 867 | 8900 |
| 使用期限 | 3年 | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 4,807円 | 48,070円 |
| JANコード | 4987117 612219 | 4987117 612226 |
| ITFコード | — | 1 4987117 612223 |

### 参考画像




30mL×1本



内服液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ（単位：mm）



2026年9月作成

2019

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

生薬製剤　軽い尿もれ・頻尿用薬　第2類医薬品

# ハルンケア® Harncare 内服液



## ■特徴

1. 8種類の生薬(ジオウ、タクシャ、ボタンピ、ブクリョウ、サンシュユ、サンヤク、ケイヒ、炮附子)から抽出・濃縮し、更にエタノールを加え、澱粉等を分離除去した後、エタノールを蒸発除去して製したエキスを含有する生薬製剤です。
2. 体力の低下、下半身の衰え、手足の冷えを伴う方の“軽い尿もれ”、“頻尿(小便の回数が多い)”、“残尿感”、“尿が出渋る”の症状を緩和します。
3. 服用しやすい液剤です。

## 使用上の注意

### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。

(1) 胃腸の弱い人
(2) 下痢しやすい人
(3) 次の症状のある人
- 脊髄損傷や認知症等により、「尿がもれたことに気が付かない」
- 前立腺肥大症等により、「少量ずつ常に尿がもれる」

### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人
(4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
(5) 漢方製剤等を服用している人(含有生薬の重複に注意する)

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症　状 |
|---|---|
| 皮　膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、下痢、腹痛、便秘 |
| 精神神経系 | 頭痛、めまい |
| 循環器 | 動悸 |
| 呼吸器 | 息切れ |
| 泌尿器 | 尿閉 |
| その他 | のぼせ、悪寒、浮腫、口唇・舌のしびれ |

3. 14日間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(裏面につづく)

## ■効能・効果

体力の低下、下半身の衰え、手足の冷えを伴う次の症状の緩和
●軽い尿もれ　●頻尿（小便の回数が多い）　●残尿感　●尿が出渋る

## ■用法・用量

次の量を朝夕食前又は食間[注)]に服用してください。

| 年　齢 | 成人（15歳以上） | 小児（15歳未満） |
|---|---|---|
| 1回量 | 1本（30mL） | 服用しないでください。 |
| 1日服用回数 | 2回 | |

注）食間とは食事と食事の間という意味で、食後約2時間のことです。
●定められた用法・用量を厳守してください。

## ■成分・分量

1日量2本（60mL）中：

生薬エキスH……11mL

（ジオウ　…5g　ブクリョウ　…3g　ケイヒ　…1g
タクシャ　…3g　サンシュユ　…3g　炮附子　…1g
ボタンピ　…3g　サンヤク　…3g　より抽出）

添加物としてグリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、pH調整剤、トウモロコシデンプン、香料を含有します。

◆本剤は生薬成分を含むため、経時的に沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用してください。

## ■保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないでください（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）。
(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱及びラベルに記載しています。

## ■包装

1箱　2本（30mL×　2本）入り
1箱10本（30mL×10本）入り

## ■お問い合わせ先

お問い合わせはお買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

連絡先　**大鵬薬品工業株式会社　お客様相談室**
〒101-8444　東京都千代田区神田錦町1-27
電話番号：0120-4527-66
受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元　TAIHO　大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27

Ⓡ登録商標

YM19H09
2019

## ハルンケア内服液

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 名　　称 | ハルンケア内服液 |
| 2 | 成分・分量 | 1日量2本（60mL）中　生薬エキス　11mL<br>ジオウ …… 5g<br>タクシャ …… 3g<br>ボタンピ …… 3g<br>ブクリョウ…… 3g<br>サンシュユ …… 3g<br>サンヤク …… 3g<br>ケイヒ …… 1g<br>炮附子…… 1g　より抽出 |
| 3 | 用法・用量 | 次の量を朝夕食前又は食間に服用してください<br>年　　齢 / 成人（15歳以上） / 小児（15歳未満）<br>1　回　量 / 1本（30mL） / 服用しないでください<br>1日服用回数 / 2回 |
| 4 | 効能･効果 | 体力の低下、下半身の衰え、手足の冷えを伴う次の症状を緩和します<br>軽い尿もれ、頻尿（小便の回数が多い）、残尿感、尿が出渋る |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために必要な事項 | 次の人は服用しないでください<br>(1) 胃腸の弱い人<br>(2) 下痢しやすい人<br>(3) 次の症状のある人<br>・脊髄損傷や認知症等により、「尿がもれたことに気が付かない」<br>・前立腺肥大症等により、「少量ずつ常に尿がもれる」<br>次に該当する人はお申し出ください<br>・医師の治療を受けている人<br>・妊婦又は妊娠していると思われる人<br>・のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人<br>・今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人<br>・漢方製剤等を服用している人（含有生薬の重複に注意する） |
| 6 | 薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項 | |

［注意事項］

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。



2026年9月作成

## 生薬製剤／軽い尿もれ・頻尿用薬

# 販売名：ハルンケア顆粒

### ●1箱（2.5g×6包）




| 包　　装 | 1箱（2.5g×6包） | 梱［（2.5g×6包）×20］ |
|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 28×62×115 | 133×296×128 |
| 重量（g） | 34.8 | 800 |
| 使用期限 | 3年 | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 2,277円 | 45,540円 |
| JANコード | 4987117 612813 | 4987117 612912 |
| ITFコード | — | 1 4987117 612810 |

### ●1箱（2.5g×10包）




| 包　　装 | 1箱（2.5g×10包） | 梱［（2.5g×10包）×20］ |
|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 28× 90×115 | 190×308×130 |
| 重量（g） | 51.7 | 1272 |
| 使用期限 | 3年 | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 3,427円 | 68,540円 |
| JANコード | 4987117 612820 | 4987117 612929 |
| ITFコード | — | 1 4987117 612827 |

### 参考画像




2.5g×1包



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ（単位：mm）



2026年9月作成

586012

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

生薬製剤　軽い尿もれ・頻尿用薬　第2類医薬品

# ハルンケア® Harncare 顆粒



## ■ ハルンケア顆粒の特徴

1. ハルンケアの顆粒剤です。
2. チョコレート風味で、苦みも少なく、お薬の味が苦手な方にもおすすめ出来ます。
3. スティックタイプの顆粒剤で、携帯（旅行やお出かけ）に便利です。
4. 8種類の生薬（ジオウ、タクシャ、ボタンピ、ブクリョウ、サンシュユ、サンヤク、ケイヒ、炮附子）から抽出・濃縮し、更にエタノールを加え、澱粉等を分離除去した後、エタノールを蒸発除去して製したエキスを含有する生薬製剤です。
5. 体力の低下、下半身の衰え、手足の冷えを伴う方の“軽い尿もれ”、“頻尿（小便の回数が多い）”、“残尿感”、“尿が出渋る”の症状を緩和します。

## 使用上の注意

### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の人は服用しないでください。

（1）胃腸の弱い人
（2）下痢しやすい人
（3）次の症状のある人
- 脊髄損傷や認知症等により、「尿がもれたことに気が付かない」
- 前立腺肥大症等により、「少量ずつ常に尿がもれる」

### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
   （1）医師の治療を受けている人
   （2）妊婦又は妊娠していると思われる人
   （3）のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人
   （4）今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
   （5）漢方製剤等を服用している人（含有生薬の重複に注意する）
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症　状 |
|---|---|
| 皮　膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、下痢、腹痛、便秘 |
| 精神神経系 | 頭痛、めまい |
| 循環器 | 動悸 |
| 呼吸器 | 息切れ |
| 泌尿器 | 尿閉 |
| その他 | のぼせ、悪寒、浮腫、口唇・舌のしびれ |

3. 14日間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

（裏面につづく）

## ■ 効能・効果

体力の低下、下半身の衰え、手足の冷えを伴う次の症状の緩和
●軽い尿もれ　●頻尿（小便の回数が多い）　●残尿感　●尿が出渋る

## ■ 用法・用量

次の量を朝夕食前又は食間[注]に水又はお湯で服用してください。

| 年　齢 | 成人（15歳以上） | 小児（15歳未満） |
|---|---|---|
| 1回量 | 1包（2.5g） | 服用しないでください。 |
| 1日服用回数 | 2回 | |

注）食間とは食事と食事の間という意味で、食後約2時間のことです。
●定められた用法・用量を厳守してください。

**服用方法**
（1）スティックを立て、切り口より切り取ったのち、服用してください。
（2）切り取り部分で唇を切らないようにご注意ください。



## ■ 成分・分量

1日量2包（5.0g）中：
生薬エキスH…11mL
（ジオウ5g、タクシャ3g、ボタンピ3g、ブクリョウ3g、サンシュユ3g、サンヤク3g、ケイヒ1g、炮附子1gより抽出）
添加物：ケイ酸カルシウム、スクラロース、バニリン、香料

## ■ 保管及び取扱い上の注意

（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
（2）小児の手の届かない所に保管してください。
（3）開封後の保存及び他の容器への入れ替えをしないでください（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）。
（4）使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱及びスティック包装に記載しています。

## ■ 包装

1箱 6包（2.5g×6包）入り
1箱10包（2.5g×10包）入り

## ■ お問い合わせ先

お問い合わせはお買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

連絡先　**大鵬薬品工業株式会社　お客様相談室**
〒101-8444　東京都千代田区神田錦町1-27
電話番号：0120-4527-66
受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

®登録商標
製造販売元　TAIHO　大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
YM19K02

## ハルンケア顆粒

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 名　　称 | ハルンケア顆粒 |
| 2 | 成分・分量 | 1日量2包（5.0g）中　生薬エキスH　11mL<br>ジオウ …… 5g<br>タクシャ …… 3g<br>ボタンピ …… 3g<br>ブクリョウ…… 3g<br>サンシュユ …… 3g<br>サンヤク …… 3g<br>ケイヒ …… 1g<br>炮附子…… 1g　より抽出 |
| 3 | 用法・用量 | 次の量を朝夕食前又は食間に水又はお湯で服用してください |
| 4 | 効能･効果 | 体力の低下、下半身の衰え、手足の冷えを伴う次の症状を緩和します<br>軽い尿もれ、頻尿（小便の回数が多い）、残尿感、尿が出渋る |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために必要な事項 | 次の人は服用しないでください<br>(1) 胃腸の弱い人<br>(2) 下痢しやすい人<br>(3) 次の症状のある人<br>・脊髄損傷や認知症等により、「尿がもれたことに気が付かない」<br>・前立腺肥大症等により、「少量ずつ常に尿がもれる」<br>次に該当する人はお申し出ください<br>・医師の治療を受けている人<br>・妊婦又は妊娠していると思われる人<br>・のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人<br>・今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人<br>・漢方製剤等を服用している人（含有生薬の重複に注意する） |
| 6 | 薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項 | |

| 年　　齢 | 成人（15歳以上） | 小児（15歳未満） |
|---|---|---|
| 1　回　量 | 1包（2.5g） | 服用しないでください |
| 1日服用回数 | 2回 | |

［注意事項］

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。



2026年9月作成

## 止瀉薬

# 販売名：ソルマック キュアールD

### ●1箱（12錠）




| 包　　装 | 1箱（12錠） | 中箱（12錠×10） | 梱（12錠×10×12） |
|---|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 20×110×71 | 114×214×75 | 225×485×242 |
| 重量（g） | 17.8 | 230 | 3,120 |
| 使用期限 | 3年 | | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 1,200円 | 12,000円 | 144,000円 |
| JANコード | 4987117 400311 | 4987117 400328 | 4987117 400335 |
| ITFコード | — | — | 1 4987 117 400318 |

### 参考画像




パッケージ裏面



PTPシート



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ（単位：mm）



2026年9月作成

2022年８月（作成）
SD220801
030504-0

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

止瀉薬

飲み過ぎ・食べ過ぎによる下痢に

# ソルマック® キュアールD

®登録商標

販売名：ソルマック キュアールD

## 〔特徴〕

★ロペラミド塩酸塩（止瀉薬）とビオヂアスターゼ2000（消化酵素）、ラクトミン（フェカリス菌）の３つの有効成分が下痢の症状にアプローチします。
★水なしで飲めるチュアブル錠のため、下痢で困ったそのときに、どこでも手軽に服用することができます。

## ⚠使用上の注意

### ⊗してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

**１．次の人は服用しないでください**
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

**２．本剤を服用している間は、次の医薬品を使用しないでください**
胃腸鎮痛鎮痙薬

**３．服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください**
（眠気等があらわれることがあります。）

**４．服用前後は飲酒しないでください**

### 相談すること

**１．次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
(3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・吐き気等の症状を伴う下痢のある人。
（本剤で無理に下痢を止めるとかえって病気を悪化させることがあります。）
(4) 便秘を避けなければならない肛門疾患等のある人。
（本剤の服用により便秘が発現することがあります。）
(5) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(6) 授乳中の人。
(7) 高齢者。
(8) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

**２．服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

| 関係部位 | 症　状 |
|---|---|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 便秘、腹部膨満感、腹部不快感、吐き気、腹痛、嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症　状 |
|---|---|
| ショック（アナフィラキシー） | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |

| 症状の名称 | 症　　状 |
|---|---|
| 皮膚粘膜眼症候群<br>（スティーブンス・ジョンソン症候群）、<br>中毒性表皮壊死融解症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。 |
| イレウス様症状<br>（腸閉塞様症状） | 激しい腹痛、ガス排出（おなら）の停止、嘔吐、腹部膨満感を伴う著しい便秘があらわれる。 |

**３．服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**
眠気
**４．２～３日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

## 〈効能・効果〉
食べ過ぎ・飲み過ぎによる下痢、寝冷えによる下痢

## 〈用法・用量〉
次の量をかむか、口中で溶かして服用してください。下痢が止まれば服用しないでください。服用間隔は４時間以上おいてください。

| 年齢 | １回量 | １日服用回数 |
|---|---|---|
| 成人（15歳以上） | ２錠 | ２回 |
| 15歳未満 | 服用しないでください。 | |

## 用法・用量に関連する注意
(1)　定められた用法・用量を厳守してください。
(2)　錠剤の取り出し方
右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）




## 〈成分・分量と働き〉
（１日量中）

| 成　　分 | 分 量 | はたらき |
|---|---|---|
| ロペラミド塩酸塩 | １mg | 腸の過剰な運動や腸の粘膜における水分の吸収・分泌異常を改善して、下痢を抑えます。 |
| ビオヂアスターゼ2000 | 90mg | 胃腸内にある未消化物の消化を助けます。 |
| ラクトミン（フェカリス菌） | 20mg | 乳酸菌（善玉菌）が乱れた腸内細菌バランスを整えます。 |

添加物：D－マンニトール、キシリトール、結晶セルロース、クロスポビドン、リン酸水素Ca、乳糖水和物、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mg、*l*－メントール

## 保管及び取扱い上の注意
(1)　直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2)　小児の手の届かない所に保管してください。
(3)　他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）

お問い合わせはお買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
連絡先　大鵬薬品工業株式会社　お客様相談室
〒101-8444　東京都千代田区神田錦町1-27
電話番号：0120-4527-66　受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）
ホームページ：https://www.taiho.co.jp/

販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27

製造販売元
大昭製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931

## ソルマック　キュアールD

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 名　　称 | ソルマック　キュアールD |
| 2 | 成分・分量 | 1日量中<br>ロペラミド塩酸塩 …… 1mg<br>ビオヂアスターゼ2000 …… 90mg<br>ラクトミン（フェカリス菌） …… 20mg |
| 3 | 用法・用量 | 次の量をかむか、口中で溶かして服用してください。下痢が止まれば服用しないでください。<br>服用間隔は4時間以上おいてください。 |
| 4 | 効能･効果 | 食べ過ぎ・飲み過ぎによる下痢、寝冷えによる下痢 |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために必要な事項 | 1.次の人は服用しないでください<br>本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。<br>2.本剤を服用している間は、次の医薬品を使用しないでください<br>胃腸鎮痛鎮痙薬<br>3.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください<br>（眠気等があらわれることがあります。）<br>4.服用前後は飲酒しないでください<br><br>次に該当する人はお申し出ください<br>(1) 医師の治療を受けている人。<br>(2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。<br>(3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・吐き気等の症状を伴う下痢のある人。<br>（本剤で無理に下痢を止めるとかえって病気を悪化させることがあります。）<br>(4) 便秘を避けなければならない肛門疾患等のある人。<br>（本剤の服用により便秘が発現することがあります。）<br>(5) 妊婦又は妊娠していると思われる人。<br>(6) 授乳中の人。<br>(7) 高齢者。<br>(8) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 |
| 6 | 薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項 | |

| 年　齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|---|---|---|
| 成人（15歳以上） | 2錠 | 2回 |
| 15歳未満 | 服用しないでください | |

［注意事項］

1.本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2.情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3.使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。



2026年9月作成

# Ⅲ

# 第２類 医 薬 品

添付文書・説明文書集

大鵬薬品

## 滋養強壮剤

# 販売名：チオビタゴールド

### ●1本（30mL）




| 包　　装 | 1本（30mL） |
|---|---|
| サイズ（mm） | 胴径30×高さ90 |
| 重量（g） | 85 |
| 使用期限 | 3年 |
| メーカー希望小売価格（税別） | 403円 |
| JANコード | 4968 4315 |
| ITFコード | — |

### ●1箱（30mL×3本）




| 包　　装 | 1箱（30mL×3本） | 梱［（30mL×3本）×30箱］ |
|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 33×97×93 | 285×330×100 |
| 重量（g） | 270 | 8200 |
| 使用期限 | 3年 | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 1,208円 | 36,240円 |
| JANコード | 4987117 437218 | 4987117 437232 |
| ITFコード | — | 1 4987117 437239 |

### ●1箱（30mL×10本）




| 包　　装 | 1箱（30mL×10本） | 梱［（30mL×10本）×10箱］ |
|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 62×154×93 | 325×320×100 |
| 重量（g） | 890 | 9100 |
| 使用期限 | 3年 | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 4,025円 | 40,250円 |
| JANコード | 4987117 437355 | 4987117 437379 |
| ITFコード | — | 1 4987117 437376 |

### 参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ（単位：mm）



2026年9月作成

販売名：チオビタゴールド

使用上の注意

相談すること 1.服用後、下痢があらわれることがあるので、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
2.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

■発熱性消耗性疾患・肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・産前産後などの場合の栄養補給 ■滋養強壮 ■虚弱体質

用法・用量

成人（15歳以上）は、1日1回1本（30mL）を服用して下さい。
●小児（15歳未満）は服用しないで下さい。
●用法・用量を守って下さい。

4968 4315

製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/

滋養強壮・虚弱体質・栄養補給に

チオビタ® ゴールド

TIOVITA GOLD

第2類医薬品

30mL

成分 ―1本（30mL）中―

ローヤルゼリー 100mg、ニンジン流エキス 0.6mL（原生薬600mgに相当）、インヨウカク流エキス 0.1mL（原生薬100mgに相当）、チアミン硝化物（ビタミン$B_1$）5mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミン$B_2$）5mg、ピリドキシン塩酸塩（ビタミン$B_6$）5mg、ニコチン酸アミド30mg、無水カフェイン50mg（アルコール0.2mL以下） 添加物：果糖、クエン酸、没食子酸プロピル、アルコール、安息香酸Na、pH調整剤、バニリン、トウモロコシデンプン、香料

(1)生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用して下さい。
(2)本剤に配合されているビタミン$B_2$により、尿が黄色になることがありますが、心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わります）。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

ガラス：瓶
金　属：キャップ

副作用救済制度
TEL 0120-149-931

®：登録商標

使用期限

製造番号
L1905

## チオビタゴールド

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 名　　称 | チオビタゴールド |
| 2 | 成分・分量 | 1本（30mL）中<br>ローヤルゼリー ……100mg<br>ニンジン流エキス …… 0.6mL（原生薬600mgに相当）<br>インヨウカク流エキス …… 0.1mL（原生薬100mgに相当）<br>チアミン硝化物（ビタミン$B_1$） …… 5mg<br>リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミン$B_2$）… 5mg<br>ピリドキシン塩酸塩（ビタミン$B_6$）…… 5mg<br>ニコチン酸アミド …… 30mg<br>無水カフェイン…… 50mg（アルコール0.2mL 以下） |
| 3 | 用法・用量 | 成人（15歳以上）は、1日1回1本（30mL）を服用してください<br>●小児（15歳未満）は服用しないでください |
| 4 | 効能･効果 | 発熱性消耗性疾患・肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・産前産後などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質 |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために必要な事項 | |
| 6 | 薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項 | |

［注意事項］

1.本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。

2.情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。

3.使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。



2026年9月作成

## 生薬配合液体胃腸薬

# 販売名：ソルマックプラス

### ●1本（25mL）



| 包　　装 | 1本（25mL） |
|---|---|
| サイズ（mm） | 胴径36×高さ88 |
| 重量（g） | 85 |
| 使用期限 | 3年 |
| メーカー希望小売価格（税別） | 400円 |
| JANコード | 4514 4608 |
| ITFコード | — |

### ●1箱（25mL×2本）




| 包　　装 | 1箱（25mL×2本） | 内装［（25mL×2本）×20箱］ | 梱［（25mL×2本）×20箱×2］ |
|---|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 39×76×92 | 190×150×185 | 193×304×187 |
| 重量（g） | 183 | 3800 | 7650 |
| 使用期限 | 3年 | | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 800円 | — | 32,000円 |
| JANコード | 4987117 398816 | 4987117 398823 | 4987117 398830 |
| ITFコード | — | — | 1 4987117 398837 |

### ●1箱（25mL×5本）




| 包　　装 | 1箱（25mL×5本） | 梱［（25mL×5本）×20箱］ |
|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 39×180×92 | 195×384×195 |
| 重量（g） | 455 | 9500 |
| 使用期限 | 3年 | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 2,000円 | 40,000円 |
| JANコード | 4987117 398847 | 4987117 398854 |
| ITFコード | — | 1 4987117 398851 |

### 参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ（単位：mm）



2026年9月作成


販売名:ソルマックプラス
使用上の注意
してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
●長期連用しないで下さい。
相談すること
1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1)医師の治療を受けている人 (2)高齢者 (3)むくみのある人 (4)高血圧、腎臓病、心臓病の診断を受けた人 2.服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師の診療を受けて下さい。偽アルドステロン症、ミオパチー(手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。) 3.5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
効能・効果
はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、もたれ(胃もたれ)、胃弱、食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、胸やけ、胸つかえ(嘔気、悪心)、嘔吐、消化不良、
L2305
25mL
ガラス:瓶
金属:キャップ
生薬配合胃腸薬
ソルマックプラス
第2類医薬品
製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/
副作用救済制度 TEL 0120-149-931
使用期限
製造番号
用法・用量
成人(15歳以上)、1回1本(25mL)を1日2回服用して下さい。服用間隔は4時間以上おいて下さい。●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。●用法・用量を厳守して下さい。
成分
1日量2本(50mL)中 ウコン流エキス0.5mL、カンゾウ抽出物135mg、ニンジン流エキス0.3mL、カンソウ抽出チョウジチンキ0.126mL、ゲンチアナチンキ0.376mL、ソウジュツ流エキス1.2mL、ケイヒチンキ0.25mL、カルニチン塩化物120mg
添加物:ハチミツ、白糖、アラビアゴム、エデト酸Ca/Na、l-メントール、アルコール、安息香酸Na、pH調整剤、安息香酸ベンジル、香料 (アルコール0.8mL以下/本)●生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用して下さい。
保管及び取扱い上の注意
(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
4514608

## ソルマックプラス

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 名　　称 | ソルマックプラス |
| 2 | 成分・分量 | 1日量2本（50mL）中<br>ウコン流エキス …… 0.3mL（原生薬300mg相当）<br>カンゾウ抽出物…… 135mg（原生薬1930.5mg相当）<br>ニンジン流エキス …… 0.5mL（原生500mg当）<br>オウレンチンキ …… 0.826mL（原生薬247.8mg相当）<br>チョウジチンキ …… 0.126mL（原生薬37.8mg相当）<br>ゲンチアナチンキ …… 0.376mL（原生薬112.8mg当）<br>ソウジュツ流エキス …… 1.2mL（原生薬1200mg相当）<br>ケイヒチンキ …… 0.25mL（原生薬75mg相当）<br>カルニチン塩化物…… 120mg |
| 3 | 用法・用量 | 成人（15歳以上）は、1回1本（25mL）を1日2回服用してください<br>服用間隔は4時間以上おいてください<br>●小児（15歳未満）は服用しないでください |
| 4 | 効能･効果 | はきけ（二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、消化不良、食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、もたれ（胃もたれ）、胃弱、食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部膨満感、胸やけ、胸つかえ |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために必要な事項 | 長期連用しないでください<br>次に該当する人はお申し出ください<br>・医師の治療を受けている人<br>・高齢者<br>・むくみのある人<br>・高血圧、腎臓病、心臓病の診断を受けた人 |
| 6 | 薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項 | |

［注意事項］

1.本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。

2.情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。

3.使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。



2026年9月作成

## 生薬製剤

# 販売名：ハルンケア ベアベリー錠

### ●1袋（48錠）




| 包　　装 | 1袋（48錠） | 箱（48錠×10） | 梱［（48錠×10）×6］ |
|---|---|---|---|
| サイズ（mm） ※1 | 9×92×147 | 93×113×152 | 240×300×178 |
| 重量（g） | 18.75 | 227.2 | 1725 |
| 使用期限 | 3年 | | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 1,840円 | 18,400円 | 110,400円 |
| JANコード | 4987117 613100 | 4987117 613117 | 4987117 613124 |
| ITFコード | — | — | 1 4987117 613107 |

### ●1箱（84錠）




| 包　　装 | 1箱（84錠） | 梱（84錠×30） |
|---|---|---|
| サイズ（mm） ※1 | 25×98×115 | 244×402×140 |
| 重量（g） | 42.1 | 1785 |
| 使用期限 | 3年 | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 3,059円 | 91,770円 |
| JANコード | 4987117 613209 | 4987117 613216 |
| ITFコード | — | 1 4987117 613206 |

### 参考画像




アルミ包装 84錠



錠剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ（単位：mm）



2026年9月作成

膀胱などを消毒し
排尿時の不快感、残尿感を改善

錠剤
原寸大

# ハルンケア®
# ベアベリー錠

有効成分ウワウルシ
OTC医薬品最大量※配合

※一般用生薬製剤製造販売承認基準の最大量配合



84錠(7日分)

第2類医薬品

大鵬薬品

製造番号

使用期限

副作用被害救済制度の申し出先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/kyuusai/index.html
TEL 0120-149-931(フリーダイヤル)

ハルンケア®ベアベリー錠

第2類医薬品

大鵬薬品

8才以上
(7日分)

販売名:
ハルンケア ベアベリー錠

押して開ける

生薬製剤 第2類医薬品

服用に際して、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## ⚠使用上の注意

**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)胃腸の弱い人(4)今までに薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(5)次の診断を受けた人 腎障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症状 |
|---|---|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 胃部不快感、吐き気・嘔吐 |

3. 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

[効能・効果] 残尿感(尿がでしぶる)、排尿時の不快感のあるもの
[用法・用量] 次の量を食前又は食間に水または温湯にて服用してください。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|---|---|---|
| 成人(15歳以上) | 4錠 | 3回 |
| 15歳未満 | 服用しないでください | |

注)食間とは食事と食事の間という意味で、食後約2時間のことです。 ●定められた用法・用量を厳守してください。

[成分・分量] 1日量12錠中:ウワウルシ乾燥エキス…1875mg(ウワウルシ15gに相当)
添加物としてデキストリン、結晶セルロース、パレイショデンプン、クロスカルメロースナトリウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/

製造販売元
松浦薬業株式会社
愛知県名古屋市昭和区円上町24-21

[保管及び取扱上の注意](1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密封して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4)乾燥剤は薬がなくなるまで捨てないでください。(5)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なる場合がありますが、効果に変わりありません。(6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

4 987117 613209

[特徴]
●薬用植物であるウワウルシを有効成分とした飲みやすい錠剤です。
●尿路消毒作用で膀胱などの細菌の働きを抑え、排尿時の不快感や残尿感を改善します。

## ハルンケア ベアベリー錠

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 名　　称 | ハルンケア ベアベリー錠 |
| 2 | 成分・分量 | 1日量12錠中<br>ウワウルシ乾燥エキス …… 1875mg（ウワウルシ15gに相当） |
| 3 | 用法・用量 | 次の量を食前又は食間に水または温湯にて服用してください |

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|---|---|---|
| 成人（15歳以上） | 4錠 | 3回 |
| 15歳未満 | 服用しないでください | |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | 効能･効果 | 残尿感（尿がでしぶる）、排尿時の不快感のあるもの |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために必要な事項 | 次に該当する人はお申し出ください<br>・医師の治療を受けている人<br>・妊婦又は妊娠していると思われる人<br>・胃腸の弱い人<br>・今までに薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人<br>・次の診断を受けた人 腎障害 |
| 6 | 薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項 | |

［注意事項］

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。



2026年9月作成

## 外用鎮痛消炎薬

# 販売名：ゼノールエクサムFX

### ●1箱（32g×1本）




| 包　　装 | 1箱（32g×1本） | 内装［（32g×1本）×10箱］ | 梱［（32g×1本）×10箱×10］ |
|---|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 33×51×141 | 104×175×145 | 365×540×165 |
| 重量（g） | 74 | 794 | 8638 |
| 使用期限 | 3年 | | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 1,323円 | — | 132,300円 |
| JANコード | 4987117 372038 | — | 4987117 372045 |
| ITFコード | — | — | 1 4987117 372042 |

### 参考画像




32g×1本




製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ（単位：mm）



2026年9月作成

開封口

## 肩・腰の痛みをとる フェルビナク3.0%配合。

**ニオイが気にならないから どこでも気軽に使えます。**



ほのかな香りでニオイを気にせずオフィスなどで気軽に使えます。



ベタつかないサラッとタイプなのでぬった後、すぐに服が着られます。



底部のダイヤルを回すと〈薬剤〉が出てきます。4~5mm出して使用してください。



バッグに入れて携帯しやすいスリムなチック。

### 保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)揮発性がありますので、使用後はキャップをきちんと閉めて、外気にふれないようにしてください。(3)小児の手の届かない所に保管してください。(4)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(5)本剤を火気に近づけないでください。また、使用後は火中に投じないでください。(6)塗料(家具、塗装床、アクセサリー等)、化繊、絹、皮革等に付着すると変質することがありますので、ご注意ください。(7)使用期限が過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、品質保持の点からなるべく速やかに使用してください。

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

Ⓡ:登録商標
引火性固体
イソプロパノール

ZENOL

ご使用に際して、このパッケージに記載の説明書きをよくお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

### 効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、打撲、捻挫(ねんざ)、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)

### 用法・用量

1日2~4回、適量を患部にすり込んでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)用法・用量を厳守してください。(2)目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。(4)本剤塗布後の患部を、ラップフィルム等の通気性の悪いものでおおわないでください。(5)患部の汗をふきとってから使用してください。(6)容器が直接患部に当たらないように、容器の中の薬剤を4~5mm出してから使用してください。(7)薬剤底部の受け皿が見え、ガタつくようになったら、本剤の使用をやめてください。また、受け皿に残った薬剤は無理に使用しないでください。

### 成分(100g中)

| 成分 | 含量 |
|---|---|
| フェルビナク | 3.0g |
| *l*-メントール | 2.7g |

添加物として、マクロゴール、クロタミトン、オレイルアルコール、ステアリン酸、イソステアリン酸、乳酸Na、香料、フェニルエチルアルコール、スクワラン、pH調整剤、イソプロパノール、その他2成分を含有します。

### 内容量

32g

01H907

第2類医薬品

# ゼノール エクサム FX

**ニオイが気にならない 微香性チック**

ZENOL

# ゼノール エクサム® FX ハードゲル



肩・腰の痛みに

フローラルグリーンのほのかな香り

フェルビナク 3.0% 配合




セルフメディケーション 税控除対象

携帯に便利 微香性チック

販売名:ゼノールエクサム FX

外用鎮痛消炎薬

第2類医薬品

4 987117 372038

製造番号

使用期限

プラ 袋:PE, PET, 金属

紙 箱

ZENOL

### 使用上の注意

**してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1.次の人は使用しないでください。
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)ぜんそくを起こしたことがある人 (3)妊婦又は妊娠していると思われる人 (4)15歳未満の小児

2.次の部位には使用しないでください。
(1)目の周囲、粘膜等 (2)湿疹、かぶれ、傷口 (3)みずむし・たむし等又は化膿している患部

**相談すること**

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書きを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症状 |
|---|---|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症状 |
|---|---|
| ショック(アナフィラキシー) | 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。 |

3.1週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書きを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

販売元
TAIHO 大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/

製造販売元
三笠製薬株式会社
東京都練馬区豊玉北2-3-1

1

## ゼノールエクサム FX

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 名　　称 | ゼノールエクサムFX |
| 2 | 成分・分量 | 100g中<br>フェルビナク …… 3.0g<br>l-メントール …… 2.7g |
| 3 | 用法・用量 | 1日2～4回、適量を患部にすり込んでください |
| 4 | 効能･効果 | 肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、打撲、捻挫（ねんざ）、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みとはれ）、肘の痛み（テニス肘など） |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために必要な事項 | 1.次の人は使用しないでください<br>（1）本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人<br>（2）ぜんそくを起こしたことがある人<br>（3）妊婦又は妊娠していると思われる人<br>（4）15歳未満の小児<br>2.次の部位には使用しないでください<br>（1）目の周囲、粘膜等<br>（2）湿疹、かぶれ、傷口<br>（3）みずむし・たむし等又は化膿している患部<br>次に該当する人はお申し出ください<br>（1）医師の治療を受けている人<br>（2）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 |
| 6 | 薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項 | |

［注意事項］

1.本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。

2.情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。

3.使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。



2026年9月作成

## 外用鎮痛消炎薬

# 販売名：ゼノールエクサムSX

### ●1箱（43g×1本）




| 包　　装 | 1箱（43g×1本） | 内装［（43g×1本）×10箱］ | 梱［（43g×1本）×10箱×10］ |
|---|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 48×55×141 | 114×251×144 | 261×598×306 |
| 重量（g） | 106 | 1136 | 12098 |
| 使用期限 | 3年 | | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 1,725円 | — | 172,500円 |
| JANコード | 4987117 372014 | — | 4987117 372021 |
| ITFコード | — | — | 1 4987117 372028 |

### 参考画像




43g×1本




製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ（単位：mm）



2026年9月作成


開封口
つらい肩・腰の痛みに
グリッと広くぬれる太ぬりチック
太ぬりチックだから、肩から首すじまで
広範囲にしっかりぬれます。
痛みとその周辺患部に
グリッと押しつけるように
ぬってください。
下をまわすと（薬剤）が出てきます。
4～5mm出して使用してください。
フェルビナク3.0%配合
こんな時に使いやすい太ぬりチック
腰の痛みと周辺患部
にしっかりぬれます。
腕や足の筋肉の痛みに
広くぬれます。
引火性固体　イソプロパノール
㊞:登録商標
箱
袋：PE,PET,金属
01C602
ZENOL
ご使用に際して、このパッケージに記載の
説明書きをよくお読みください。また、必要な
ときに読めるように大切に保管してください。
効能・効果
関節痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰
痛、打撲、捻挫（ねんざ）、腱鞘炎（手・手首・
足首の痛みとはれ）、肘の痛み（テニス肘など）
用法・用量
1日2～4回、適量を患部にすり込んでください。
〈用法・用量に関連する注意〉
(1)用法・用量を厳守してください。(2)目に入
らないようご注意ください。万一、目に入った場
合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受
けてください。(3)本剤は外用にのみ使用し、内
服しないでください。(4)本剤塗布後の患部を、
ラップフィルム等の通気性の悪いものでおおわ
ないでください。(5)患部の汗をふきとってから
使用してください。(6)容器が直接患部に当
たらないように、容器の中の薬剤を4～5mm
出してから使用してください。(7)薬剤底部の受
け皿が見え、皿の上面が露出するようになった
ら、本剤の使用をやめてください。また、受け皿
に残った薬剤は無理に使用しないでください。
成分（100g中）
成分　含量
フェルビナク　3.0g
l-メントール　3.0g
添加物として、イソプロパノール、プロピレン
グリコール、マクロゴール、ポリオキシエチレン
硬化ヒマシ油、ステアリン酸Na、1,3-ブチレ
ングリコール、オレイルアルコール、スクワラ
ン、pH調整剤を含有します。
内容量
43g
販売元　大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/
製造販売元　三笠製薬株式会社
東京都練馬区豊玉北2-3-1
副作用被害救済制度
電話 0120-149-931
M003
第2類医薬品
ゼノール エクサム SX
広くグリッとぬれる
太ぬりチック
ZENOL
ゼノール
エクサム SX
ハードゲル
肩・腰の痛みに
フェルビナク
3.0%
配合
セルフメディケーション
税控除対象
グリッとぬれる
太ぬりチック
販売名：ゼノールエクサム SX
外用鎮痛消炎薬
第2類医薬品
製造番号
使用期限
4 987117 372014
ZENOL
使用上の注意
してはいけないこと
（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用
が起こりやすくなります。）
1. 次の人は使用しないでください。
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こし
たことがある人(2)ぜんそくを起こしたことがある人(3)妊婦
又は妊娠していると思われる人(4)15歳未満の小児
2. 次の部位には使用しないでください。
(1)目の周囲、粘膜等(2)湿疹、かぶれ、傷口
(3)みずむし・たむし等又は化膿している患部
3. 長期連用しないでください。
相談すること
1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録
販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人(2)薬などにより
アレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可
能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書きを
持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
関係部位　症状
皮膚　発疹・発赤、かゆみ、はれ、
ヒリヒリ感、かぶれ
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。
症状の名称　症状
ショック
（アナフィ
ラキシー）
使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じん
ましん、声のかすれ、くしゃみ、のど
のかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の
混濁等があらわれます。
3. 1週間位使用しても症状がよくならない場合
は使用を中止し、この説明書きを持って医師、薬
剤師又は登録販売者に相談してください。
保管及び取扱い上の注意
(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
(2)揮発性がありますので、使用後はキャップをきちん
と閉めて、外気にふれないようにしてください。(3)小児
の手の届かない所に保管してください。(4)他の容器に
入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が
変わります。）(5)本剤を火気に近づけないでください。
また、使用後は火中に投じないでください。(6)塗料
（家具、塗装床、アクセサリー等）、化繊、絹、皮革等
に付着すると変質することがありますので、ご注意く
ださい。(7)使用期限が過ぎた製品は使用しないで
ください。また、開封後は使用期限内であっても、
品質保持の点からなるべく速やかに使用してください。
1

## ゼノールエクサム SX

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 名　　称 | ゼノールエクサムSX |
| 2 | 成分・分量 | 100g中<br>フェルビナク …… 3.0g<br>dl-メントール …… 3.0g |
| 3 | 用法・用量 | 1日2～4回、適量を患部にすり込んでください |
| 4 | 効能･効果 | 関節痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、打撲、捻挫（ねんざ）、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みとはれ）、肘の痛み（テニス肘など） |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために必要な事項 | 1. 次の人は使用しないでください<br>（1）本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人<br>（2）ぜんそくを起こしたことがある人<br>（3）妊婦又は妊娠していると思われる人<br>（4）15歳未満の小児<br>2. 次の部位には使用しないでください<br>（1）目の周囲、粘膜等<br>（2）湿疹、かぶれ、傷口<br>（3）みずむし・たむし等又は化膿している患部<br>次に該当する人はお申し出ください<br>（1）医師の治療を受けている人<br>（2）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 |
| 6 | 薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項 | |

［注意事項］

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。



2026年9月作成

## 外用鎮痛消炎薬

# 販売名：ゼノールエクサム液ゲル

### ●1箱（52mL×1本）




| 包　　装 | 1箱（52mL×1本） | 内装［（52mL×1本）×10箱］ | 梱［（52mL×1本）×10箱×10］ |
|---|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 40×55×141 | 115×208×145 | 444×600×172 |
| 重量（g） | 92 | 999 | 11134 |
| 使用期限 | 3年 | | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 1,725円 | — | 172,500円 |
| JANコード | 4987117 372304 | — | 4987117 372328 |
| ITFコード | — | — | 1 4987117 372325 |

### 参考画像




52mL×1本



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ（単位：mm）



2026年9月作成


開封口
手の届きにくい肩・関節の痛みに
ラクにぬれるロングボディ
肩甲骨などの、ぬりにくい患部に
ラクにぬれます。
広くぬれるワイドフェイス
約30mm
フェルビナク3.0%配合
関節など、曲面の患部
にも簡単にぬれます。
ベタつかないので、
服がすぐに着られます。
容器の正しい使い方
❶スポンジ中央を
しっかり押す
❷スポンジが充分に
湿ったことを確認
❸ゆっくりと
患部に塗布
液もれ防止
ストッパー付
販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/
製造販売元
三笠製薬株式会社
東京都練馬区豊玉北2-3-1
副作用被害救済制度
電話 0120-149-931
Ⓡ:登録商標
ZENOL
使用上の注意
してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
1.次の人は使用しないでください。
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人(2)ぜんそくを起こしたことがある人(3)妊婦又は妊娠していると思われる人(4)15歳未満の小児
2.次の部位には使用しないでください。
(1)目の周囲、粘膜等(2)湿疹、かぶれ、傷口(3)みずむし・たむし等又は化膿している患部
相談すること
1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書きを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
関係部位 | 症状
皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。
症状の名称 | 症状
ショック(アナフィラキシー) | 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。
3.1週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書きを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
保管及び取扱い上の注意
(1)直射日光の当たらない涼しい所にキャップをしっかり閉めて保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)本剤を火気に近づけないでください。また、使用済みの容器は火中に投じないでください。(5)液が漏れるおそれがありますので、使用後は、キャップをしっかり閉めてください。(6)塗料(家具、塗装床、アクセサリー等)、化繊、絹、皮革等に付着すると変質することがありますので、ご注意ください。(7)使用期限が過ぎた製品は、使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、品質保持の点からなるべく速やかに使用してください。
01G008
ホースにテープを貼っています
薬液を出す前に
テープをはがしてください。
第2類医薬品
ゼノール エクサム液ゲル
手の届きにくい患部にぬれる
ロングボディ
ZENOL
ゼノール
エクサム液ゲル
液ゲル
肩・関節の痛みに
フェルビナク
3.0%
配合
セルフメディケーション
税 控除 対象
ベタつかない
液ゲル
販売名:ゼノールエクサム液ゲル
52mL 外用鎮痛消炎薬
第2類医薬品
4 987117 372304
紙 箱
スポンジの半分を押して
充分に湿らせてから
使用してください。
ZENOL
ご使用に際して、このパッケージに記載の説明書きをよくお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。
効能・効果
肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、筋肉痛、関節痛、打撲、捻挫(ねんざ)、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)
用法・用量
1日2～4回、適量を患部に塗布してください。
〈用法・用量に関連する注意〉
(1)スポンジ面が破れるおそれがありますので、お使いになる時は、スポンジ面に液が充分に浸透したことを確かめてから塗布してください。(2)用法・用量を厳守してください。(3)目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。(5)本剤塗布後の患部を、ラップフィルム等の通気性の悪いものでおおわないでください。
成分(100g中)
成分 | 含量
フェルビナク | 3.0g
l-メントール | 2.0g
添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、香料、トリエタノールアミン、アルコールを含有します。
内容量
52mL
製造番号
使用期限
1

## ゼノールエクサム液ゲル

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 名　　称 | ゼノールエクサム液ゲル |
| 2 | 成分・分量 | 100g中<br>フェルビナク …… 3.0g<br>l-メントール …… 2.0g |
| 3 | 用法・用量 | 1日2～4回、適量を患部に塗布してください |
| 4 | 効能･効果 | 肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、筋肉痛、関節痛、打撲、捻挫（ねんざ）、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みとはれ）、肘の痛み（テニス肘など） |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために必要な事項 | 1. 次の人は使用しないでください<br>（1）本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人<br>（2）ぜんそくを起こしたことがある人<br>（3）妊婦又は妊娠していると思われる人<br>（4）15歳未満の小児<br>2. 次の部位には使用しないでください<br>（1）目の周囲、粘膜等<br>（2）湿疹、かぶれ、傷口<br>（3）みずむし・たむし等又は化膿している患部<br>次に該当する人はお申し出ください<br>（1）医師の治療を受けている人<br>（2）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 |
| 6 | 薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項 | |

［注意事項］

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。



2026年9月作成

## 外用鎮痛消炎薬

# 販売名：ゼノールジクロダイレクトR

### ●1箱（42g×1本）




| 包　　装 | 1箱（42g×1本） | 内装［（42g×1本）×10箱］ | 梱［（42g×1本）×10箱×10］ |
|---|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 48×55×141 | 114×251×144 | 261×598×306 |
| 重量（g） | 104 | 1113 | 11750 |
| 使用期限 | 3年 | | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 1,840円 | — | 184,000円 |
| JANコード | 4987117 372601 | — | 4987117 372625 |
| ITFコード | — | — | 1 4987117 372608 |

### 参考画像




42g×1本




製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ（単位：mm）



2026年9月作成

開封口

ZENOL ZENOL ZENOL

販売名：ゼノールジクロダイレクトR

第2類医薬品

# ゼノール ジクロダイレクト®

## 手軽に患部へ ぬりこめる

### つらい痛みに直接浸透して効く！ ジクロフェナクナトリウム配合




下をまわすと〈薬剤〉が出てきます。
4～5mm出して使用してください。

### チック剤だからいろいろな患部に手を汚さず、ぬりこめます




### 保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2)揮発性がありますので、使用後はキャップをきちんと閉めて、外気にふれないようにしてください。(3)火気に近づけないでください。また、使用後は火中に投じないでください。(4)小児の手の届かない所に保管してください。(5)塗料(家具、塗装床、アクセサリー等)、化繊、絹、皮革等に付着すると変質することがありますので、ご注意ください。(6)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(7)使用期限が過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく速やかに使用してください。


販売元 TAIHO 大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/

製造販売元 三笠製薬株式会社
東京都練馬区豊玉北2-3-1


ご使用に際して、このパッケージに記載の説明書きをよくお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

### 効能・効果

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫(ねんざ)

### 用法・用量

1日3～4回適量を患部にすり込んでください。ただし、塗擦部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)定められた用法・用量を厳守してください。(2)本剤は、痛みやはれ等の原因となっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。(3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。(4)1週間あたり50gを超えて使用しないでください。(5)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(6)使用部位に他の外用剤を併用しないでください。(7)通気性の悪いもの(ラップフィルム、矯正ベルト等)で使用部位を覆い、密封状態にしないでください。(8)患部の汗をふきとってから使用してください。(9)容器が直接患部に当たらないように、容器の中の薬剤を4～5mm出してから使用してください。(10)薬剤底部の受け皿が見え、皿の上面が露出するようになったら、本剤の使用をやめてください。また、受け皿に残った薬剤は無理に使用しないでください。

### 成分(100g中)

| 成　分 | 含　量 |
|---|---|
| ジクロフェナクナトリウム | 1.0g |
| *l*-メントール | 3.0g |

添加物として、ステアリン酸Na、パルミチン酸、1,3-プチレングリコール、イソプロパノール、その他2成分を含有します。

### 内容量

42g

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

Ⓡ:登録商標
01H402

# ゼノール ジクロダイレクト®

ハードゲル




外用鎮痛消炎薬

セルフメディケーション税控除対象

販売名：ゼノールジクロダイレクトR

第2類医薬品

### ⚠使用上の注意

**してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

**1.次の人は使用しないでください。**

(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)ぜんそくを起こしたことがある人 (3)妊婦又は妊娠していると思われる人 (4)15歳未満の小児

**2.次の部位には使用しないでください。**

(1)目の周囲、粘膜等 (2)皮膚の弱い部位(顔、頭、わきの下等) (3)湿疹、かぶれ、傷口 (4)みずむし・ただれ等又は化膿している患部

**3.本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤を使用しないでください。**

**4.長期連用しないでください。**

**相談すること**

**1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

(1)医師の治療を受けている人 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3)次の医薬品の投与を受けている人 ニューキノロン系抗菌剤

**2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書きを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

| 関係部位 | 症　状 |
|---|---|
| 皮　膚 | 発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み、刺激感、熱感、皮膚のあれ、落屑(らくせつ:フケ、アカのような皮膚のはがれ)、水疱、色素沈着 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症　状 |
|---|---|
| ショック(アナフィラキシー) | 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。 |
| 接触皮膚炎、光線過敏症 | 塗擦部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱、ただれ等の激しい皮膚炎症状や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身にひろがることがあります。また、日光があたった部位に症状があらわれたり、悪化することがあります。 |

**3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書きを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

引火性固体：イソプロパノール

製造番号

使用期限

4 987117 372601

紙 箱　プラ 袋：PE, PET, 金属

## ゼノールジクロダイレクトR

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 名　　称 | ゼノールジクロダイレクトR |
| 2 | 成分・分量 | 100g中<br>ジクロフェナクナトリウム …… 1.0g<br>l-メントール …… 3.0g |
| 3 | 用法・用量 | 1日3～4回適量を患部にすり込んでください<br>ただし、塗擦部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。<br>なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。 |
| 4 | 効能･効果 | 関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎（手・手首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫（ねんざ） |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために必要な事項 | 1.次の人は使用しないでください<br>（1）本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人<br>（2）ぜんそくを起こしたことがある人<br>（3）妊婦又は妊娠していると思われる人<br>（4）15歳未満の小児<br>2.次の部位には使用しないでください<br>（1）目の周囲、粘膜等<br>（2）皮膚の弱い部位（顔、頭、わきの下等）<br>（3）湿疹、かぶれ、傷口<br>（4）みずむし・たむし等又は化膿している患部<br>3.本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤を使用しないでください<br>4.長期連用しないでください<br>次に該当する人はお申し出ください<br>（1）医師の治療を受けている人<br>（2）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人<br>（3）次の医薬品の投与を受けている人<br>ニューキノロン系抗菌剤 |
| 6 | 薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項 | |

［注意事項］

1.本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。

2.情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。

3.使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。



2026年9月作成

## 乾燥性皮膚治療薬

# 販売名：ウレパールプラスクリーム

### ●1箱（80g×1個）




| 包　　装 | 1箱（80g） | 内装（80g×10箱） | 梱（80g×10箱×4） |
|---|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 69×69×43.5 | 144×351×48 | 310×372×119 |
| 重量（g） | 149 | 1560 | 6680 |
| 使用期限 | 3年 | | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 1,840円 | 18,400円 | 73,600円 |
| JANコード | 4987117 140132 | 4987117 140149 | 4987117 140156 |
| ITFコード | — | — | 1 4987117 140139 |

### 参考画像




80g×1個




製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ（単位：mm）



2026年9月作成

ご使用前に必ずこの添付文書をお読みください。
また、必要なとき読めるように大切に保管してください。

第２類医薬品

乾燥性皮膚治療薬

# ウレパール®プラスクリーム

エアコンやアルミサッシによる住環境の密閉化により、季節にかかわらず皮膚が乾燥しやすい状況におかれています。また、年齢や体質、栄養のバランスなどにより、皮脂の分泌が低下したり、皮膚の表面にある角質層に水分を保持するはたらきが弱くなることがあります。このような場合、皮膚はうるおいをなくし、カサカサの「乾燥性皮膚」になりがちです。乾燥性皮膚は、気温や湿度の変化、衣類などさまざまな刺激に敏感になり、かゆみを起こしやすくなります。特に気温が低く、空気が乾燥する冬季に多く発症し、夜間にかゆみがひどくなるのが特徴です。

## ●ウレパール プラス クリームの特徴

乾燥性皮膚に伴うかゆみを鎮めると同時に、皮膚をしっとりなめらかにします。
親水性のクリームで皮膚によくのび、患部にすっとなじみます。

### 乾燥対策




尿素が
乾燥した皮膚に
水分を集め、
逃さないように
します。

＋

### かゆみ止め対策




かゆみ止め成分
ジフェンヒドラミン塩酸塩、
d-カンフル、リドカインが
しつこいかゆみを
鎮めます。

## ●こんなカサカサ皮膚に効果があります。



お風呂上がりや就寝中など
体が温まってかゆい所に。



うで、あし、腰、背中などが
カサついてかゆい所に。



衣類などの刺激で
かゆい所に。



お子様のかゆみを伴う
カサついた皮膚に。

## ⚠ 使用上の注意

### ☒ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

**次の部位には使用しないでください。**

(1) 目のまわり、粘膜（例えば口腔、鼻腔、膣等）など
(2) 炎症又は傷のある患部
(3) ただれやひび割れのひどい患部

### 相談すること

**1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）又は刺激症状を起こしたことがある人

**2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

| 関係部位 | 症　　状 |
|---|---|
| 皮　膚 | かぶれ、発疹・発赤、かゆみ、刺激感（痛み、熱感、ぴりぴり感）、はれ、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態 |

**3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

プラスは登録商標です。

［効能・効果］
かゆみを伴う乾燥性皮膚（老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮膚）
○老人・成人の乾皮症とは…皮脂の分泌低下により全身の皮膚が乾燥し、うるおいがなくなります。特にひざから足首までの部分、おしりの部分などに多く見られ、しばしばかゆみを伴います。
○小児の乾燥性皮膚とは…主に毛孔（毛穴）に一致した鳥肌様のザラザラと乾燥した皮膚で、かゆみを伴います。一般に冬に悪くなり、夏に軽くなります。

［用法・用量］
１日１～数回、適量を患部に塗布します。
〈用法・用量に関連する注意〉
(1)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(3)本剤は外用にのみ使用してください。
(4)患部やその周辺の汚れを落としてから使用してください。
(5)定められた用法・用量を守ってください。
(6)化粧品ではないので、効能・効果で定められた患部のみに使用し、基礎化粧等の目的で顔面には使用しないでください。

［成分］
100g中に次の成分を含有するクリーム剤です。
尿素10.0g、ジフェンヒドラミン塩酸塩1.0g、d-カンフル1.0g、リドカイン2.0g、トコフェロール酢酸エステル0.3g
なお、添加物としてメチルパラベン、BHT、トリイソオクタン酸グリセリン、ミリスチン酸オクチルドデシル、コレステロール、メチルポリシロキサン、ステアリルアルコール、セタノール、ベヘニルアルコール、ステアリン酸グリセリル、ステアリン酸ソルビタン、ポリオキシエチレンベヘニルエーテル、ステアリン酸マクロゴール、ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸Na、グリシン、DL-アラニン、塩化Na、グリセリン、乳酸Na、乳酸、精製水を含有します。

［保管及び取扱い上の注意］
(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
(2)小児の手のとどかない所に保管してください。
(3)他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
(4)本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
(5)外箱及び容器に表示の使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

［包装］
80g プラスチック瓶入り

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
連絡先　大鵬薬品工業株式会社 お客様相談室
〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27
電話番号 0120-4527-66　受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

**副作用被害救済制度のお問い合わせ先**
副作用被害救済制度とは、医薬品（病院・診療所で投薬されたものの他、薬局などで購入したものも含みます。）を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用により、入院が必要な程度の疾病や障害などの健康被害を受けた方に対して、医療費等の救済給付を行う公的な制度です。
（独）医薬品医療機器総合機構
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話0120-149-931（フリーダイヤル）

販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
製造販売元
岡山大鵬薬品株式会社
岡山県備前市久々井字沖1775-1

2025.03　UPC250502

## ウレパールプラスクリーム

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 名　　称 | ウレパールプラスクリーム |
| 2 | 成分・分量 | 100g中<br>尿素 …… 10.0g<br>ジフェンヒドラミン塩酸塩 …… 1.0g<br>d-カンフル …… 1.0g<br>リドカイン …… 2.0g<br>トコフェロール酢酸エステル…… 0.3g |
| 3 | 用法・用量 | 1日1～数回、適量を患部に塗布します |
| 4 | 効能･効果 | かゆみを伴う乾燥性皮膚（老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮膚） |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために必要な事項 | 次の部位には使用しないでください<br>（1）目のまわり、粘膜（例えば口腔、鼻腔、膣等）など<br>（2）炎症又は傷のある患部<br>（3）ただれやひび割れのひどい患部<br>次に該当する人はお申し出ください<br>・医師の治療を受けている人<br>・薬などによりアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）又は刺激症状を起こしたことがある人 |
| 6 | 薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項 | |

［注意事項］

1.本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。

2.情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。

3.使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。



2026年9月作成

## 乾燥性皮膚治療薬

# 販売名：ウレパールプラスローション10

### ●1箱（110mL×1本）




| 包　　装 | 1箱（110mL） | 内容（110mL×10箱） | 梱（110mL×10箱×4） |
|---|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 30×54×146 | 110×161×149 | 241×339×178 |
| 重量（g） | 142 | 1470 | 6240 |
| 使用期限 | 3年 | | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 1,840円 | 18,400円 | 73,600円 |
| JANコード | 4987117 140330 | 4987117 140347 | 4987117 140354 |
| ITFコード | — | — | 1 4987117 140337 |

### 参考画像




110mL×1本



内用液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ（単位：mm）



2026年9月作成

ご使用前に必ずこの添付文書をお読みください。
また、必要なとき読めるように大切に保管してください。

第２類医薬品

乾燥性皮膚治療薬

# ウレパール®プラスローション10

エアコンやアルミサッシによる住環境の密閉化により、季節にかかわらず皮膚が乾燥しやすい状況におかれています。また、年齢や体質、栄養のバランスなどにより、皮脂の分泌が低下したり、皮膚の表面にある角質層に水分を保持するはたらきが弱くなることがあります。このような場合、皮膚はうるおいをなくし、カサカサの「乾燥性皮膚」になりがちです。乾燥性皮膚は、気温や湿度の変化、衣類などさまざまな刺激に敏感になり、かゆみを起こしやすくなります。特に気温が低く、空気が乾燥する冬季に多く発症し、夜間にかゆみがひどくなるのが特徴です。

## ●ウレパール プラス ローション10の特徴

乾燥性皮膚に伴うかゆみを鎮めると同時に、皮膚をしっとりなめらかにします。
広い範囲に塗りやすいローションタイプで、しっとりなのにベタつかず、服がすぐに着られます。

**乾燥対策**




尿素が
乾燥した皮膚に
水分を集め、
逃さないように
します。

＋

**かゆみ止め対策**




かゆみ止め成分
ジフェンヒドラミン塩酸塩、
リドカインが
しつこいかゆみを
鎮めます。

## ●こんなカサカサ皮膚に効果があります。



お風呂上がりや就寝中など
体が温まってかゆい時に。



うで、あし、腰、背中などが
カサついてかゆい時に。



衣類などの刺激で
かゆい時に。



お子様のかゆみを伴う
カサついた皮膚に。

## ⚠ 使用上の注意

**⊗ してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

**次の部位には使用しないでください。**

(1) 目のまわり、粘膜(例えば口腔、鼻腔、膣等)など
(2) 炎症又は傷のある患部
(3) ただれやひび割れのひどい患部

**相談すること**

**1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)又は刺激症状を起こしたことがある人

**2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

| 関係部位 | 症　　状 |
|---|---|
| 皮　膚 | かぶれ、発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、ぴりぴり感)、はれ、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態 |

**3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

プラスは登録商標です。

**[効能・効果]**

かゆみを伴う乾燥性皮膚(老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮膚)

○老人・成人の乾皮症とは…皮脂の分泌低下により全身の皮膚が乾燥し、うるおいがなくなります。特にひざから足首までの部分、おしりの部分などに多く見られ、しばしばかゆみを伴います。

○小児の乾燥性皮膚とは…主に毛孔(毛穴)に一致した鳥肌様のザラザラと乾燥した皮膚で、かゆみを伴います。一般に冬に悪くなり、夏に軽くなります。

**[用法・用量]**

1日1～数回、適量を患部に塗布します。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(3)本剤は外用にのみ使用してください。
(4)患部やその周辺の汚れを落としてから使用してください。
(5)定められた用法・用量を守ってください。
(6)化粧品ではないので、効能・効果で定められた患部のみに使用し、基礎化粧等の目的で顔面には使用しないでください。

**[成分]**

100mL中に次の成分を含有します。
尿素10.0g、リドカイン2.0g、ジフェンヒドラミン塩酸塩1.0g
なお、添加物としてグリセリン、セバシン酸ジイソプロピル、乳酸、乳酸Na、ヒドロキシプロピルセルロース、精製水、香料、エタノールを含有します。

**[保管及び取扱い上の注意]**

(1)高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
(2)小児の手のとどかない所に保管してください。
(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
(4)燃える性質がありますので、火気に近づけないでください。
(5)使用済の容器は火中に投じないでください。
(6)アルコール等に溶けるおそれのあるもの(メガネのわく、塗装家具等)には、本剤がつかないようにしてください。
(7)本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
(8)外箱及び容器に表示の使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

**[包装]**

110mL プラスチック瓶入り

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

連絡先　大鵬薬品工業株式会社 お客様相談室
〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27
電話番号 0120-4527-66　受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

**副作用被害救済制度のお問い合わせ先**

副作用被害救済制度とは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局などで購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用により、入院が必要な程度の疾病や障害などの健康被害を受けた方に対して、医療費等の救済給付を行う公的な制度です。

(独)医薬品医療機器総合機構
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話0120-149-931 (フリーダイヤル)

販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27

製造販売元
岡山大鵬薬品株式会社
岡山県備前市久々井字沖1775-1

2025.03　UL250502

## ウレパールプラスローション 10

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 名　　称 | ウレパールプラスローション10 |
| 2 | 成分・分量 | 100mL 中<br>尿素 …… 10.0g<br>リドカイン …… 2.0g<br>ジフェンヒドラミン塩酸塩 …… 1.0g |
| 3 | 用法・用量 | 1日1～数回、適量を患部に塗布します |
| 4 | 効能･効果 | かゆみを伴う乾燥性皮膚（老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮膚） |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために必要な事項 | 次の部位には使用しないでください<br>（1）目のまわり、粘膜（例えば口腔、鼻腔、膣等）など<br>（2）炎症又は傷のある患部<br>（3）ただれやひび割れのひどい患部<br>次に該当する人はお申し出ください<br>・医師の治療を受けている人<br>・薬などによりアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）又は刺激症状を起こしたことがある人 |
| 6 | 薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項 | |

［注意事項］

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。



2026年9月作成

## 生薬製剤

# 販売名：扁鵲（へんせき）

### ●1箱（2g×21包）




| 包　　装 | 1箱（2g×21包） | 内装［（2g×21包）×10箱］ | 梱［（2g×21包）×10箱×6］ |
|---|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 33×83×153 | 172×174×159 | 360×540×180 |
| 重量（g） | 77 | 860 | 5700 |
| 使用期限 | 5年 | | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 2,185円 | 21,850円 | 131,100円 |
| JANコード | 4987117 670448 | 4987117 670455 | 4987117 670462 |
| ITFコード | — | — | 1 4987117 670469 |

### ●1箱（2g×60包）




| 包　　装 | 1箱（2g×60包） | 内装［（2g×60包）×4箱］ | 梱［（2g×60包）×4箱×6］ |
|---|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 70×84×154 | 172×141×158 | 360×435×180 |
| 重量（g） | 197 | 840 | 5700 |
| 使用期限 | 5年 | | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 5,520円 | 22,080円 | 132,480円 |
| JANコード | 4987117 670417 | 4987117 670424 | 4987117 670431 |
| ITFコード | — | — | 1 4987117 670438 |

### 参考画像




アルミ包装



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ（単位：mm）



2026年9月作成

2020年１月改訂

**第２類医薬品**

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

生薬製剤

# 扁鵲
へんせき

**特徴** 11種類の生薬が脂肪過多症に効く。

## ⚠【使用上の注意】

### ⊗してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

**授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。**

### 相談すること

**1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

（1）医師の治療を受けている人
（2）妊婦又は妊娠していると思われる人
（3）体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
（4）胃腸が弱く下痢しやすい人
（5）今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
（6）次の医薬品を服用している人
　瀉下薬（下剤）

**2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

| 関係部位 | 症　　状 |
|---|---|
| 皮　　膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消 化 器 | はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛、便秘、吐き気・嘔吐 |
| そ の 他 | むくみ |

**3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

軟便、下痢

**4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

## 効能・効果

脂肪過多症

## 用法・用量

食間に水又はお湯にて服用します。

| 年 齢 | 1 回 量 | 1日服用回数 |
|---|---|---|
| 成 人（16歳以上） | 1 包 | 3 回 |
| 7～15歳 | 1/2包 | |
| 7歳未満 | 服用しないでください | |

食間とは食事と食事の間という意味で、食後2~3時間を指します。

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成分・分量

本品3包（6g）中、下記生薬を含有します。

タクシャ末…0.86g　ダイオウ末…0.43g　ショウキョウ末…0.43g
カンゾウ末…0.43g　ケイヒ末…0.43g　シャクヤク末…0.43g
ボタンピ末…0.43g　チョレイ末…0.86g　サイコ末…0.86g
ハンゲ末…0.43g　ショウマ末…0.43g

添加物は含有していません。


タクシャ（沢瀉）


ダイオウ（大黄）


ショウキョウ（生姜）


カンゾウ（甘草）


ケイヒ（桂皮）


シャクヤク（芍薬）


ボタンピ（牡丹皮）


チョレイ（猪苓）


サイコ（柴胡）


ハンゲ（半夏）


ショウマ（升麻）

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

## 保管及び取扱い上の注意

（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
（2）小児の手の届かない所に保管してください。
（3）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
（4）1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
（5）使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

## 包 装

1包（2g）×21包、1包（2g）×60包

## お問い合わせ先

お問い合わせはお買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

**連絡先**　大鵬薬品工業株式会社 お客様相談室
〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27
電話番号：0120-4527-66　受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）
ホームページ：https://www.taiho.co.jp/

販売元　大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27

製造販売元　株式会社 建林松鶴堂
埼玉県戸田市戸田公園3－7

2001GA

扁鵲

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 名　　称 | 扁鵲（ヘンセキ） |
| 2 | 成分・分量 | 3包（6g）中<br>タクシャ末 …… 0.86g<br>ダイオウ末 …… 0.43g<br>ショウキョウ末 …… 0.43g<br>カンゾウ末 …… 0.43g<br>ケイヒ末 …… 0.43g<br>シャクヤク末 …… 0.43g<br>ボタンピ末 …… 0.43g<br>チョレイ末 …… 0.86g<br>サイコ末 …… 0.86g<br>ハンゲ末 …… 0.43g<br>ショウマ末 …… 0.43g |
| 3 | 用法・用量 | 食間に水又はお湯にて服用します |
| 4 | 効能･効果 | 脂肪過多症 |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために必要な事項 | 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください<br>次に該当する人はお申し出ください<br>・医師の治療を受けている人<br>・妊婦又は妊娠していると思われる人<br>・体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）<br>・胃腸が弱く下痢しやすい人<br>・今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人<br>・次の医薬品を服用している人 瀉下薬（下剤） |
| 6 | 薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項 | |

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|---|---|---|
| 成人（16歳以上） | 1包 | 3回 |
| 7～15歳 | 1／2包 | |
| 7歳未満 | 服用しないでください | |

［注意事項］

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。



2026年9月作成

## 生薬製剤

# 販売名：肝生（かんせい）

### ●1袋（2g×1包）




| 包　　装 | 1包（2g） | 内装［(2g×1包)×10］ | 梱［(2g×1包)×10×16］ |
|---|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 125×65×5 | 92×75×131 | 382×315×150 |
| 重量（g） | 3.9 | 59 | 1275 |
| 使用期限 | 5年 | | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 230円 | 2,300円 | 36,800円 |
| JANコード | 4968 4360 | 4987117 219043 | 4987117 219050 |
| ITFコード | — | — | 1 4987117 219033 |

### ●箱（2g×21包）




| 包　　装 | 1箱（2g×21包） | 内装［(2g×21包)×10箱］ | 梱［(2g×21包)×10箱×6］ |
|---|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 33×83×156 | 172×174×159 | 360×540×180 |
| 重量（g） | 77 | 860 | 5700 |
| 使用期限 | 5年 | | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 2,875円 | 28,750円 | 172,500円 |
| JANコード | 4987117 219104 | 4987117 219111 | 4987117 219128 |
| ITFコード | — | — | 1 4987117 219101 |

### ●1箱（2g×60包）




| 包　　装 | 1箱（2g×60包） | 内装［(2g×60包)×4箱］ | 梱［(2g×60包)×4箱×6］ |
|---|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 70×83×154 | 172×141×158 | 360×435×180 |
| 重量（g） | 197 | 840 | 5700 |
| 使用期限 | 5年 | | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 6,900円 | 27,600円 | 165,600円 |
| JANコード | 4987117 219005 | 4987117 219012 | 4987117 219029 |
| ITFコード | — | — | 1 4987117 219002 |

### 参考画像




アルミ包装



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ（単位：mm）



2026年9月作成

2019年11月改訂

第2類医薬品
〈顆粒剤〉

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

生薬製剤

# 肝生
かん　せい

**特徴** 肝臓の機能を正常に近づけます。

## ⚠【使用上の注意】

### ⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

**授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。**

### 相談すること

**1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

（1） 医師の治療を受けている人
（2） 妊婦又は妊娠していると思われる人
（3） 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
（4） 胃腸が弱く下痢しやすい人
（5） 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
（6） 次の医薬品を服用している人
　　瀉下薬（下剤）

**2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

| 関係部位 | 症状 |
|---|---|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症状 |
|---|---|
| 腸間膜静脈硬化症 | 長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。 |

**3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

軟便、下痢

**4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

**5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

## 効能・効果

肝臓機能障害、肝臓肥大、急・慢性肝炎、黄疸、胆のう炎

## 用法・用量

食間に水又はお湯にて服用します。

| 年 齢 | 1回 量 | 1日服用回数 |
|---|---|---|
| 成人（15歳以上） | 1包（2g） | 3回 |
| 15歳未満 | 服用しないでください | |

食間とは食事と食事の間という意味で、食後2～3時間を指します。

## 成分・分量

本品3包（6g）中、下記生薬より製した肝生乾燥エキス2gを含有します。

サンソウニン（酸棗仁）…1.46g　ニンジン（人　参）…1.46g　サンシシ（山梔子）…1.46g
シャゼンシ（車前子）…1.46g　ソウハクヒ（桑白皮）…1.46g　キジツ（枳　実）…1.46g
シュクシャ（縮　砂）…1.46g　ケイヒ（桂　皮）…0.37g　ダイオウ（大　黄）…0.37g
ウバイ（烏　梅）…1.46g　キッピ（橘　皮）…1.46g　ガイヨウ（艾　葉）…1.46g

添加物として乳糖水和物及びカルメロースナトリウムを含有します。


サンソウニン（酸棗仁）


ニンジン（人参）


サンシシ（山梔子）


シャゼンシ（車前子）


ソウハクヒ（桑白皮）


キジツ（枳実）


シュクシャ（縮砂）


ケイヒ（桂皮）


ダイオウ（大黄）


ウバイ（烏梅）


キッピ（橘皮）


ガイヨウ（艾葉）

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

## 保管及び取扱い上の注意

（1）　直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
（2）　小児の手の届かない所に保管してください。
（3）　他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
（4）　使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

## 包 装

1包（2g）×60包、1包（2g）×21包

## お問い合わせ先

お問い合わせはお買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

**連絡先**　大鵬薬品工業株式会社 お客様相談室
〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27
電話番号：0120-4527-66　受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）
ホームページ：https:// www.taiho.co.jp/

販売元　TAIHO　大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27

製造販売元　株式会社 建林松鶴堂
埼玉県戸田市戸田公園3－7

1911EA

## 肝生

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 名　　称 | 肝生（カンセイ） |
| 2 | 成分・分量 | 3包（6g）中、下記生薬より製した肝生乾燥エキス2gを含有します<br>サンソウニン（酸棗仁）…… 1.46g<br>ニンジン（人参）…… 1.46g<br>サンシシ（山梔子）…… 1.46g<br>シャゼンシ（車前子）…… 1.46g<br>ソウハクヒ（桑白皮）…… 1.46g<br>キジツ（枳実）…… 1.46g<br>シュクシャ（縮砂）…… 1.46g<br>ケイヒ（桂皮）…… 0.37g<br>ダイオウ（大黄）…… 0.37g<br>ウバイ（烏梅）…… 1.46g<br>キッピ（橘皮）…… 1.46g<br>ガイヨウ（艾葉）…… 1.46g |
| 3 | 用法・用量 | 食間に水又はお湯にて服用します<br>年齢 / 1回量 / 1日服用回数<br>成人（15歳以上） / 1包（2g） / 3回<br>15歳未満 / 服用しないでください |
| 4 | 効能･効果 | 肝臓機能障害、肝臓肥大、急・慢性肝炎、黄疸、胆のう炎 |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために必要な事項 | 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください<br>次に該当する人はお申し出ください<br>・医師の治療を受けている人<br>・妊婦又は妊娠していると思われる人<br>・体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）<br>・胃腸が弱く下痢しやすい人<br>・今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人<br>・次の医薬品を服用している人 瀉下薬（下剤） |
| 6 | 薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項 | |

［注意事項］

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。



2026年9月作成

## 鎮咳去痰薬

# 販売名：ピタスせきトローチ

### ●1箱（12個）




| 包　　装 | 1箱（12個） | 内装（12個×10箱） | 梱（12個×10箱×10） |
|---|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 12×70×115 | 141×72×119 | 159×250×386 |
| 重量（g） | 23.2 | 264.7 | 3000 |
| 使用期限 | 3年 | | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 805円 | 8,050円 | 80,500円 |
| JANコード | 4519 8625 | 4987117 219173 | 4987117 219180 |
| ITFコード | — | — | 1 4987117 219194 |

### 参考画像




アルミ包装



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ（単位：mm）



2026年9月作成


第2類医薬品
販売名：ピタスせきトローチ
特徴●口腔内殺菌成分・セチルピリジニウム塩化物水和物を配合しており、のどの炎症によるのどの痛み・はれを抑えます。●鎮咳成分・フェノールフタリン酸デキストロメトルファンが咳中枢にはたらいて、つらい咳を抑えます。
使用に際してはこの説明書きをよく読み、本剤とともに保管してください。
[保管及び取扱い上の注意]
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。(4)アルミ袋開封後はすみやかに使用すること。(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
使用上の注意
してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
1.次の人は使用しないこと 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2.本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3.使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと(眠気等があらわれることがある。)
相談すること
1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)次の症状のある人。高熱
2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書きを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
関係部位 症状
皮膚 発疹・発赤、かゆみ
消化器 吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系 めまい
呼吸器 息苦しさ、息切れ
まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。
症状の名称 症状
ショック(アナフィラキシー) 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
3.使用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この説明書きを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。眠気
4.5～6回使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書きを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
S231005
副作用被害救済制度 TEL 0120-149-931
使用期限
製造番号
[効能・効果]せき、たん、のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ
[用法・用量]次の量を口中に含み、かまずにゆっくり溶かして使用すること。
年齢 1回量 1日使用回数 使用間隔
成人(15歳以上) 1個 6回 2時間以上
15歳未満 使用しないこと。
<用法・用量に関連する注意>
(1)定められた用法・用量を厳守すること。
(2)かんだり、のみこんだりしないこと。
[成分]6個(1日使用量)中
成分 含量
フェノールフタリン酸デキストロメトルファン 60mg
グアヤコールスルホン酸カリウム 140mg
セチルピリジニウム塩化物水和物 6mg
添加物:ヒドロキシプロピルセルロース、ポビドン、ブルラン、マクロゴール、L-メントール、タンニン酸、D-ソルビトール、サッカリンNa、ショ糖脂肪酸エステル、スクラロース、銅クロロフィリンNa、香料
<のみこまないために>＊使用例
舌にのせ、口を閉じ、上あごに貼る等により口中でゆっくり溶かしてください
FSC ミックス パッケージ FSC® C172346
製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/
4519 8625
PITAS -ピタス-
大鵬薬品 PITAS
話しながら使える
貼り付くトローチ
咳やたんをおさえる
ぴたっと PITAS
-ピタス-
実物大
移動中
会議中
鑑賞中
販売名:
ピタスせきトローチ
第2類医薬品
セルフメディケーション
税控除対象
12個入り
PITAS

## ピタスせきトローチ

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 名　　称 | ピタスせきトローチ |
| 2 | 成分・分量 | 6個（1日使用量）中<br>フェノールフタリン酸デキストロメトルファン …… 60mg<br>グアヤコールスルホン酸カリウム …… 140mg<br>セチルピリジニウム塩化物水和物 …… 6mg |
| 3 | 用法・用量 | 次の量を口中に含み、かまずにゆっくり溶かして使用してください |
| 4 | 効能･効果 | せき、たん、<br>のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために必要な事項 | 1.次の人は使用しないでください<br>本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人<br>2.本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください<br>他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）<br>次に該当する人はお申し出ください<br>・医師の治療を受けている人<br>・妊婦又は妊娠していると思われる人<br>・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人<br>・高熱の症状のある人<br>3.使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと（眠気等があらわれることがある。） |
| 6 | 薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項 | |

| 年齢 | 1回量 | 1日使用回数 | 使用間隔 |
|---|---|---|---|
| 成人（15歳以上） | 1個 | 6回 | 2時間以上 |
| 15歳未満 | 使用しないこと | | |

［注意事項］

1.本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。

2.情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。

3.使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。



2026年9月作成

# Ⅳ

# 第３類 医 薬 品

添付文書・説明文書集

大鵬薬品

## 滋養強壮剤

# 販売名：チオビタドリンクアイビタス

### ●1本（100mL）




| 包　　装 | 1本（100mL） |
|---|---|
| サイズ（mm） | 胴径45×高さ120 |
| 重量（g） | 208 |
| 使用期限 | 3年 |
| メーカー希望小売価格（税別） | 207円 |
| JANコード | 4987117 439304 |
| ITFコード | — |

### ●1パック（100mL×3本）




| 包　　装 | 1パック（100mL×3本） | 梱（100mL×3本×10） |
|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 45×135×120 | 280×255×130 |
| 重量（g） | 624 | 6512 |
| 使用期限 | 3年 | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 621円 | 6,210円 |
| JANコード | 4987117 439335 | 4987117 439342 |
| ITFコード | — | 1 4987117 439349 |

### ●1箱（100mL×10本）




| 包　　装 | 1箱（100mL×10本） | 梱（100mL×10本×5） |
|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 96×231×122 | 240×492×128 |
| 重量（g） | 2176 | 11196 |
| 使用期限 | 3年 | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 2,070円 | 10,350円 |
| JANコード | 4987117 439311 | 4987117 439328 |
| ITFコード | — | 1 4987117 439325 |

### 参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ（単位：mm）



2026年9月作成

第3類医薬品 チオビタドリンクアイビタス

〔使用上の注意〕相談すること

1. 服用後、皮膚に発疹があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。2. 服用後、下痢があらわれることがあるので、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。3. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。〔効能・効果〕○滋養強壮○虚弱体質○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給 〔用法・用量〕成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用して下さい。●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。●用法・用量を守って下さい。

4 987117 439304

100mL

ガラス:瓶
金 属:キャップ

滋養強壮・虚弱体質・栄養補給

# チオビタ®ドリンク アイビタス

TIOVITA

第3類医薬品

〔成分(1本100mL中)〕タウリン 1000mg、イノシトール 50mg、ニコチン酸アミド 20mg、チアミン硝化物(ビタミンB1)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)15mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)50mg、カルニチン塩化物120mg、無水カフェイン50mg 添加物:白糖、果糖、ブドウ糖、DL-リンゴ酸、没食子酸プロピル、安息香酸Na、pH調整剤、バニリン、エチルバニリン、香料 ●本剤に配合されているビタミンB2により、尿が黄色になることがありますが、心配ありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

L1903

製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/

副作用救済制度 TEL 0120-149-931

使用期限　　製造番号

## チオビタドリンクアイビタス

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第3類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 名　　称 | チオビタドリンクアイビタス |
| 2 | 成分・分量 | 1本（100mL）中<br>タウリン ……1000mg<br>イノシトール …… 50mg<br>ニコチン酸アミド …… 20mg<br>チアミン硝化物（ビタミン$B_1$） …… 10mg<br>リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミン$B_2$）… 15mg<br>ピリドキシン塩酸塩（ビタミン$B_6$）…… 50mg<br>カルニチン塩化物 …… 120mg<br>無水カフェイン…… 50mg |
| 3 | 用法・用量 | 成人（15歳以上）は、1日1回1本（100mL）を服用してください<br>●小児（15歳未満）は服用しないでください |
| 4 | 効能･効果 | 滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給 |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために必要な事項 | |
| 6 | 薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項 | |

［注意事項］

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。



2026年9月作成

## 滋養強壮剤

# 販売名：チオビタドリンクアイビタスゼロ

### ●1本（100mL）




| 包　　装 | 1本（100mL） |
|---|---|
| サイズ（mm） | 胴径45×高さ120 |
| 重量（g） | 208 |
| 使用期限 | 3年 |
| メーカー希望小売価格（税別） | 207円 |
| JANコード | 4987117 439908 |
| ITFコード | — |

### ●1パック（100mL×3本）




| 包　　装 | 1パック（100mL×3本） | 梱（100mL×3本×10） |
|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 45×135×120 | 280×255×130 |
| 重量（g） | 624 | 6512 |
| 使用期限 | 3年 | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 621円 | 6,210円 |
| JANコード | 4987117 439939 | 4987117 439946 |
| ITFコード | — | 1 4987117 439943 |

### ●1箱（100mL×10本）




| 包　　装 | 1箱（100mL×10本） | 梱（100mL×10本×5） |
|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 96×231×122 | 240×492×128 |
| 重量（g） | 2176 | 11196 |
| 使用期限 | 3年 | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 2,070円 | 10,350円 |
| JANコード | 4987117 439915 | 4987117 439922 |
| ITFコード | — | 1 4987117 439929 |

### 参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ（単位：mm）



2026年9月作成

服用に際してはラベルをよく読むこと

⚠ 使用上の注意　相談すること

1. 服用後、皮膚に発疹があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。2. 服用後、下痢があらわれることがあるので、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。3. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

〔効能・効果〕○滋養強壮○虚弱体質○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用して下さい。●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。●用法・用量を守って下さい。

4 987117 439008

100mL

ガラス：瓶
金 属：キャップ

# チオビタ® ドリンク アイビタス ゼロ 0

糖類 ゼロ　カフェイン ゼロ

TIOVITA

販売名:チオビタドリンクアイビタスゼロ

7kcal

第3類医薬品

〔成分(1本100mL中)〕タウリン1000mg、イノシトール50mg、ニコチン酸アミド20mg、チアミン硝化物(ビタミン$B_1$)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミン$B_2$)15mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミン$B_6$)50mg、カルニチン塩化物120mg　添加物:エリスリトール、アセスルファムK、スクラロース、クエン酸、クエン酸Na、没食子酸プロピル、安息香酸Na、pH調整剤、バニリン、エチルバニリン、クエン酸トリエチル、サリチル酸メチル、オイゲノール、香料

●本剤に配合されているビタミン$B_2$により、尿が黄色になることがありますが、心配ありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

製造販売元
TAIHO 大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/

®:登録商標　L1902

副作用救済制度 TEL 0120-149-931

使用期限　　製造番号

## チオビタドリンクアイビタスゼロ

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第3類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 名　　称 | チオビタドリンクアイビタスゼロ |
| 2 | 成分・分量 | 1本（100mL）中<br>タウリン ……1000mg<br>イノシトール …… 50mg<br>ニコチン酸アミド …… 20mg<br>チアミン硝化物（ビタミン$B_1$） …… 10mg<br>リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミン$B_2$） … 15mg<br>ピリドキシン塩酸塩（ビタミン$B_6$） …… 50mg<br>カルニチン塩化物 …… 120mg |
| 3 | 用法・用量 | 成人（15歳以上）は、1日1回1本（100mL）を服用してください<br>●小児（15歳未満）は服用しないでください |
| 4 | 効能･効果 | 滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給 |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために必要な事項 | |
| 6 | 薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項 | |

［注意事項］

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。



2026年9月作成

## 外用鎮痛消炎薬

# 販売名：ゼノールチックE

### ●1箱（33g×1本）




| 包　　装 | 1箱（33g×1本） | 内装［（33g×1本）×10箱］ | 梱［（33g×1本）×10箱×10］ |
|---|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 33×51×141 | 104×175×145 | 365×540×165 |
| 重量（g） | 74 | 794 | 8638 |
| 使用期限 | 3年 | | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 978円 | — | 97,800円 |
| JANコード | 4987117 372052 | — | 4987117 372069 |
| ITFコード | — | — | 1 4987117 372066 |

### 参考画像




33g×1本




製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ（単位：mm）



2026年9月作成

開封口

## サリチル酸メチルが患部に浸透して効きます。

こんな毎日の肩こり、筋肉痛、筋肉疲労に効きます。



毎日の肩こりに



家事などによる肩こりに






筋肉の疲労に

底部のダイヤルを回すと〈薬剤〉が出てきます。
4～5mm出して使用してください。

引火性固体
サリチル酸メチル、
イソプロパノール

箱

袋：PE,PET,金属

販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/

製造販売元
三笠製薬株式会社
東京都練馬区豊玉北2-3-1
Ⓡ:登録商標

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

01L101

ZENOL

ご使用に際して、このパッケージに記載の説明書きをよくお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

### 効能・効果

肩こり、筋肉疲労、筋肉痛、腰痛、関節痛、打撲、捻挫（ねんざ）、しもやけ

### 用法・用量

通常、1日1～数回、適量を患部にすり込んでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)用法・用量を厳守してください。(2)目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(4)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。(5)患部の汗をふきとってから使用してください。(6)容器が直接患部に当たらないように、容器の中の薬剤を4～5mm出してから使用してください。(7)薬剤底部の受け皿が見え、ガタつくようになったら、本剤の使用をやめてください。また、受け皿に残った薬剤は無理に使用しないでください。

### 成分（100g中）

| 成　分 | 含　量 |
|---|---|
| サリチル酸メチル | 17.50g |
| *l*-メントール | 6.00g |
| *dl*-カンフル | 5.00g |
| グリチルレチン酸 | 0.02g |

添加物として、イソプロパノール、香料、ステアリン酸Na、グリセリン、ヒマシ油を含有します。

### 内容量

33g

第3類医薬品

# ゼノール チック E

## 広くグリッとぬれる スリムチック

ZENOL

ゼノール チック E ハードゲル

## 肩こり・筋肉痛に効く

サリチル酸メチル 配合




セルフメディケーション 税控除対象

携帯に便利 スリムチック

販売名：ゼノールチックE

外用鎮痛消炎薬

第3類医薬品

4 987117 372052

製造番号

使用期限

ZENOL

### 使用上の注意

**してはいけないこと**

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

次の部位には使用しないでください。

(1)目の周囲、粘膜等
(2)湿疹、かぶれ、傷口

**相談すること**

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書きを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症　状 |
|---|---|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書きを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 保管及び取扱い上の注意

(1)本剤を火気に近づけないでください。また、使用後は火中に投じないでください。(2)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(3)小児の手の届かない所に保管してください。(4)揮発性がありますので、使用後はキャップをきちんと閉めて、外気にふれないようにしてください。(5)他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）(6)合成樹脂、塗料（家具、塗装床、アクセサリー等）、化繊、絹、皮革等に付着すると変質することがありますのでご注意ください。(7)使用期限が過ぎた製品は、使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても品質保持の点からなるべく速やかに使用してください。

1

## ゼノールチック E

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第3類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 名　　称 | ゼノールチックE |
| 2 | 成分・分量 | 100g中<br>サリチル酸メチル …… 17.50g<br>*l*-メントール …… 6.00g<br>*dl*-カンフル …… 5.00g<br>グリチルレチン酸 …… 0.02g |
| 3 | 用法・用量 | 通常、1日1～数回、適量を患部にすり込んでください |
| 4 | 効能･効果 | 肩こり、筋肉疲労、筋肉痛、腰痛、関節痛、打撲、捻挫（ねんざ）、しもやけ |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために必要な事項 | 次の部位には使用しないでください<br>（1）目の周囲、粘膜等<br>（2）湿疹、かぶれ、傷口<br>次に該当する人はお申し出ください<br>（1）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 |
| 6 | 薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項 | |

［注意事項］

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。



2026年9月作成

# V

# 指定医薬部外品

添付文書・説明文書集

TAIHO 大鵬薬品

## ビタミン含有保健剤

# 販売名：チオビタ・ドリンク

### ●1本（100mL）




| 包　　装 | 1本（100mL） |
|---|---|
| サイズ（mm） | 胴径45×高さ120 |
| 重量（g） | 208 |
| 使用期限 | 3年 |
| メーカー希望小売価格（税別） | 195円 |
| JANコード | 4987117 438710 |
| ITFコード | — |

参考画像



内容液

### ●シュリンクパック（100mL×2本）




| 包　　装 | 1パック（100mL×2本） | 梱（100mL×2本×15） |
|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 45×90×120 | 280×255×130 |
| 重量（g） | 416 | 6512 |
| 使用期限 | 3年 | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 390円 | 5,850円 |
| JANコード | 4987117 438956 | 4987117 438963 |
| ITFコード | — | 1 4987117 438953 |

### ●シュリンクパック（100mL×3本）




| 包　　装 | 1パック（100mL×3本） | 梱（100mL×3本×10） |
|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 45×135×120 | 280×255×130 |
| 重量（g） | 624 | 6512 |
| 使用期限 | 3年 | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 585円 | 5,850円 |
| JANコード | 4987117 438918 | 4987117 438932 |
| ITFコード | — | 1 4987117 438939 |

### ●1箱（100mL×10本）




| 包　　装 | 1箱（100mL×10本） | 梱（100mL×10本×5） |
|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 96×231×122 | 240×492×128 |
| 重量（g） | 2176 | 11196 |
| 使用期限 | 3年 | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 1,950円 | 9,750円 |
| JANコード | 4987117 438741 | 4987117 438802 |
| ITFコード | — | 1 4987117 438809 |

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ（単位：mm）



2026年9月作成

〔保管及び取扱い上の注意〕(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

4 987117 438710

疲労回復・予防に、愛情一本

# TIOVITA

指定医薬部外品

# チオビタ®ドリンク

製造販売元
TAIHO 大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/

服用に際してはラベルをよく読むこと

⚠〔使用上の注意〕相談すること 1.服用後、皮膚に発疹があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。2.服用後、下痢があらわれることがあるので、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。3.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

〔効能・効果〕○疲労の回復・予防○日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防◇疲れやすい、疲れが残る、体力がない、身体が重い、身体がだるい○体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善○病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

〔用法・用量〕成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用すること。●小児(15歳未満)は服用しないこと。●用法・用量を守ること(他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意すること)。

〔成分(1本 100mL 中)〕

| | |
|---|---|
| タウリン | 1000mg |
| イノシトール | 50mg |
| ニコチン酸アミド | 20mg |
| チアミン硝化物(ビタミン$B_1$) | 5mg |
| リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミン$B_2$) | 5mg |
| ピリドキシン塩酸塩(ビタミン$B_6$) | 5mg |
| カルニチン塩化物 | 100mg |
| 無水カフェイン | 50mg |

添加物:果糖ブドウ糖液糖、DL-リンゴ酸、没食子酸プロピル、安息香酸Na、pH調整剤、クエン酸、クエン酸Na、D-ソルビトール、バニリン、エチルバニリン、香料●ビタミン$B_2$により、尿が黄色になることがありますが、心配ありません。

ガラス:瓶
金 属:キャップ

使用期限　　製造番号

®:登録商標 L1906

100mL
70kcal

## ビタミン含有保健剤

# 販売名：チオビタドリンク2000

### ●1本（100mL）




| 包　　装 | 1本（100mL） |
|---|---|
| サイズ（mm） | 胴径45×高さ120 |
| 重量（g） | 208 |
| 使用期限 | 3年 |
| メーカー希望小売価格（税別） | 207円 |
| JANコード | 4987117 439106 |
| ITFコード | — |

### ●1パック（100mL×3本）




| 包　　装 | 1パック（100mL×3本） | 梱（100mL×3本×10） |
|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 45×135×120 | 280×255×130 |
| 重量（g） | 624 | 6512 |
| 使用期限 | 3年 | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 621円 | 6,210円 |
| JANコード | 4987117 439205 | 4987117 439212 |
| ITFコード | — | 1 4987117 439219 |

### ●1箱（100mL×10本）




| 包　　装 | 1箱（100mL×10本） | 梱（100mL×10本×5） |
|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 96×231×122 | 240×492×128 |
| 重量（g） | 2176 | 11196 |
| 使用期限 | 3年 | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 2,070円 | 10,350円 |
| JANコード | 4987117 439113 | 4987117 439120 |
| ITFコード | — | 1 4987117 439127 |

### 参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ（単位：mm）



2026年9月作成

チオビタドリンク2000 指定医薬部外品

服用に際してはラベルをよく読むこと

⚠ 使用上の注意 相談すること

1.次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。(1)服用後、発疹があらわれた場合、(2)しばらく服用しても症状がよくならない場合 2.下痢があらわれることがあるので、下痢の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。〔**効能・効果**〕○滋養強壮○虚弱体質○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給〔**用法・用量**〕成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用して下さい。●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。●用法・用量を守って下さい(他のビタミン等を含有する製剤を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意して下さい)。

4 987117 439106

滋養強壮・虚弱体質・栄養補給

# TIOVITA 2000

指定医薬部外品

# チオビタ®ドリンク2000

製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/

〔**成分1本(100mL)中**〕タウリン2000mg・イノシトール50mg・ニコチン酸アミド20mg・チアミン硝化物(ビタミンB1)5mg・リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)5mg・ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)5mg・カルニチン塩化物100mg・無水カフェイン50mg 添加物:白糖・果糖・ブドウ糖・DL-リンゴ酸・没食子酸プロピル・安息香酸Na・pH調整剤・バニリン・香料●本剤に配合されているビタミンB2により、尿が黄色になることがありますが、心配ありません。〔**保管及び取扱い上の注意**〕(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

®:登録商標 L1905

100mL ガラス:瓶 金 属:キャップ

使用期限 製造番号

## 健胃清涼剤

# 販売名：ソルマック胃腸液プラスR

### ●1本（50mL）




| 包　　装 | 1本（50mL） |
|---|---|
| サイズ（mm） | 胴径44×高さ105 |
| 重量（g） | 135 |
| 使用期限 | 3年 |
| メーカー希望小売価格（税別） | 398円 |
| JANコード | 4520 9680 |
| ITFコード | — |

### ●1箱（50mL×8本）




| 包　　装 | 1箱（50mL×8本） | 梱（50mL×8本×6） |
|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 89×177×107 | 280×365×115 |
| 重量（g） | 1145 | 7100 |
| 使用期限 | 3年 | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 3,184円 | 19,104円 |
| JANコード | 4987117 400427 | 4987117 400434 |
| ITFコード | — | 1 4987117 400417 |

### 参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ（単位：mm）



2026年9月作成


服用に際してはラベルをよく読むこと
使用上の注意 相談すること
1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
●医師の治療を受けている人
2.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
■効能・効果:食べ過ぎ又は飲み過ぎによる胃部不快感及びはきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心)
■用法・用量:成人(15歳以上)1日1回1本(50mL)を食前または食間に服用して下さい。
●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。●用法・用量を守って下さい。
販売名:ソルマック胃腸液プラスR
■成分 1本(50mL)中
ウコンエキス30mg(鬱金300mgに相当)、エンメイソウエキス15.46mg(延命草201mgに相当)、ニンジンエキス90.4mg(人参606mgに相当)、ケイヒ油1.5mg、チョウジ油5mg、カルニチン塩化物120mg、グリチルリチン酸二ナトリウム7.2mg
添加物:果糖、ブドウ糖、l-メントール、安息香酸Na、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、pH調整剤、安息香酸ベンジル、エタノール、フェノール類(オイゲノール)、香料
(アルコール0.005mL以下)
●生薬成分を含むため、沈澱を生じることがあるので、よく振ってから服用して下さい。
ソルマック®
胃腸液プラスR
二日酔・胃のむかつきに
指定医薬部外品
[保管及び取扱い上の注意]
(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
TAIHO
製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/
SOLMACK
50mL L2501
使用期限
ガラス:瓶
金属:キャップ
製造番号
Made in JAPAN
4520980

## 健胃清涼剤

# 販売名：ソルマック5

### ●1本（50mL）




| 包　　装 | 1本（50mL） |
|---|---|
| サイズ（mm） | 胴径44×高さ105 |
| 重量（g） | 135 |
| 使用期限 | 3年 |
| メーカー希望小売価格（税別） | 350円 |
| JANコード | 4514 4653 |
| ITFコード | — |

### ●1箱（50mL×2本）




| 包　　装 | 1箱（50mL×2） | 梱（50mL×2×24） |
|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 44×88×108 | 377×275×123 |
| 重量（g） | 288 | 7210 |
| 使用期限 | 3年 | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 700円 | 16,800円 |
| JANコード | 4987117 396201 | 4987117 396218 |
| ITFコード | — | 1 4987117 396208 |

### ●1箱（50mL×8本）




| 包　　装 | 1箱（50mL×8本） | 梱（50mL×8本×6） |
|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 89×177×107 | 280×365×115 |
| 重量（g） | 1145 | 7100 |
| 使用期限 | 3年 | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 2,800円 | 16,800円 |
| JANコード | 4987117 396065 | 4987117 396072 |
| ITFコード | — | 1 4987117 396055 |

### 参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ（単位：mm）



2026年9月作成


服用に際してはラベルをよく読むこと
使用上の注意 相談すること
1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
●医師の治療を受けている人
2.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
■効能・効果:食べ過ぎ又は飲み過ぎによる胃部不快感及びはきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心)
■用法・用量:成人(15歳以上)1日1回1本(50mL)を食前に服用して下さい。
●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。●用法・用量を守って下さい。
販売名:ソルマック5
■成分 1本(50mL)中
ウコンエキス200mg(鬱金2000mgに相当)、コウジンエキス83.3mg(紅参333.2mgに相当)、ソヨウエキス37mg(蘇葉333mgに相当)、チョウジ油(丁子油)5mg、グリチルリチン酸ニカリウム7.2mg
添加物:グリセリン、果糖、プロピレングリコール、ブドウ糖、ポビドン、クエン酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、l-メントール、安息香酸Na、pH調整剤、バニリン、香料
●生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用して下さい。
ソルマック®
飲む前・食べる前に
サキノミ
指定医薬部外品
[保管及び取扱い上の注意]
(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
製造販売元
TAIHO 大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/
50mL L2403
ガラス:瓶
金属:キャップ
使用期限
製造番号
4514474653

## 口腔咽喉薬

# 販売名：ピタスのどトローチ

### ●1箱（12個）




| 包　　装 | 1箱（12個） | 内装（12個×10箱） | 梱（12個×10箱×10） |
|---|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 12×70×115 | 141×72×119 | 159×250×386 |
| 重量（g） | 23.2 | 264.7 | 3000 |
| 使用期限 | 3年 | | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 575円 | 5,750円 | 57,500円 |
| JANコード | 4519 8618 | 4987117 219142 | 4987117 219159 |
| ITFコード | — | — | 1 4987117 219163 |

### 参考画像




アルミ包装



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ（単位：mm）



2026年9月作成


指定医薬部外品
販売名:ピタスのどトローチ
使用に際してはこの説明書きをよく読み、本剤とともに保管してください。
使用上の注意
相談すること
1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)本人又は家族がアレルギー体質の人。(4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書きを持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること
(1)使用後、次の症状があらわれた場合。皮ふ:発疹・発赤、かゆみ
(2)1週間使用しても症状がよくならない場合。
【効能・効果】
● のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ
● 口腔内の殺菌・消毒 ● 口臭の除去
【用法・用量】次の量を口中に含み、かまずにゆっくり溶かして使用すること。
年齢 | 1回量 | 1日使用回数
成人(15歳以上) | 1個 | 4~6回
15歳未満 | 使用しないこと。
<用法・用量に関連する注意>
(1)定められた用法・用量を厳守すること。(2)かんだり、のみこんだりしないこと。
【成分】6個中
成分 | 含量
セチルピリジニウム塩化物水和物 | 8.28mg
添加物:ヒドロキシプロピルセルロース、スクラロース、ポビドン、プルラン、マクロゴール、l-メントール、タンニン酸、D-ソルビトール、サッカリンNa、ショ糖脂肪酸エステル、香料、赤色102号、黄色5号
【保管及び取扱い上の注意】
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
(2)小児の手の届かない所に保管すること。
(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
(4)アルミ袋開封後はすみやかに使用すること。
(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
<のみこまないために>*使用例
舌にのせ、口を閉じ、上あごに貼る等により口中でゆっくり溶かしてください
製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/
紙
S210403
使用期限
製造番号
4519 8618
PITAS -ピタス-
大鵬薬品 PITAS
話しながら使える
貼り付くトローチ
のどの痛み
はれに効く
ぴたっと
PITAS
-ピタス-
ピーチ風味
実物大
会議中
接客中
電話中
販売名:
ピタスのどトローチ
指定医薬部外品
12個入り
PITAS

## 口腔咽喉薬

# 販売名：ピタスのどトローチ〇

### ●1箱（12個）




| 包　　装 | 1箱（12個） | 内装（12個×10箱） | 梱（12個×10箱×10） |
|---|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 12×70×115 | 141×72×119 | 159×250×386 |
| 重量（g） | 23.2 | 264.7 | 3000 |
| 使用期限 | 3年 | | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 575円 | 5,750円 | 57,500円 |
| JANコード | 4520 9604 | 4987117 219500 | 4987117 219517 |
| ITFコード | — | — | 1 4987117 219521 |

### 参考画像




アルミ包装



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ（単位：mm）


指定医薬部外品
販売名:ピタスのどトローチ0
使用に際してはこの説明書きをよく読み、本剤とともに保管してください。
使用上の注意
相談すること
1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)本人又は家族がアレルギー体質の人。(4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書きを持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること
(1)使用後、次の症状があらわれた場合。皮ふ:発疹・発赤、かゆみ
(2)1週間使用しても症状がよくならない場合。
【効能・効果】
● のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ
● 口腔内の殺菌・消毒 ● 口臭の除去
【用法・用量】次の量を口中に含み、かまずにゆっくり溶かして使用すること。
年齢 | 1回量 | 1日使用回数
成人(15歳以上) | 1個 | 4~6回
15歳未満 | 使用しないこと。
<用法・用量に関連する注意>
(1)定められた用法・用量を厳守すること。(2)かんだり、のみこんだりしないこと。
【成分】6個中
成分 | 含量
セチルピリジニウム塩化物水和物 | 8.28mg
添加物:ヒドロキシプロピルセルロース、スクラロース、ポビドン、プルラン、マクロゴール、l-メントール、タンニン酸、D-ソルビトール、サッカリンNa、ショ糖脂肪酸エステル、dl-a-トコフェロール、香料、赤色102号、黄色5号
【保管及び取扱い上の注意】
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
(2)小児の手の届かない所に保管すること。
(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
(4)アルミ袋開封後はすみやかに使用すること。
(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
<のみこまないために>*使用例
舌にのせ、口を閉じ、上あごに貼る等により口中でゆっくり溶かしてください
製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/
S210403
使用期限
製造番号
4520 9604
PITAS -ピタス-
大鵬薬品 PITAS
話しながら使える
貼り付くトローチ
のどの痛み
はれに効く
ぴたっと
PITAS
-ピタス-
オレンジ風味
実物大
会議中
接客中
電話中
販売名:
ピタスのどトローチ0
指定医薬部外品
12個入り
PITAS

## 口腔咽喉薬

# 販売名：ピタスのどトローチL

### ●1箱（12個）




| 包　　装 | 1箱（12個） | 内装（12個×10箱） | 梱（12個×10箱×10） |
|---|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 12×70×115 | 141×72×119 | 159×250×386 |
| 重量（g） | 23.2 | 264.7 | 3000 |
| 使用期限 | 3年 | | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 575円 | 5,750円 | 57,500円 |
| JANコード | 4520 9611 | 4987117 219609 | 4987117 219616 |
| ITFコード | — | — | 1 4987117 219620 |

### 参考画像




アルミ包装



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ（単位：mm）



2026年9月作成


指定医薬部外品
販売名:ピタスのどトローチL
使用に際してはこの説明書きをよく読み、本剤とともに保管してください。
使用上の注意
相談すること
1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)本人又は家族がアレルギー体質の人。(4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書きを持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること
(1)使用後、次の症状があらわれた場合。皮ふ:発疹・発赤、かゆみ
(2)1週間使用しても症状がよくならない場合。
【効能・効果】
● のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ
● 口腔内の殺菌・消毒 ● 口臭の除去
【用法・用量】次の量を口中に含み、かまずにゆっくり溶かして使用すること。
年齢 | 1回量 | 1日使用回数
成人(15歳以上) | 1個 | 4~6回
15歳未満 | 使用しないこと。
<用法・用量に関連する注意>
(1)定められた用法・用量を厳守すること。(2)かんだり、のみこんだりしないこと。
【成分】6個中
成分 | 含量
セチルピリジニウム塩化物水和物 | 8.28mg
添加物:ヒドロキシプロピルセルロース、スクラロース、ポビドン、プルランマクロゴール、l-メントール、タンニン酸、D-ソルビトール、サッカリンNa、ショ糖脂肪酸エステル、安息香酸ベンジル、バニリン、香料、赤色102号、黄色5号
【保管及び取扱い上の注意】
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
(2)小児の手の届かない所に保管すること。
(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
(4)アルミ袋開封後はすみやかに使用すること。
(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
<のみこまないために>*使用例
舌にのせ、口を閉じ、上あごに貼る等により口中でゆっくり溶かしてください
製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/
S210403
使用期限
製造番号
4520 9611
PITAS ピタス
大鵬薬品 PITAS
話しながら使える
貼り付くトローチ
のどの痛み
はれに効く
ぴたっと
PITAS
ピタス
ライチ風味
実物大
会議中
接客中
電話中
販売名:
ピタスのどトローチL
指定医薬部外品
12個入り
PITAS

## 口腔咽喉薬

# 販売名：ピタスクールトローチS

### ●1箱（12個）




| 包　　装 | 1箱（12個） | 内装（12個×10箱） | 梱（12個×10箱×10） |
|---|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 12×70×115 | 141×72×119 | 159×250×386 |
| 重量（g） | 23.2 | 264.7 | 3000 |
| 使用期限 | 3年 | | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 633円 | 6,330円 | 63,300円 |
| JANコード | 4520 9642 | 4987117 219906 | 4987117 219913 |
| ITFコード | — | — | 1 4987117 219927 |

### 参考画像




アルミ包装



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ（単位：mm）



2026年9月作成


大鵬薬品 PITAS
話しながら使える
貼り付くトローチ
クールな息で
さわやかに
使用感ストロング
PITAS
ーピタスー
ミント風味
実物大
仕事中
マスクの中も爽快に
デート中
販売名:
ピタスクールトローチS
指定医薬部外品
12個入り
PITAS
PITAS ーピタスー
指定医薬部外品
販売名:ピタスクールトローチS
使用に際してはこの説明書きをよく読み、本剤とともに保管してください。
使用上の注意
相談すること
1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)本人又は家族がアレルギー体質の人。(4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書きを持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること
(1)使用後、次の症状があらわれた場合。皮ふ:発疹・発赤、かゆみ
(2)1週間使用しても症状がよくならない場合。
【効能・効果】
● 口臭の除去 ● 口腔内の殺菌・消毒
● のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ
【用法・用量】次の量を口中に含み、かまずにゆっくり溶かして使用すること。
年齢 | 1回量 | 1日使用回数
成人(15歳以上) | 1個 | 4~6回
15歳未満 | 使用しないこと。
<用法・用量に関連する注意>
(1)定められた用法・用量を厳守すること。(2)かんだり、のみこんだりしないこと。
【成分】6個中
成分 | 含量
セチルピリジニウム塩化物水和物 | 8.28mg
添加物:ヒドロキシプロピルセルロース、スクラロース、ポビドン、プルラン、マクロゴール、dl-メントール、ハッカ油、タンニン酸、D-ソルビトール、サッカリンNa、ショ糖脂肪酸エステル、銅クロロフィリンNa、香料
【保管及び取扱い上の注意】
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
(2)小児の手の届かない所に保管すること。
(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
(4)アルミ袋開封後はすみやかに使用すること。
(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
<のみこまないために>*使用例
舌にのせ、口を閉じ、上あごに貼る等により口中でゆっくり溶かしてください
製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/
紙
S210301
使用期限
製造番号
4520 9642

## 口腔咽喉薬

# 販売名：ピタスメディカルトローチ

### ●1箱（12個）




| 包　　装 | 1箱（12個） | 内装（12個×10箱） | 梱（12個×10箱×10） |
|---|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 12×70×115 | 141×72×119 | 159×250×386 |
| 重量（g） | 23.2 | 264.7 | 3000 |
| 使用期限 | 3年 | | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 633円 | 6,330円 | 63,300円 |
| JANコード | 4987117 220025 | 4987117 220001 | 4987117 220018 |
| ITFコード | — | — | 1 4987117 220022 |

### 参考画像




アルミ包装



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ（単位：mm）



2026年9月作成


指定医薬部外品
販売名:ピタスメディカルトローチ
使用に際してはこの説明書きをよく読み、本剤とともに保管してください。
使用上の注意
相談すること
1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)本人又は家族がアレルギー体質の人。(4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書きを持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること
(1)使用後、次の症状があらわれた場合。皮ふ:発疹・発赤、かゆみ
(2)1週間使用しても症状がよくならない場合。
【効能・効果】
●口腔内の殺菌・消毒●のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ●口臭の除去
【用法・用量】次の量を口中に含み、かまずにゆっくり溶かして使用すること。
年齢 | 1回量 | 1日使用回数
成人(15歳以上) | 1個 | 4~6回
15歳未満 | 使用しないこと。
<用法・用量に関連する注意>
(1)定められた用法・用量を厳守すること。(2)かんだり、のみこんだりしないこと。
【成分】6個中
成分 | 含量
セチルピリジニウム塩化物水和物 | 8.28mg
添加物:ヒドロキシプロピルセルロース、スクラロース、ポビドン、プルラン、マクロゴール、l-メントール、タンニン酸、D-ソルビトール、サッカリンNa、ショ糖脂肪酸エステル、クエン酸水和物、赤色102号、エチルバニリン、バニリン、香料
【保管及び取扱い上の注意】
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
(2)小児の手の届かない所に保管すること。
(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
(4)アルミ袋開封後はすみやかに使用すること。
(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
<のみこまないために>*使用例
舌にのせ、口を閉じ、上あごに貼る等により口中でゆっくり溶かしてください
製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/
紙
S220301
使用期限
製造番号
PITAS -ピタス-
大鵬薬品
PITAS
話しながら使えるお口がうるおう
貼り付くトローチ
お口の中を殺菌・消毒
ぴたっと
PITAS
-ピタス-
ウメ風味
実物大
殺菌剤CPC配合
移動中
接客中
販売名:
ピタスメディカルトローチ
指定医薬部外品
12個入り
PITAS

# Ⅵ

# その他

添付文書・説明文書集

TAIHO 大鵬薬品

## 抗菌・ウイルス除去スプレー

# 製品名: Efil エフィル

### ●1袋（50mL×1本）




| 包　　装 | 1本（50mL） | 内装（50mL×1本）×8 | 梱（50mL×8×6） |
|---|---|---|---|
| サイズ（mm） ※1 | 20×82×205 | 55×265×208 | 275×354×223 |
| 重量（g） | 84 | 746 | 4908 |
| 使用期限 | — | | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 800円 | — | 38,400円 |
| JANコード | 4987117 172102 | — | 4987117 172119 |
| ITFコード | — | — | 1 4987117 172109 |

### ●1箱（300mL×1本）




| 包　　装 | 1本（300mL） | 内装（300mL×1本）×6 | 梱（300mL×6×3） |
|---|---|---|---|
| サイズ（mm） ※1 | 77×91×212 | 161×282×221 | 291×503×260 |
| 重量（g） | 399 | 2574 | 8502 |
| 使用期限 | — | | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 1,500円 | — | 27,000円 |
| JANコード | 4987117 172126 | — | 4987117 172133 |
| ITFコード | — | — | 1 4987117 172123 |

### 参考画像




50mL×1本




300mL×1本

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ（単位：mm）



2026年9月作成


外出先でも！
大鵬薬品
菌・ウイルスを取り除く
だけでなく、寄せ付けない
24時間
離菌バリア
ウイルス除去・抗菌スプレー
Efil
TURN YOUR LIFE AROUND
エフィル
ウイルス除去・除菌
抗ウイルス・抗菌
消臭
マスク
スマートフォン
テーブル
トイレ
みずみずしいアクアの香り
※すべての菌・ウイルスに対して効果があるわけではありません。
また、使用環境や保存環境により持続効果は異なる可能性があります。


MADE IN JAPAN
Efil【エフィル】
ウイルス除去・抗菌スプレー
S200503
外袋：PP,PET
内容量:50mL
(約400プッシュ)
特徴
■独自の技術で銀イオン、亜鉛イオンとエタノールを同時に配合し、菌やウイルスに対して優れた即効性・持続性・消臭力を実現。
■抗菌・抗ウイルス効果が24時間持続することで、菌・ウイルスを寄せ付けません(＝離菌)。
■塩素成分は含まれておりません。
■各種試験により有効性と安全性を確認しております。
※すべての菌・ウイルスに対して効果があるわけではありません。また、使用環境や保存環境により持続効果は異なる可能性があります。効果は噴射液がついた部分に限られます。
成分
エタノール、精製水、イソプロパノール、グリセリン、銀化合物、除菌成分(有機系)、亜鉛化合物、香料
WEBサイトはこちら
使用上の注意
1.本品は手指などの人体・ペットには使用しないでください。2.用途以外には使用しないでください。3.一部の金属等、材質によっては変質(変色)する恐れがあるため、注意してください。4.汚れが原因のニオイは、使用後、汚れから再びニオイが発生することがあります。5.アルコールに弱い人、アレルギー症状やかぶれ等を起こしやすい体質の人は、ミストに触れたり、吸い込まないようにしてください。6.狭い空間で使用する場合は、換気して使用してください。7.塩素系製品と混ざると有毒なガスを発生する恐れがあるので注意してください。8.故障の恐れがあるので、電気機器付近での使用は注意してください。引火の恐れがあるので火気の付近では使用しないでください。9.直射日光や火気および車内など高温になる場所を避け、子どもの手の届かない涼しい所に保管してください。
使えないもの
■革・和装品へは使用不可。毛・絹・レーヨン・アセテート・キュプラなど水に弱い繊維、水洗い不可の表示があるもの、防水、撥水加工など特殊加工されたものはシミになったり、風合いを損ねる恐れがあるので、あらかじめ目立たない部分で試してください。■シミ・変色の原因となるので、白地や淡い色の繊維製品や革製品、白木や桐、水性ワックス・ペンキ・ニス等の塗装部、アクリル製・スチロール製のプラスチック等に使用しないでください。
用途
布製品(衣類、カーペット、布団等寝具、タオル、ベビーカー等)、マスク、室内(床や壁、スイッチ、ドアノブ、トイレ、ベッド柵等)、PC、スマートフォン、嘔吐物、排泄物等。※マスクに使用する場合は外側にスプレーし、着用前によく乾かしてください。※スマートフォンなどの電子機器に使用する場合は、やわらかい布等を使用し、機器に直接吹きつけないでください。使用に際し、機器の説明書をよくご確認ください。
応急処置
■万一誤って飲み込んだ場合は、無理に吐かせず牛乳か水を飲ませるなどの処置をし、医師に相談してください。■万一目に入った場合は、すぐに多量の水で洗い流し、医師に相談してください。
使用方法
付属のキャップを外して使用してください。使用後は、付属のキャップを取り付けてください。【ウイルス除去・除菌・抗ウイルス・抗菌】汚染物を除去した後、約20cm離して表面が全体的に十分濡れる程度にスプレーしてください。スプレー後、しばらく置いてから使用してください。繊維製品については十分に乾いてから使用してください。【消臭】対象物に直接数回スプレーしてください。
製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/
4 987117 172102

銀イオンとエタノールで
## 24時間の持続力！

**Efil** 【エフィル】 ウイルス除去・抗菌スプレー

**特徴**

- 独自の技術で銀イオン、亜鉛イオンとエタノールを同時に配合し、菌やウイルスに対して優れた即効性・持続性・消臭力を実現。
- 抗菌・抗ウイルス効果が24時間持続することで、菌・ウイルスを寄せ付けません（＝離菌）。
- 塩素成分は含まれておりません。
- 各種試験により有効性と安全性を確認しております。

※すべての菌・ウイルスに対して効果があるわけではありません。また、使用環境や保存環境により持続効果は異なる可能性があります。
効果は噴射液がついた部分に限られます。

**成分**

エタノール、精製水、イソプロパノール、グリセリン、銀化合物、除菌成分（有機系）、亜鉛化合物、香料

**使用上の注意**

1. 本品は手指などの人体・ペットには使用しないでください。
2. 用途以外には使用しないでください。
3. 一部の金属等、材質によっては変質（変色）する恐れがあるため、注意してください。
4. 汚れが原因のニオイは、使用後、汚れから再びニオイが発生することがあります。
5. アルコールに弱い人、アレルギー症状やかぶれ等を起こしやすい体質の人は、ミストに触れたり、吸い込まないようにしてください。
6. 狭い空間で使用する場合は、換気して使用してください。
7. 塩素系製品と混ぜると有毒なガスを発生する恐れがあるので注意してください。
8. 故障の恐れがあるので、電気機器付近での使用は注意してください。引火の恐れがあるので火気の付近では使用しないでください。
9. 直射日光や火気および車内など高温になる場所を避け、子どもの手の届かない涼しい所に保管してください。

**使えないもの**

- 革・和装品へは使用不可。毛・絹・レーヨン・アセテート・キュプラなど水に弱い繊維、水洗い不可の表示があるもの、防水、撥水加工など特殊加工されたものはシミになったり、風合いを損ねる恐れがあるので、あらかじめ目立たない部分で試してください。
- シミ・変色の原因となるので、白地や淡い色の繊維製品や革製品、白木や桐、水性ワックス・ペンキ・ニス等の塗装部、アクリル製・スチロール製のプラスチック等に使用しないでください。

**応急処置**

- 万一誤って飲み込んだ場合は、無理に吐かせず牛乳か水を飲ませるなどの処置をし、医師に相談してください。
- 万一目に入った場合は、すぐに多量の水で洗い流し、医師に相談してください。

内容量：300mL（約460プッシュ）

製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/

4 987117 172126

## 効果イメージ

- エタノールの力で 菌・ウイルスを 除去
- 24時間 銀イオンの力で 抗菌・抗ウイルス
- 家でも外でも 寄せ付けない 離菌バリア

## 用途

衣服 / マスク※1 / ドアノブ/手すり / スマートフォン※2 / 嘔吐物 / 介護用品

布製品（衣類、カーペット、布団等寝具、タオル、ベビーカー等）、マスク、室内（床や壁、スイッチ、ドアノブ、トイレ、ベッド柵等）、PC、スマートフォン、嘔吐物、排泄物等に

（※1）マスクに使用する場合は外側にスプレーし、着用前によく乾かしてください。
（※2）スマートフォンなどの電子機器に使用する場合は、やわらかい布等を使用し、機器に直接吹きつけないでください。使用に際し機器の説明書をよくご確認ください。

菌・ウイルスを取り除く
だけでなく、寄せ付けない
# 24時間 離菌バリア
**Efil** エフィル
WEBサイトはこちら

菌・ウイルスを取り除く
だけでなく、寄せ付けない
24時間 離菌バリア

ウイルス除去・抗菌スプレー

**Efil**
TURN YOUR LIFE AROUND
エフィル




みずみずしいアクアの香り

ー 銀イオンとエタノールの力 ー

大鵬薬品

※すべての菌・ウイルスに対して効果があるわけではありません。
また、使用環境や保存環境により持続効果は異なる可能性があります。

## 使用方法


**STEP 1** キャップを外す。


**STEP 2** スプレーヘッドを取り付ける。


**STEP 3** 先端の白いフタをカチッと音がするまで上に上げる。


**STEP 4** 対象物から、約20cm離してスプレーする。


**STEP 5** 使用後はフタをして保管する。


汚れのひどい物は、予め取り除いてからスプレーしてください。

**ウイルス除去・除菌・抗ウイルス・抗菌**
汚染物を除去した後、約20cm離して表面が全体的に十分濡れる程度にスプレーしてください。スプレー後、しばらく置いてから使用してください。繊維製品については十分に乾いてから使用してください。

**消臭**
対象物に直接数回スプレーしてください。

MADE IN JAPAN

S200503 外箱

# Ⅶ

# 特 定 先 用

添付文書・説明文書集

TAIHO 大鵬薬品

## 滋養強壮剤

# 販売名：チオビタドリンクブイスーパー

### ●1本（100mL）




| 包　　装 | 1本（100mL） |
|---|---|
| サイズ（mm） | 胴径45×高さ120 |
| 重量（g） | 208 |
| 使用期限 | 3年 |
| メーカー希望小売価格（税別） | 207円 |
| JANコード | 4987117 450002 |
| ITFコード | — |

### ●1パック（100mL×3本）




| 包　　装 | 1パック（100mL×3本） | 梱（100mL×3本×10） |
|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 45×135×120 | 280×255×130 |
| 重量（g） | 624 | 6512 |
| 使用期限 | 3年 | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 621円 | 6,210円 |
| JANコード | 4987117 450033 | 4987117 450040 |
| ITFコード | — | 1 4987117 450030 |

### ●1箱（100mL×10本）




| 包　　装 | 1箱（100mL×10本） | 梱（100mL×10本×5） |
|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 96×231×122 | 240×492×128 |
| 重量（g） | 2176 | 11196 |
| 使用期限 | 3年 | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 2,070円 | 10,350円 |
| JANコード | 4987117 450019 | 4987117 450026 |
| ITFコード | — | 1 4987117 450009 |

### 参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ（単位：mm）



2026年9月作成

販売名：チオビタドリンクブイスーパー

服用に際してはラベルをよくお読み下さい

⚠ 使用上の注意　相談すること

1.服用後、皮膚に発疹があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。2.服用後、下痢があらわれることがあるので、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。3.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

**〔効能・効果〕**

○滋養強壮○虚弱体質○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

**〔用法・用量〕**

成人（15歳以上）1日1回1本（100mL）を服用して下さい。●小児（15歳未満）は服用しないで下さい。●用法・用量を守って下さい。

100mL

ガラス：瓶
金　属：キャップ

Ⓡ:登録商標　L2002

4 987117 450002

第3類医薬品

滋養強壮・虚弱体質・栄養補給

# チオビタ® ドリンク V super

販売名：チオビタドリンクブイスーパー

TIOVITA

**〔成分（1本100mL中）〕**タウリン2000mg、イノシトール50mg、ニコチン酸アミド20mg、チアミン硝化物（ビタミン$B_1$）10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミン$B_2$）5mg、ピリドキシン塩酸塩（ビタミン$B_6$）50mg、カルニチン塩化物100mg、無水カフェイン50mg 添加物：白糖、果糖、ブドウ糖、クエン酸、クエン酸Na、DL-リンゴ酸、没食子酸プロピル、安息香酸Na、pH調整剤、オイゲノール、香料 ●本剤に配合されているビタミン$B_2$により、尿が黄色になることがありますが、心配ありません。

**〔保管及び取扱い上の注意〕**（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。（2）小児の手の届かない所に保管して下さい。（3）開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わります）。（4）使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/

副作用救済制度　TEL 0120-149-931

使用期限　　製造番号

## チオビタドリンクブイスーパー

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第3類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 名　　称 | チオビタドリンクブイスーパー |
| 2 | 成分・分量 | 1本（100mL）中<br>タウリン ……2000mg<br>イノシトール …… 50mg<br>ニコチン酸アミド …… 20mg<br>チアミン硝化物（ビタミン$B_1$） …… 10mg<br>リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミン$B_2$） … 5mg<br>ピリドキシン塩酸塩（ビタミン$B_6$） …… 50mg<br>カルニチン塩化物 …… 100mg<br>無水カフェイン…… 50mg |
| 3 | 用法・用量 | 成人（15歳以上）は、1日1回1本（100mL）を服用してください<br>●小児（15歳未満）は服用しないでください |
| 4 | 効能･効果 | 滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給 |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために必要な事項 | |
| 6 | 薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項 | |

［注意事項］

1.本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。

2.情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。

3.使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。



2026年9月作成

## 滋養強壮剤

# 販売名：チオビタドリンク2000

### ●1本（100mL）




| 包　　装 | 1本（100mL） |
|---|---|
| サイズ（mm） | 胴径45×高さ120 |
| 重量（g） | 208 |
| 使用期限 | 3年 |
| メーカー希望小売価格（税別） | 207円 |
| JANコード | 4987117 439243 |
| ITFコード | — |

### ●1パック（100mL×3本）




| 包　　装 | 1パック（100mL×3本） | 梱（100mL×3本×10） |
|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 45×135×120 | 280×255×130 |
| 重量（g） | 624 | 6512 |
| 使用期限 | 3年 | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 621円 | 6,210円 |
| JANコード | 4987117 439274 | 4987117 439281 |
| ITFコード | — | 14987117 439288 |

### ●1箱（100mL×10本）




| 包　　装 | 1箱（100mL×10本） | 梱（100mL×10本×5） |
|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 96×231×122 | 240×492×128 |
| 重量（g） | 2176 | 11196 |
| 使用期限 | 3年 | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 2,070円 | 10,350円 |
| JANコード | 4987117 439250 | 4987117 439267 |
| ITFコード | — | 14987117 439264 |

### 参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ（単位：mm）



2026年9月作成

チオビタドリンク2000 指定医薬部外品

服用に際してはラベルをよく読むこと

⚠ 使用上の注意 相談すること

1.次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。(1)服用後、発疹があらわれた場合、(2)しばらく服用しても症状がよくならない場合 2.下痢があらわれることがあるので、下痢の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。**〔効能・効果〕**○滋養強壮○虚弱体質○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給 **〔用法・用量〕** 成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用して下さい。●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。●用法・用量を守って下さい(他のビタミン等を含有する製剤を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意して下さい)。

4 987117 439243

100mL

滋養強壮・虚弱体質・栄養補給

# チオビタ® ドリンク 2000

タウリン2,000mg配合

TIOVITA

指定医薬部外品

**〔成分1本(100mL)中〕** タウリン2000mg、イノシトール50mg、ニコチン酸アミド20mg、チアミン硝化物(ビタミン$B_1$)5mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミン$B_2$)5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミン$B_6$)5mg、カルニチン塩化物100mg、無水カフェイン50mg 添加物:白糖、果糖、ブドウ糖、DL-リンゴ酸、没食子酸プロピル、安息香酸Na、pH調整剤、バニリン、香料 ●本剤に配合されているビタミン$B_2$により、尿が黄色になることがありますが、心配ありません。**〔保管及び取扱い上の注意〕** (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存および他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

ガラス:瓶
金属:キャップ

®:登録商標 L1905

製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/

使用期限 製造番号

ビタミン含有保健剤

# 販売名：チオビタドリンク3000

## ●1本（100mL）




| 包　　装 | 1本（100mL） |
|---|---|
| サイズ（mm） | 胴径45×高さ120 |
| 重量（g） | 208 |
| 使用期限 | 3年 |
| メーカー希望小売価格（税別） | 253円 |
| JANコード | 4987117 438512 |
| ITFコード | — |

## ●1パック（100mL×3本）




| 包　　装 | 1パック（100mL×3本） | 梱（100mL×3本×10） |
|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 45×135×120 | 280×255×130 |
| 重量（g） | 624 | 6512 |
| 使用期限 | 3年 | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 759円 | 7,590円 |
| JANコード | 4987117 438574 | 4987117 438598 |
| ITFコード | — | 1 4987117 438595 |

## ●1箱（100mL×10本）




| 包　　装 | 1箱（100mL×10本） | 梱（100mL×10本×5） |
|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 96×231×122 | 240×492×128 |
| 重量（g） | 2176 | 11196 |
| 使用期限 | 3年 | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 2,530円 | 12,650円 |
| JANコード | 4987117 438543 | 4987117 438604 |
| ITFコード | — | 1 4987117 438601 |

## 参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ（単位：mm）



2026年9月作成

チオビタドリンク3000 指定医薬部外品

服用に際してはラベルをよくお読み下さい

⚠ 使用上の注意 相談すること

1.次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。(1)服用後、発疹があらわれた場合、(2)しばらく服用しても症状がよくならない場合 2.下痢があらわれることがあるので、下痢の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。**〔効能・効果〕**○滋養強壮○虚弱体質○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給 **〔用法・用量〕**成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用して下さい。●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。●用法・用量を守って下さい(他のビタミン等を含有する製剤を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意して下さい)。

4 987117 438512

指定医薬部外品

滋養強壮・虚弱体質・栄養補給

# TIOVITA 3000

つらい疲れに

# チオビタ®ドリンク3000

タウリン3,000mg配合 ビタミン$B_1$・$B_2$・$B_6$10mg配合

製造販売元
TAIHO 大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/

**〔成分(1本100mL中)〕**タウリン3000mg、イノシトール50mg、ニコチン酸アミド20mg、チアミン硝化物(ビタミン$B_1$)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミン$B_2$)10mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミン$B_6$)10mg、カルニチン塩化物100mg、無水カフェイン50mg 添加物:白糖、果糖、ブドウ糖、DL-リンゴ酸、没食子酸プロピル、安息香酸Na、パラベン、pH調整剤、バニリン、香料 ●本剤に配合されているビタミン$B_2$により、尿が黄色になることがありますが、心配ありません。**〔保管及び取扱い上の注意〕**(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

Ⓡ:登録商標 L1905

ガラス:瓶
金 属:キャップ

100mL

使用期限 製造番号

## ビタミン含有保健剤

# 販売名：チオビタドリンク3000ZERO

### ●1本（100mL）




| 包　　装 | 1本（100mL） |
|---|---|
| サイズ（mm） | 胴径45×高さ120 |
| 重量（g） | 208 |
| 使用期限 | 3年 |
| メーカー希望小売価格（税別） | 253円 |
| JANコード | 4987117 440003 |
| ITFコード | — |

### ●1パック（100mL×3本）




| 包　　装 | 1パック（100mL×3本） | 梱（100mL×3本×10） |
|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 45×135×120 | 280×255×130 |
| 重量（g） | 624 | 6512 |
| 使用期限 | 3年 | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 759円 | 7,590円 |
| JANコード | 4987117 440034 | 4987117 440041 |
| ITFコード | — | 1 4987117 440048 |

### ●1箱（100mL×10本）




| 包　　装 | 1箱（100mL×10本） | 梱（100mL×10本×5） |
|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 96×231×122 | 240×492×128 |
| 重量（g） | 2176 | 11196 |
| 使用期限 | 3年 | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 2,530円 | 12,650円 |
| JANコード | 4987117 440010 | 4987117 440027 |
| ITFコード | — | 1 4987117 440024 |

### 参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ（単位：mm）



2026年9月作成

服用に際してはラベルをよくお読み下さい

⚠ 使用上の注意 相談すること

1.次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。(1)服用後、発疹があらわれた場合(2)しばらく服用しても症状がよくならない場合 2.下痢があらわれることがあるので、下痢の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

〔効能・効果〕○滋養強壮○虚弱体質○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用して下さい。●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。●用法・用量を守って下さい(他のビタミン等を含有する製剤を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意して下さい)。

4 987117 440003

ガラス:瓶
金　属:キャップ

Ⓡ:登録商標　L1902

100mL

滋養強壮・虚弱体質・栄養補給

# チオビタ 3000ZERO

## 糖類0ゼロ

TIOVITA

タウリン3,000mg配合 ビタミンB群配合

販売名:チオビタドリンク3000ZERO

14kcal 指定医薬部外品

〔成分(1本100mL中)〕タウリン3000mg、イノシトール50mg、ニコチン酸アミド20mg、チアミン硝化物(ビタミン$B_1$)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミン$B_2$)10mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミン$B_6$)10mg、カルニチン塩化物100mg、無水カフェイン50mg 添加物:エリスリトール、アセスルファムK、スクラロース、クエン酸、クエン酸Na、没食子酸プロピル、安息香酸Na、pH調整剤、香料 ●本剤に配合されているビタミン$B_2$により、尿が黄色になることがありますが、心配ありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

製造販売元
TAIHO 大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/

使用期限　　製造番号

## ビタミン含有保健剤

# 販売名：チオビタドリンク3000ZERO

### ●1本（100mL）




| 包　　装 | 1本（100mL） |
|---|---|
| サイズ（mm） | 胴径45×高さ120 |
| 重量（g） | 208 |
| 使用期限 | 3年 |
| メーカー希望小売価格（税別） | 253円 |
| JANコード | 4987117 440102 |
| ITFコード | — |

### ●1パック（100mL×3本）




| 包　　装 | 1パック（100mL×3本） | 梱（100mL×3本×10） |
|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 45×135×120 | 280×255×130 |
| 重量（g） | 624 | 6512 |
| 使用期限 | 3年 | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 759円 | 7,590円 |
| JANコード | 4987117 440133 | 4987117 440140 |
| ITFコード | — | 1 4987117 440147 |

### ●1箱（100mL×10本）




| 包　　装 | 1箱（100mL×10本） | 梱（100mL×10本×5） |
|---|---|---|
| サイズ（mm）※1 | 96×231×122 | 240×492×128 |
| 重量（g） | 2176 | 11196 |
| 使用期限 | 3年 | |
| メーカー希望小売価格（税別） | 2,530円 | 12,650円 |
| JANコード | 4987117 440119 | 4987117 440126 |
| ITFコード | — | 1 4987117 440123 |

### 参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ（単位：mm）



2026年9月作成

服用に際してはラベルをよくお読み下さい

⚠ 使用上の注意 相談すること

1.次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。(1)服用後、発疹があらわれた場合(2)しばらく服用しても症状がよくならない場合 2.下痢があらわれることがあるので、下痢の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

〔効能・効果〕○滋養強壮○虚弱体質○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用して下さい。●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。●用法・用量を守って下さい(他のビタミン等を含有する製剤を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意して下さい)。

4 987117 440102

ガラス:瓶
金　属:キャップ

Ⓡ:登録商標 L2003

100mL

# チオビタ® 3000 zero

糖類0ゼロ

タウリン 3,000mg配合

グレープ風味

TIOVITA

販売名:チオビタドリンク3000ZERO

指定医薬部外品

〔成分(1本100mL中)〕タウリン3000mg、イノシトール50mg、ニコチン酸アミド20mg、チアミン硝化物(ビタミン$B_1$)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミン$B_2$)10mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミン$B_6$)10mg、カルニチン塩化物100mg、無水カフェイン50mg 添加物:エリスリトール、アセスルファムK、スクラロース、クエン酸、クエン酸Na、没食子酸プロピル、安息香酸Na、pH調整剤、香料 ●本剤に配合されているビタミン$B_2$により、尿が黄色になることがありますが、心配ありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

製造販売元
TAIHO 大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/

使用期限　　製造番号

