



大鵬薬品

添付文書・説明文書集

目次

総 製品総覧

1~3

I 第1類医薬品

バップフォーレディ I-1

II 第2類医薬品

ハルンケア内服液 II-1

ハルンケア顆粒 II-5

ソルマック キュアールD II-9

III 第2類医薬品

チオビタゴールド III-1

ソルマックEX2 III-4

ソルマックプラス III-7

ハルンケア ベアベリー錠 III-10

ゼノールエクサムFX III-13

ゼノールエクサムSX III-16

ゼノールエクサム液ゲル III-19

ゼノールジクロダイレクトR III-22

ウレパールプラスクリーム III-25

ウレパールプラスローション10 III-29

扁 鵲 III-33

肝 生 III-37

ピタスセキトローチ III-41

IV 第3類医薬品

チオビタドリンク1000 IV-1

チオビタドリンクアイビタス IV-4

チオビタドリンクアイビタスゼロ IV-7

ゼノールチックE IV-10

V 指定医薬部外品

チオビタ・ドリンク V-1

チオビタドリンク2000 V-3

ソルマック胃腸液プラス V-5

ソルマック5 V-7

ソルマック キュアールS V-9

ピタスのどトローチ V-11

ピタスのどトローチO V-13

ピタスのどトローチL V-15

ピタスクールトローチS V-17

ピタメディカルトローチ V-19

VI 雜貨

Efil(エフィル) VI-1

VII 特定先用

チオビタドリンクブイスパー	VII-1
チオビタドリンク2000	VII-4
チオビタドリンク3000	VII-6
チオビタドリンク3000ZERO	VII-8
チオビタドリンク3000ZERO	VII-10
フェミラクト	VII-12

製品総覧

第1類医薬品



バップフォーレディ

I-1 ページ

一般用医薬品

第2類医薬品



ハレンケア内服液

II-1 ページ



ハレンケア顆粒

II-5 ページ



ソルマック キュアールD

II-9 ページ

第2類医薬品



チオビタゴールド

III-1 ページ



ソルマック EX2

III-4 ページ



ソルマックプラス

III-7 ページ



ハレンケア
ベアベリー錠

III-10 ページ



ゼノール
エksam FX

III-13 ページ



ゼノール
エksam SX

III-16 ページ



ゼノール
エksam液ゲル

III-19 ページ



ゼノール
ジクロダイレクトR

III-22 ページ



ウレパール
プラスクリーム

III-25 ページ



ウレパール
プラスローション10

III-29 ページ

一般用医薬品

第2類医薬品



扁鵲



肝生



ピタスせきトローチ



III-33 ページ



III-37 ページ



III-41 ページ

第3類医薬品



チオビタドリンク
1000



IV-1 ページ



チオビタドリンク
アイビタス



IV-4 ページ



チオビタドリンク
アイビタスゼロ



IV-7 ページ



ゼノールチックE



IV-10 ページ

指定医薬部外品



チオビタ・ドリンク



V-1 ページ



チオビタドリンク
2000



V-3 ページ



ソルマック
胃腸液プラス



V-5 ページ



ソルマック5



V-7 ページ



ソルマック
キュアールS



V-9 ページ



ピタスのどトローチ



V-11 ページ



ピタスのどトローチO



V-13 ページ



ピタスのどトローチL



V-15 ページ



ピタス
クールトローチS



V-17 ページ



ピタス
メディカルトローチ



V-19 ページ



Efil エフィル

VII-1 ページ

特定先用

第3類医薬品



チオビタドリンク
ブイスーパー

VII-1 ページ

指定医薬部外品



チオビタドリンク
2000

VII-4 ページ



チオビタドリンク
3000

VII-6 ページ



チオビタドリンク
3000ZERO

VII-8 ページ



チオビタドリンク
3000ZERO

VII-10 ページ

健康補助食品



FEMILACTO
フェミラクト

VII-12 ページ

I

第1類医薬品

添付文書・説明文書集



大鵬薬品

女性用の過活動膀胱治療薬

販売名: バップフォーレディ

● 1箱 (7錠)



包 装	1箱(7錠)	梱(7錠×5×12)
サイズ (mm) ≈1	65×138×21	337×288×148
重量 (g)	18	1,364
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	2,500円	150,000円
JANコード	4987117 614008	4987117 614015
ITFコード	—	1 4987117 614012

参考画像



PTP シート



錠剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



女性用の過活動膀胱治療薬

第1類医薬品

バップフォーレディ[®]

商品情報はこちら↑

日本薬局方 プロピベリン塩酸塩錠

製品の特徴

バップフォーレディは、膀胱の異常収縮を抑制することで、尿意切迫感、尿意切迫感を伴う頻尿や尿もれを改善する女性専用のお薬です。これら過活動膀胱症状によって低下した日常生活を向上することができます。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(2)男性
(3)70歳以上の女性
(4)15歳未満の小児
(5)妊娠又は妊娠していると思われる人
(6)次の症状のある人
・排尿困難、尿閉(尿意があるのに排尿しづらい、できない状態)
・血尿、排尿痛、膀胱痛
(7)医療機関にて次の診断を受けた人
・胃アトニー(胃下垂に伴う胃のはたらきの低下)、腸アトニー(腸の運動低下)
・幽門・腸管の閉塞
・パーキンソン病、脳血管障害(脳梗塞、脳出血等)
・縫内障、認知症、重症筋無力症、重篤な心疾患
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する胃腸薬、乗物酔い薬、鼻炎用内服薬、かぜ薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気、目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります)
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
5. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人
(2)高齢者(65歳以上)
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(4)次の症状のある人
・頻尿や尿もれの症状が急性(発症後1ヵ月以内)
・夜間頻尿のみで日中には頻尿がない人
(5)不整脈、肝機能障害、腎障害、潰瘍性大腸炎、甲状腺機能亢進症の診断を受けた人
(6)排尿困難、尿閉、血尿、排尿痛又は膀胱痛の症状を起こしたことがある人(現在も症状がある人は服用できません)
(7)子宮癌、直腸癌等の骨盤内手術を受けたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、じんましん
消化器	食欲不振、吐き気・嘔吐、腹痛、消化不良、口内炎
精神神経系	頭痛、めまい、脱力感、しびれ、足がすくむ、歩幅がせまくなる、手足の震え、意識の低下、見当識障害
循環器	動悸、胸の苦しさ、血圧上昇、脈のみだれ
泌尿器	排尿困難、残尿感
その他	舌のもつれ、舌の痛み、のどの痛み、しづがれ声、味覚異常、痰のからみ、腰痛、目のかわき、異常なまぶしさ、むくみ、からだがだるい

3. 服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
尿閉	尿意があるのに排尿できない状態で、痛みを伴う。

(裏面へつづく)

症状の名称	症 状
幻覚、せん妄	実際にはないものが存在するように感じる、注意力、認識力、認知機能の低下等があらわれる。
急性緑内障発作	急激な吐き気、頭痛を伴う眼の痛み、目がみにくい等があらわれる。
麻痺性イレウス (腸閉塞様症状)	激しい腹痛、ガス排出(おなら)の停止、嘔吐、腹部膨満感を伴う著しい便秘があらわれる。
おうもんきんゆうかいじょう 横紋筋融解症	手足・肩・腰等の筋肉が痛む、手足がしびれる、力が入らない、こわばる、全身がだるい、赤褐色尿等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
血小板減少	血液中の成分である血小板の数が減ることにより、鼻血、歯ぐきからの出血、青あざ等の出血症状があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
QT延長、心室性頻拍	めまい、動悸、胸が痛む、心拍数の増加、意識がなくなる等の症状があらわれる。

4. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

口のかわき、便秘、下痢、眠気、目のかすみ、一時的な物忘れ

5. 2週間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

効能・効果

尿意切迫感(急に尿がしたいとの我慢し難い訴え)、尿意切迫感を伴う頻尿(尿の回数が多い)・尿もれ

用法・用量

成人女性(15歳以上70歳未満)、1回1錠を1日1回食後に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人女性(15歳以上、70歳未満)	1錠	1回
成人女性(70歳以上)		
成人男性(15歳以上)		服用しないでください
小児(15歳未満)		

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)毎回同じ時間帯に服用してください。
- (3)錠剤の取り出しが方:

錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)。



成分・分量

1錠中

成分	分量	はたらき
プロピペリン塩酸塩	10mg	尿意切迫感の原因となる膀胱の異常な収縮を抑え、尿意切迫感、頻尿(尿の回数が多い)及び尿もれを改善します

添加物

乳糖水和物、結晶セルロース、ヒドロキシプロピル starch、カルメロースCa、ヒプロメロース、タルク、マクロゴール6000、酸化チタン、ステアリン酸Mg、カルナウバロウ

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わったりします)。
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

お問い合わせはお買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

連絡先 大鵬薬品工業株式会社 お客様相談室

〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27

電話番号 0120-4527-66

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 :  大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27

BL251003

バップフォーレディ

医薬品を正しく購入するための
説明文書

第1類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	バップフォーレディ
2	成分・分量	1錠中 プロピベリン塩酸塩 10mg
3	用法・用量	成人女性（15歳以上70歳未満）、1回1錠を1日1回食後に服用してください。
4	効能・効果	尿意切迫感（急に尿がしたいとの我慢し難い訴え）、 尿意切迫感を伴う頻尿（尿の回数が多い）・尿もれ
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) 男性 (3) 70歳以上の女性 (4) 15歳未満の小児 (5) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (6) 次の症状のある人 <ul style="list-style-type: none"> ・排尿困難、尿閉（尿意があるのに排尿しづらい、できない状態） ・血尿、排尿痛、膀胱痛 (7) 医療機関にて次の診断を受けた人 <ul style="list-style-type: none"> ・胃アトニー（胃下垂に伴う胃のはたらきの低下）、腸アトニー（腸の運動低下） ・幽門・腸管の閉塞 ・パーキンソン病、脳血管障害（脳梗塞、脳出血等） ・縄内障、認知症、重症筋無力症、重篤な心疾患 <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。</p> <p>胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する胃腸薬、乗物酔い薬、鼻炎用内服薬、かぜ薬</p> <p>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。</p> <p>（眠気、目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります）</p> <p>4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。</p> <p>5. 長期連用しないでください。</p> <p>次に該当する人はお申し出ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 医師の治療を受けている人 (2) 高齢者（65歳以上） (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4) 次の症状のある人 <ul style="list-style-type: none"> ・頻尿や尿もれの症状が急性（発症後1ヵ月以内） ・夜間頻尿のみで日中には頻尿がない人 (5) 不整脈、肝機能障害、腎障害、潰瘍性大腸炎、甲状腺機能亢進症の診断を受けた人 (6) 排尿困難、尿閉、血尿、排尿痛又は膀胱痛の症状を起こしたことがある人 （現在も症状がある人は服用できません） (7) 子宮癌、直腸癌等の骨盤内手術を受けたことがある人

6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	
---	-----------------------	--

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。

II

第2類医薬品

添付文書・説明文書集



生薬製剤／軽い尿もれ・頻尿用薬

販売名: ハルンケア内服液

● 1箱 (30mL×2本)



包 装	1箱(30mL×2本)	梱[(30mL×2本)×40箱]
サイズ(mm) ≈1	33×62×93	262×354×100
重量(g)	176	7300
使用期限		3年
メーカー希望小売価格(税別)	1,012円	40,480円
JANコード	4987117 612028	4987117 612042
ITFコード	—	1 4987117 612049

● 1箱 (30mL×10本)



包 装	1箱(30mL×10本)	梱[(30mL×10本)×10箱]
サイズ(mm) ≈1	62×154×93	325×320×100
重量(g)	867	8900
使用期限		3年
メーカー希望小売価格(税別)	4,807円	48,070円
JANコード	4987117 612219	4987117 612226
ITFコード	—	1 4987117 612223

参考画像



30mL×1本



内服液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)



服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

2019

生薬製剤

軽い尿もれ・頻尿用薬

第2類医薬品

ハルンケア[®]
内服液



■特徴

1. 8種類の生薬(ジオウ、タクシャ、ボタンピ、ブクリョウ、サンシュユ、サンヤク、ケイヒ、炮附子)から抽出・濃縮し、更にエタノールを加え、澱粉等を分離除去した後、エタノールを蒸発除去して製したエキスを含有する生薬製剤です。
2. 体力の低下、下半身の衰え、手足の冷えを伴う方の“軽い尿もれ”、“頻尿(小便の回数が多い)”、“残尿感”、“尿が出済る”の症状を緩和します。
3. 服用しやすい液剤です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は服用しないでください。

- (1) 胃腸の弱い人
- (2) 下痢しやすい人
- (3) 次の症状のある人
 - 脊髄損傷や認知症等により、「尿がもれたことに気が付かない」
 - 前立腺肥大症等により、「少量ずつ常に尿がもれる」



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人
 - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - (5) 漢方製剤等を服用している人(含有生薬の重複に注意する)
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、下痢、腹痛、便秘
精神神経系	頭痛、めまい
循 環 器	動悸
呼 吸 器	息切れ
泌 尿 器	尿閉
そ の 他	のぼせ、悪寒、浮腫、口唇・舌のしびれ

3. 14日間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(裏面につづく)

■効能・効果

体力の低下、下半身の衰え、手足の冷えを伴う次の症状の緩和
●軽い尿もれ ●頻尿(小便の回数が多い) ●残尿感 ●尿が出渉る

■用法・用量

次の量を朝夕食前又は食間^(注)に服用してください。

年齢	成人(15歳以上)	小児(15歳未満)
1回量	1本(30mL)	
1日服用回数	2回	服用しないでください。

注)食間とは食事と食事の間という意味で、食後約2時間のことです。

●定められた用法・用量を厳守してください。

■成分・分量

1日量2本(60mL)中：

生薬エキスH……11mL

(ジオウ ……5g ブクリヨウ ……3g ケイヒ ……1g
タクシャ ……3g サンシュユ ……3g 炮附子 ……1g
ボタンピ ……3g サンヤク ……3g より抽出)

添加物としてグリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、pH調整剤、トウモロコシデンプン、香料を含有します。

◆本剤は生薬成分を含むため、経時的に沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用してください。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱及びラベルに記載しています。

■包装

1箱 2本(30mL× 2本)入り

1箱10本(30mL×10本)入り

■お問い合わせ先

お問い合わせはお買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

連絡先 大鵬薬品工業株式会社 お客様相談室

〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27

電話番号：0120-4527-66

受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)



®登録商標

YM19H09

製造販売元 **TAIHO** 大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27

ハルンケア内服液

医薬品を正しく購入するための
説明文書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ハルンケア内服液								
2	成分・分量	<p>1日量2本 (60mL) 中 生薬エキス 11mL</p> <p>ジオウ 5g タクシャ 3g ボタンピ 3g ブクリヨウ 3g サンシュユ 3g サンヤク 3g ケイヒ 1g 炮附子 1g より抽出</p>								
3	用法・用量	<p>次の量を朝夕食前又は食間に服用してください</p> <table border="1"> <tr> <td>年 齢</td> <td>成人 (15歳以上)</td> <td>小児 (15歳未満)</td> </tr> <tr> <td>1 回 量</td> <td>1本 (30mL)</td> <td rowspan="2">服用しないでください</td> </tr> <tr> <td>1 日 服 用 回 数</td> <td>2回</td> </tr> </table>	年 齢	成人 (15歳以上)	小児 (15歳未満)	1 回 量	1本 (30mL)	服用しないでください	1 日 服 用 回 数	2回
年 齢	成人 (15歳以上)	小児 (15歳未満)								
1 回 量	1本 (30mL)	服用しないでください								
1 日 服 用 回 数	2回									
4	効能・効果	体力の低下、下半身の衰え、手足の冷えを伴う次の症状を緩和します 軽い尿もれ、頻尿 (小便の回数が多い)、残尿感、尿が出渢る								
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>次の人は服用しないでください</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 胃腸の弱い人 (2) 下痢しやすい人 (3) 次の症状のある人 <ul style="list-style-type: none"> ・脊髄損傷や認知症等により、「尿がもれたことに気が付かない」 ・前立腺肥大症等により、「少量ずつ常に尿がもれる」 <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている人 ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人 ・今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 ・漢方製剤等を服用している人 (含有生薬の重複に注意する) 								
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項									

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合 (副作用など) には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

生薬製剤／軽い尿もれ・頻尿用薬

販売名：ハルンケア顆粒

● 1箱 (2.5g×6包)



包 装	1箱(2.5g×6包)	梱 [(2.5g×6包)×20]
サイズ(mm) ※1	28×62×115	133×296×128
重量(g)	34.8	800
使用期限		3年
メーカー希望小売価格(税別)	2,277円	45,540円
JANコード	4987117 612813	4987117 612912
ITFコード	—	1 4987117 612810

● 1箱 (2.5g×10包)



包 装	1箱(2.5g×10包)	梱 [(2.5g×10包)×20]
サイズ(mm) ※1	28×90×115	190×308×130
重量(g)	51.7	1272
使用期限		3年
メーカー希望小売価格(税別)	3,427円	68,540円
JANコード	4987117 612820	4987117 612929
ITFコード	—	1 4987117 612827

参考画像



2.5g×1包

製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ (単位：mm)



服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

生薬製剤 軽い尿もれ・頻尿用薬 第2類医薬品

ハルンケア®
颗粒



■ ハルンケア颗粒の特徴

1. ハルンケアの颗粒剤です。
2. チョコレート風味で、苦みも少なく、お薬の味が苦手な方にもおすすめ出来ます。
3. スティックタイプの颗粒剤で、携帯(旅行やお出かけ)に便利です。
4. 8種類の生薬(ジオウ、タクシャ、ボタンピ、ブクリョウ、サンシュユ、サンヤク、ケイヒ、炮附子)から抽出・濃縮し、更にエタノールを加え、澱粉等を分離除去した後、エタノールを蒸発除去して製したエキスを含有する生薬製剤です。
5. 体力の低下、下半身の衰え、手足の冷えを伴う方の“軽い尿もれ”、“頻尿(小便の回数が多い)”、“残尿感”、“尿が出済る”の症状を緩和します。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。

- (1) 胃腸の弱い人
- (2) 下痢しやすい人
- (3) 次の症状のある人
 - ・脊髄損傷や認知症等により、「尿がもれたことに気が付かない」
 - ・前立腺肥大症等により、「少量ずつ常に尿がもれる」



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人
 - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - (5) 漢方製剤等を服用している人(含有生薬の重複に注意する)
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、下痢、腹痛、便秘
精神神経系	頭痛、めまい
循 環 器	動悸
呼 吸 器	息切れ
泌 尿 器	尿閉
そ の 他	のぼせ、悪寒、浮腫、口唇・舌のしびれ

3. 14日間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(裏面につづく)

■ 効能・効果

体力の低下、下半身の衰え、手足の冷えを伴う次の症状の緩和
●軽い尿もれ ●頻尿(小便の回数が多い) ●残尿感 ●尿が出渉る

■ 用法・用量

次の量を朝夕食前又は食間^{注)}に水又はお湯で服用してください。

年齢	成人(15歳以上)	小児(15歳未満)
1回量	1包(2.5g)	
1日服用回数	2回	服用しないでください。

注) 食間とは食事と食事の間という意味で、食後約2時間のことです。

●定められた用法・用量を厳守してください。

服用方法

- (1)スティックを立て、切り口より切り取った
のち、服用してください。
- (2)切り取り部分で唇を切らないようにご注意
ください。



■ 成分・分量

1日量2包(5.0g)中:

生薬エキスH…11mL

(ジオウ5g、タクシャ3g、ボタンピ3g、ブクリョウ3g、
サンシュユ3g、サンヤク3g、ケイヒ1g、炮附子1gより抽出)

添加物:ケイ酸カルシウム、スクラロース、バニリン、香料

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)開封後の保存及び他の容器への入れ替えをしないでください
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱
及びスティック包装に記載しています。

■ 包装

1箱 6包(2.5g×6包)入り

1箱10包(2.5g×10包)入り

■ お問い合わせ先

お問い合わせはお買い求めのお店又は下記までご連絡いただきます
ようお願い申し上げます。

連絡先 大鵬薬品工業株式会社 お客様相談室

〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27

電話番号:0120-4527-66

受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

®登録商標

製造販売元 **TAIHO** 大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27

YM19K02

ハルンケア顆粒

医薬品を正しく購入するための
説明文書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ハルンケア顆粒								
2	成分・分量	1日量2包 (5.0g) 中 生薬エキスH 11mL ジオウ 5g タクシャ 3g ボタンピ 3g ブクリヨウ 3g サンシュユ 3g サンヤク 3g ケイヒ 1g 炮附子 1g より抽出								
3	用法・用量	次の量を朝夕食前又は食間に水又はお湯で服用してください <table border="1"> <tr> <td>年 齢</td> <td>成人 (15歳以上)</td> <td>小児 (15歳未満)</td> </tr> <tr> <td>1 回 量</td> <td>1包 (2.5g)</td> <td rowspan="2">服用しないでください</td> </tr> <tr> <td>1 日 服 用 回 数</td> <td>2回</td> </tr> </table>	年 齢	成人 (15歳以上)	小児 (15歳未満)	1 回 量	1包 (2.5g)	服用しないでください	1 日 服 用 回 数	2回
年 齢	成人 (15歳以上)	小児 (15歳未満)								
1 回 量	1包 (2.5g)	服用しないでください								
1 日 服 用 回 数	2回									
4	効能・効果	体力の低下、下半身の衰え、手足の冷えを伴う次の症状を緩和します 軽い尿もれ、頻尿 (小便の回数が多い)、残尿感、尿が出済る								
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	次の人は服用しないでください (1) 胃腸の弱い人 (2) 下痢しやすい人 (3) 次の症状のある人 • 脊髄損傷や認知症等により、「尿がもれたことに気が付かない」 • 前立腺肥大症等により、「少量ずつ常に尿がもれる」 次に該当する人はお申し出ください • 医師の治療を受けている人 • 妊婦又は妊娠していると思われる人 • のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人 • 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 • 漢方製剤等を服用している人 (含有生薬の重複に注意する)								
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項									

[注意事項]

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

止瀉薬

販売名: ソルマック キュアールD

● 1箱 (12錠)



包装	1箱(12錠)	中箱(12錠×10)	梱(12錠×10×12)
サイズ(mm) ※1	20×110×71	114×214×75	225×485×242
重量(g)	17.8	230	3,120
使用期限		3年	
メーカー希望小売価格(税別)	1,200円	12,000円	144,000円
JANコード	4987117 400311	4987117 400328	4987117 400335
ITFコード	—	—	1 4987 117 400318

参考画像



パッケージ裏面

PTPシート

製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

止瀉薬

飲み過ぎ・食べ過ぎによる下痢に
ソルマック® キュアルD

®登録商標

販売名：ソルマック キュアルD

〔特徴〕

- ★ロペラミド塩酸塩（止瀉薬）とビオヂアスター2000（消化酵素）、ラクトミン（フェカリス菌）の3つの有効成分が下痢の症状にアプローチします。
- ★水なしで飲めるチュアブル錠のため、下痢で困ったそのときに、どこでも手軽に服用することができます。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を使用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります。)
4. 服用前後は飲酒しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
 - (3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・吐き気等の症状を伴う下痢のある人。
(本剤で無理に下痢を止めるとかえって病気を悪化させることができます。)
 - (4) 便秘を避けなければならない肛門疾患等のある人。
(本剤の服用により便秘が発現することがあります。)
 - (5) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (6) 授乳中の人は。
 - (7) 高齢者。
 - (8) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	便秘、腹部膨満感、腹部不快感、吐き気、腹痛、嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

症状の名称	症 状
皮膚粘膜眼症候群 (ステイーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、 のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤 等が持続したり、急激に悪化する。
イレウス様症状 (腸閉塞様症状)	激しい腹痛、ガス排出（おなら）の停 止、嘔吐、腹部膨満感を伴う著しい便秘 があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
眠気
4. 2~3日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〈効能・効果〉

食べ過ぎ・飲み過ぎによる下痢、寝冷えによる下痢

〈用法・用量〉

次の量をかむか、口中で溶かして服用してください。下痢が止まれば服用しないでください。服用間隔は4時間以上おいてください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	2錠	2回
15歳未満	服用しないでください。	

用法・用量に関する注意

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故になります。）



〈成分・分量と働き〉

（1日量中）

成 分	分 量	はたらき
ロペラミド塩酸塩	1 mg	腸の過剰な運動や腸の粘膜における水分の吸収・分泌異常を改善して、下痢を抑えます。
ビオヂアスターゼ2000	90mg	胃腸内にある未消化物の消化を助けます。
ラクトミン（フェカリス菌）	20mg	乳酸菌（善玉菌）が乱れた腸内細菌バランスを整えます。

添加物：D-マンニトール、キシリトール、結晶セルロース、クロスポビドン、リン酸水素Ca、乳糖水和物、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mg、l-メントール

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）

お問い合わせはお買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

連絡先 大鵬薬品工業株式会社 お客様相談室

〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27

電話番号：0120-4527-66 受付時間：9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ホームページ：<https://www.taiho.co.jp/>



販売元

大鵬薬品工業株式会社

東京都千代田区神田錦町1-27

製造販売元

大昭製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931

ソルマック キュアールD

医薬品を正しく購入するための
説明文書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ソルマック キュアールD									
2	成分・分量	<p>1日量中</p> <p>ロペラミド塩酸塩 1mg ビオディアスターZ2000 90mg ラクトミン（フェカリス菌） 20mg</p>									
3	用法・用量	<p>次の量をかむか、口中で溶かして服用してください。下痢が止まれば服用しないでください。 服用間隔は4時間以上おいてください。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 齢</th> <th>1回量</th> <th>1日服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成人（15歳以上）</td> <td>2錠</td> <td>2回</td> </tr> <tr> <td>15歳未満</td> <td></td> <td>服用しないでください</td> </tr> </tbody> </table>	年 齢	1回量	1日服用回数	成人（15歳以上）	2錠	2回	15歳未満		服用しないでください
年 齢	1回量	1日服用回数									
成人（15歳以上）	2錠	2回									
15歳未満		服用しないでください									
4	効能・効果	食べ過ぎ・飲み過ぎによる下痢、寝冷えによる下痢									
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないでください 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を使用しないでください 胃腸鎮痛鎮痙薬</p> <p>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気等があらわれることがあります。)</p> <p>4. 服用前後は飲酒しないでください</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。 (3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・吐き気等の症状を伴う下痢のある人。 (本剤で無理に下痢を止めるとかえって病気を悪化させることができます。) (4) 便秘を避けなければならない肛門疾患等のある人。 (本剤の服用により便秘が発現することがあります。) (5) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (6) 授乳中の人。 (7) 高齢者。 (8) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 									
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項										

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

III

第2類 医薬品

添付文書・説明文書集



滋養強壮剤

販売名: チオビタゴールド

● 1本 (30mL)



包 装	1本(30mL)
サイズ(mm)	胴径30×高さ90
重量(g)	85
使用期限	3年
メーカー希望小売価格(税別)	403円
JANコード	4968 4315
ITFコード	—

● 1箱 (30mL×3本)



包 装	1箱(30mL×3本)	梱[(30mL×3本)×30箱]
サイズ(mm) ※1	33×97×93	285×330×100
重量(g)	270	8200
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	1,208円	36,240円
JANコード	4987117 437218	4987117 437232
ITFコード	—	1 4987117 437239

● 1箱 (30mL×10本)



包 装	1箱(30mL×10本)	梱[(30mL×10本)×10箱]
サイズ(mm) ※1	62×154×93	325×320×100
重量(g)	890	9100
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	4,025円	40,250円
JANコード	4987117 437355	4987117 437379
ITFコード	—	1 4987117 437376

参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)

販売名：チオビタゴールド

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 服用後、下痢があらわれることがあるので、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
2. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

■発熱性消耗性疾患・
肉体疲労・病中病後・
食欲不振・栄養障害・
産前産後などの場合の
栄養補給 ■滋養強壮
■虚弱体质

用法・用量
成人(15歳以上)は、
1日1回1本(30mL)
を服用して下さい。
●小児(15歳未満)は
服用しないで下さい。
●用法・用量を守って
下さい。

製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
TAIHO
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>

滋養強壮・虚弱体质・栄養補給に

チオビタ[®] ゴールド

TIOVITA

GOLD

第2類医薬品

30mL

ガラス:瓶

金 属:キャップ

副作用救済制度
TEL 0120-149-931

®:登録商標

使用期限

製造番号

L1905

III - 2

チオビタゴールド

医薬品を正しく購入するための
説明文書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	チオビタゴールド
2	成分・分量	<p>1本 (30mL) 中</p> <p>ローヤルゼリー 100mg ニンジン流エキス 0.6mL (原生薬600mgに相当) インヨウカク流エキス 0.1mL (原生薬100mgに相当) チアミン硝化物 (ビタミンB1) 5mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム (ビタミンB2) 5mg ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6) 5mg ニコチニン酸アミド 30mg 無水カフェイン 50mg (アルコール0.2mL以下)</p>
3	用法・用量	<p>成人 (15歳以上) は、1日1回1本 (30mL) を服用してください ●小児 (15歳未満) は服用しないでください</p>
4	効能・効果	発熱性消耗性疾患・肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・産前産後などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体质
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

生薬配合液体胃腸薬

販売名: ソルマックEX2

●1本 (50mL)



包 装	1本(50mL)
サイズ(mm)	胴径44×高さ105
重量(g)	135
使用期限	3年
メーカー希望小売価格(税別)	580円
JANコード	4514 4639
ITFコード	—

●1箱 (50mL×10本)



包 装	1箱(50mL×8本)	梱(50mL×8本×6)
サイズ(mm) ※1	89×177×107	280×365×115
重量(g)	1145	7100
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	4,640円	27,840円
JANコード	4987117 397895	4987117 397901
ITFコード	—	1 4987117 397908

参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)



ソルマックEX2

医薬品を正しく購入するための
説明文書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ソルマックEX2
2	成分・分量	<p>1本 (50mL) 中</p> <p>エンメイソウエキス 30mg (原生葉201mg相当) ウコン流エキス 0.3mL (原生葉300mg相当) カンゾウ抽出物 115mg (原生葉1644.5mg相当) チョウジチンキ 0.126mL (原生葉37.8mg相当) ゲンチアナチンキ 0.376mL (原生葉112.8mg相当) ニンジン流エキス 0.5mL (原生葉500mg相当) オウレンチンキ 0.792mL (原生葉237.6mg相当) ソウジュツ流エキス 1.2mL (原生葉1200mg相当) ケイヒチンキ 0.25mL (原生葉75mg相当) カルニチン塩化物 120mg</p>
3	用法・用量	<p>成人 (15歳以上) は、1日1回1本 (50mL) を服用してください ●小児 (15歳未満) は服用しないでください</p>
4	効能・効果	食べ過ぎ (過食)、飲み過ぎ (過飲)、もたれ (胃もたれ)、はきけ (二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔気、恶心)、嘔吐、胃弱、食欲不振 (食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胸やけ、胸つかえ
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている人 ・高齢者 ・むくみのある人 ・高血圧、腎臓病、心臓病の診断を受けた人
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

[注意事項]

- 1.本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 2.情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 3.使用後、体調に変化等があった場合 (副作用など) には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

生薬配合液体胃腸薬

販売名: ソルマックプラス

● 1本 (25mL)



包 装	1本(25mL)
サイズ(mm)	胴径36×高さ88
重量(g)	85
使用期限	3年
メーカー希望小売価格(税別)	400円
JANコード	4514 4608
ITFコード	—

● 1箱 (25mL×2本)



包 装	1箱(25mL×2本)	内装[(25mL×2本)×20箱]	梱[(25mL×2本)×20箱×2]
サイズ(mm) ※1	39×76×92	190×150×185	193×304×187
重量(g)	183	3800	7650
使用期限		3年	
メーカー希望小売価格(税別)	800円	—	32,000円
JANコード	4987117 398816	4987117 398823	4987117 398830
ITFコード	—	—	1 4987117 398837

● 1箱 (25mL×5本)



包 装	1箱(25mL×5本)	梱[(25mL×5本)×20箱]
サイズ(mm) ※1	39×180×92	195×384×195
重量(g)	455	9500
使用期限		3年
メーカー希望小売価格(税別)	2,000円	40,000円
JANコード	4987117 398847	4987117 398854
ITFコード	—	1 4987117 398851

参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)



ソルマックプラス

医薬品を正しく購入するための
説明文書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ソルマックプラス																		
2	成分・分量	<p>1日量2本 (50mL) 中</p> <table> <tr><td>ウコン流エキス</td><td>0.3mL (原生葉300mg相当)</td></tr> <tr><td>カンゾウ抽出物</td><td>135mg (原生葉1930.5mg相当)</td></tr> <tr><td>ニンジン流エキス</td><td>0.5mL (原生葉500mg相当)</td></tr> <tr><td>オウレンチンキ</td><td>0.826mL (原生葉247.8mg相当)</td></tr> <tr><td>チヨウジチンキ</td><td>0.126mL (原生葉37.8mg相当)</td></tr> <tr><td>ゲンチアナチンキ</td><td>0.376mL (原生葉112.8mg相当)</td></tr> <tr><td>ソウジュツ流エキス</td><td>1.2mL (原生葉1200mg相当)</td></tr> <tr><td>ケイヒチンキ</td><td>0.25mL (原生葉75mg相当)</td></tr> <tr><td>カルニチン塩化物</td><td>120mg</td></tr> </table>	ウコン流エキス	0.3mL (原生葉300mg相当)	カンゾウ抽出物	135mg (原生葉1930.5mg相当)	ニンジン流エキス	0.5mL (原生葉500mg相当)	オウレンチンキ	0.826mL (原生葉247.8mg相当)	チヨウジチンキ	0.126mL (原生葉37.8mg相当)	ゲンチアナチンキ	0.376mL (原生葉112.8mg相当)	ソウジュツ流エキス	1.2mL (原生葉1200mg相当)	ケイヒチンキ	0.25mL (原生葉75mg相当)	カルニチン塩化物	120mg
ウコン流エキス	0.3mL (原生葉300mg相当)																			
カンゾウ抽出物	135mg (原生葉1930.5mg相当)																			
ニンジン流エキス	0.5mL (原生葉500mg相当)																			
オウレンチンキ	0.826mL (原生葉247.8mg相当)																			
チヨウジチンキ	0.126mL (原生葉37.8mg相当)																			
ゲンチアナチンキ	0.376mL (原生葉112.8mg相当)																			
ソウジュツ流エキス	1.2mL (原生葉1200mg相当)																			
ケイヒチンキ	0.25mL (原生葉75mg相当)																			
カルニチン塩化物	120mg																			
3	用法・用量	<p>成人 (15歳以上) は、1回1本 (25mL) を1日2回服用してください 服用間隔は4時間以上おいてください ●小児 (15歳未満) は服用しないでください</p>																		
4	効能・効果	はきけ (二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔気、恶心)、嘔吐、消化不良、食べ過ぎ (過食)、飲み過ぎ (過飲)、もたれ (胃もたれ)、胃弱、食欲不振 (食欲減退)、胃部・腹部膨満感、胸やけ、胸つかえ																		
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている人 ・高齢者 ・むくみのある人 ・高血圧、腎臓病、心臓病の診断を受けた人 																		
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項																			

[注意事項]

- 1.本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 2.情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 3.使用後、体調に変化等があった場合 (副作用など) には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

生薬製剤

販売名: ハルンケア ベアベリー錠

● 1袋(48錠)



包 装	1袋(48錠)	箱(48錠×10)	梱[(48錠×10)×6]
サイズ(mm) ≈1	9×92×147	93×113×152	240×300×178
重量(g)	18.75	227.2	1725
使用期限		3年	
メーカー希望小売価格(税別)	1,840円	18,400円	110,400円
JANコード	4987117 613100	4987117 613117	4987117 613124
ITFコード	—	—	1 4987117 613107

● 1箱(84錠)



包 装	1箱(84錠)	梱(84錠×30)
サイズ(mm) ≈1	25×98×115	244×402×140
重量(g)	42.1	1785
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	3,059円	91,770円
JANコード	4987117 613209	4987117 613216
ITFコード	—	1 4987117 613206

参考画像



アルミ包装 84錠

錠剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)



ハルンケア ベアベリー錠

医薬品を正しく購入するための
説明文書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ハルンケア ベアベリー錠									
2	成分・分量	1日量12錠中 ウワウルシ乾燥エキス 1875mg (ウワウルシ15gに相当)									
3	用法・用量	<p>次の量を食前又は食間に水または温湯にて服用してください</p> <table border="1"> <tr> <td>年齢</td> <td>1回量</td> <td>1日服用回数</td> </tr> <tr> <td>成人(15歳以上)</td> <td>4錠</td> <td>3回</td> </tr> <tr> <td>15歳未満</td> <td colspan="2">服用しないでください</td> </tr> </table>	年齢	1回量	1日服用回数	成人(15歳以上)	4錠	3回	15歳未満	服用しないでください	
年齢	1回量	1日服用回数									
成人(15歳以上)	4錠	3回									
15歳未満	服用しないでください										
4	効能・効果	残尿感(尿がでしづる)、排尿時の不快感のあるもの									
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている人 ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・胃腸の弱い人 ・今までに薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・次の診断を受けた人 腎障害 									
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項										

[注意事項]

- 1.本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 2.情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 3.使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

外用鎮痛消炎薬

販売名: ゼノールエクサムFX

● 1箱 (32g×1本)



包装	1箱(32g×1本)	内装[(32g×1本)×10箱]	梱[(32g×1本)×10箱×10]
サイズ(mm) ≈1	33×51×141	104×175×145	365×540×165
重量(g)	74	794	8638
使用期限		3年	
メーカー希望小売価格(税別)	1,323円	—	132,300円
JANコード	4987117 372038	—	4987117 372045
ITFコード	—	—	1 4987117 372042

参考画像



32g×1本



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)



ゼノールエクサム FX

医薬品を正しく購入するための
説明文書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ゼノールエクサム FX
2	成分・分量	100g 中 フェルビナク 3.0g l-メントール 2.7g
3	用法・用量	1日2~4回、適量を患部にすり込んでください
4	効能・効果	肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、打撲、捻挫（ねんざ）、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みとはれ）、肘の痛み（テニス肘など）
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないでください</p> <p>(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) ぜんそくを起こしたことがある人 (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (4) 15歳未満の小児</p> <p>2. 次の部位には使用しないでください</p> <p>(1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口 (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <p>(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人</p>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

[注意事項]

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

外用鎮痛消炎薬

販売名: ゼノールエクサムSX

● 1箱 (43g×1本)



包 装	1箱(43g×1本)	内装[(43g×1本)×10箱]	梱[(43g×1本)×10箱×10]
サイズ(mm) ※1	48×55×141	114×251×144	261×598×306
重量(g)	106	1136	12098
使用期限	3年		
メーカー希望小売価格(税別)	1,725円	—	172,500円
JANコード	4987117 372014	—	4987117 372021
ITFコード	—	—	1 4987117 372028

参考画像



43g×1本



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)



ゼノールエクサム SX

医薬品を正しく購入するための
説明文書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ゼノールエクサム SX
2	成分・分量	100g 中 フェルビナク 3.0g l-メントール 3.0g
3	用法・用量	1日2~4回、適量を患部にすり込んでください
4	効能・効果	関節痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、打撲、捻挫（ねんざ）、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みとはれ）、肘の痛み（テニス肘など）
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないでください</p> <p>(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) ぜんそくを起こしたことがある人 (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (4) 15歳未満の小児</p> <p>2. 次の部位には使用しないでください</p> <p>(1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口 (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <p>(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人</p>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

[注意事項]

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

外用鎮痛消炎薬

販売名: ゼノールエクサム液ゲル

● 1箱 (52mL×1本)



包 装	1箱(52mL×1本)	内装[(52mL×1本)×10箱]	梱[(52mL×1本)×10箱×10]
サイズ(mm) ※1	40×55×141	115×208×145	444×600×172
重量(g)	92	999	11134
使用期限	3年		
メーカー希望小売価格(税別)	1,725円	—	172,500円
JANコード	4987117 372304	—	4987117 372328
ITFコード	—	—	1 4987117 372325

参考画像



52mL×1本



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)

開封口





ゼノール エクサム[®] 液ゲル

手の届きにくい患部にぬれる
ロングボディ



**ゼノール
エクサム[®]
液ゲル**

肩・関節の
痛みに



**ゼノール
エクサム[®]
液ゲル**

セルフメディケーション
税控除対象

52mL 外用鎮痛消炎薬

**手の届きにくい肩・関節の痛みに
ラクにぬれるロングボディ**

肩甲骨などの、ぬりにくい患部に
ラクにぬれます。

ぬれるワイドフェース
約30mm




フェルビナク3.0%配合





関節など、曲面の患部
にも簡単にぬれます。

べたつかないので、
服がすぐに着られます。

容器の正しい使い方

①スポンジ中央を ②スポンジが充分に ③ゆっくりと
しっかりと押す 湿ったことを確認 患部に塗布





液もれ防止
ストッパー付

販売元 **大鵬薬品工業株式会社**
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>

製造
販売元 **三笠製薬株式会社**
東京都練馬区豊玉北2-3-1

副作用用被害救済制度
電話 0120-149-931

②:登録商標

使用上の注意

【してはいけないこと】

「守らないと現れな症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。」

1.次の人は使用しないでください。

(1)本剤又は本剤の成分に対するアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)せんそくを起こしたことがある人。(3)妊娠又は妊娠していると思われる人。(4)15歳未満の小児。

2.次の部位には使用しないでください。

(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。(3)みずもいたしむ等又は化膿している患部。

【相談すること】

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。2.使用後、次の症状が悪化された場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書きを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【関係部位 症状】

皮膚 発疹、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

【症状の名前 症状】

ショック 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声の沙れ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しい、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3.1調査位置を使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書きを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所にキープをしっかり開けて保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(4)誤用の原因にならない品質が変わります。(5)本剤を火気につづけないでください。(6)た、使用済みの容器は火心中に投げないでください。(7)油が漏れるとおそれがありますので、使用後は、キップをしっかり閉めてください。(8)塗料(家具、塗装床、アセナーリー等)、化粧品、鉛筆等に付着すると変色することがありますので、ご注意ください。(7)使用期限が過ぎた製品は、使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、品質保持の点からなるべく速やかに使用してください。

ゼノールエクサム液ゲル

医薬品を正しく購入するための
説明文書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ゼノールエクサム液ゲル
2	成分・分量	100g 中 フェルビナク 3.0g l-メントール 2.0g
3	用法・用量	1日2~4回、適量を患部に塗布してください
4	効能・効果	肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、筋肉痛、関節痛、打撲、捻挫（ねんざ）、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みとはれ）、肘の痛み（テニス肘など）
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないでください</p> <ol style="list-style-type: none"> 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 ぜんそくを起こしたことがある人 妊娠又は妊娠していると思われる人 15歳未満の小児 <p>2. 次の部位には使用しないでください</p> <ol style="list-style-type: none"> 目の周囲、粘膜等 湿疹、かぶれ、傷口 みずむし・たむし等又は化膿している患部 <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ol style="list-style-type: none"> 医師の治療を受けている人 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

[注意事項]

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

外用鎮痛消炎薬

販売名: ゼノールジクロダイレクトR

● 1箱 (42g×1本)



包 装	1箱(42g×1本)	内装[(42g×1本)×10箱]	梱[(42g×1本)×10箱×10]
サイズ(mm) ※1	48×55×141	114×251×144	261×598×306
重量(g)	104	1113	11750
使用期限	3年		
メーカー希望小売価格(税別)	1,840円	—	184,000円
JANコード	4987117 372601	—	4987117 372625
ITFコード	—	—	1 4987117 372608

参考画像



42g×1本



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)



ゼノールジクロダイレクトR

医薬品を正しく購入するための
説明文書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ゼノールジクロダイレクトR
2	成分・分量	100g中 ジクロフェナクナトリウム 1.0g l-メントール 3.0g
3	用法・用量	1日3~4回適量を患部にすり込んでください ただし、塗擦部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。 なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。
4	効能・効果	関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎（手・手首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫（ねんざ）
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は使用しないでください (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) ぜんそくを起こしたことがある人 (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (4) 15歳未満の小児 2. 次の部位には使用しないでください (1) 目の周囲、粘膜等 (2) 皮膚の弱い部位（顔、頭、わきの下等） (3) 湿疹、かぶれ、傷口 (4) みずむし・たむし等又は化膿している患部 3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤を使用しないでください 4. 長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出ください (1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 次の医薬品の投与を受けている人 ニューキノロン系抗菌剤
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

[注意事項]

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

乾燥性皮膚治療薬

販売名: ウレパールプラスクリーム

● 1箱 (80g×1個)



包 装	1箱(80g)	内装(80g×10箱)	梱(80g×10箱×4)
サイズ(mm) ※1	69×69×43.5	144×351×48	310×372×119
重量(g)	149	1560	6680
使用期限		3年	
メーカー希望小売価格(税別)	1,840円	18,400円	73,600円
JANコード	4987117 140125	4987117 140118	4987117 140101
ITFコード	—	—	1 4987117 140108

参考画像



80g×1個



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)



ご使用前に必ずこの添付文書をお読みください。
また、必要なとき読めるように大切に保管してください。

乾燥性皮膚治療薬

第2類医薬品


ウレパール[®]プラスクリーム

エアコンやアルミサッシによる住環境の密閉化により、季節にかかわらず皮膚が乾燥しやすい状況におかれています。また、年齢や体质、栄養のバランスなどにより、皮脂の分泌が低下したり、皮膚の表面にある角質層に水分を保持するはたらきが弱くなることがあります。このような場合、皮膚はうるおいをなくし、カサカサの「乾燥性皮膚」になります。乾燥性皮膚は、気温や湿度の変化、衣類などさまざまな刺激に敏感になり、かゆみを起こしやすくなります。特に気温が低く、空気が乾燥する冬季に多く発症し、夜間にかゆみがひどくなるのが特徴です。


●ウレパール プラス クリームの特徴

乾燥性皮膚に伴うかゆみを鎮めると同時に、皮膚をしっとりなめらかにします。

親水性のクリームで皮膚によくのび、患部にすっとなじみます。




●こんなカサカサ皮膚に効果があります。




お風呂上がりや就寝中など
体が温まってかゆい所に。



うで、あし、腰、背中などが
カサついてかゆい所に。



衣類などの刺激で
かゆい所に。



お子様のかゆみを伴う
カサついた皮膚に。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないでください。

- (1) 目のまわり、粘膜(例えば口腔、鼻腔、膣等)など
- (2) 炎症又は傷のある患部
- (3) ただれやひび割れのひどい患部



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)又は刺激症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	かぶれ、発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、ぴりぴり感)、はれ、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

プラスは登録商標です。

[効能・効果]

かゆみを伴う乾燥性皮膚(老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮膚)

- 老人・成人の乾皮症とは…皮脂の分泌低下により全身の皮膚が乾燥し、うるおいがなくなります。特にひざから足首までの部分、おしりの部分などに多く見られ、しばしばかゆみを伴います。
- 小児の乾燥性皮膚とは…主に毛孔(毛穴)に一致した鳥肌様のザラザラと乾燥した皮膚で、かゆみを伴います。一般に冬に悪くなり、夏に軽くなります。

[用法・用量]

1日1～数回、適量を患部に塗布します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)本剤は外用にのみ使用してください。
- (4)患部やその周辺の汚れを落としてから使用してください。
- (5)定められた用法・用量を守ってください。
- (6)化粧品ではないので、効能・効果で定められた患部のみに使用し、基礎化粧等の目的で顔面には使用しないでください。

[成分]

100g中に次の成分を含有するクリーム剤です。

尿素10.0g、ジフェンヒドラミン塩酸塩1.0g、d-カンフル1.0g、リドカイン2.0g、トコフェロール酢酸エステル0.3g

なお、添加物としてメチルパラベン、BHT、トリイソオクタン酸グリセリン、ミリスチン酸オクチルドデシル、コレステロール、メチルポリシロキサン、ステアリルアルコール、セタノール、ベヘニルアルコール、ステアリン酸グリセリル、ステアリン酸ソルビタン、ポリオキシエチレンベヘニルエーテル、ステアリン酸マクロゴール、ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸Na、グリシン、DL-アラニン、塩化Na、グリセリン、乳酸Na、乳酸、精製水を含有します。

[保管及び取扱い上の注意]

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (5)外箱及び容器に表示の使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

[包装]

80g プラスチック瓶入り

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

連絡先 大鵬薬品工業株式会社 お客様相談室

〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27

電話番号 0120-4527-66 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

副作用被害救済制度とは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものその他、薬局などで購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用により、入院が必要な程度の疾病や障害などの健康被害を受けた方に対して、医療費等の救済給付を行う公的な制度です。

(独)医薬品医療機器総合機構

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話0120-149-931 (フリーダイヤル)

販売元



大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27

製造販売元



岡山大鵬薬品株式会社
岡山県備前市久々井字沖1775-1

2025.03 UPC250502

ウレパールプラスクリーム

医薬品を正しく購入するための
説明文書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ウレパールプラスクリーム
2	成分・分量	100g 中 尿素 10.0g ジフェンヒドラミン塩酸塩 1.0g d-カンフル 1.0g リドカイン 2.0g トコフェロール酢酸エステル 0.3g
3	用法・用量	1日1～数回、適量を患部に塗布します
4	効能・効果	かゆみを伴う乾燥性皮膚（老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮膚）
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	次の部位には使用しないでください (1) 目のまわり、粘膜（例えば口腔、鼻腔、膣等）など (2) 炎症又は傷のある患部 (3) ただれやひび割れのひどい患部 次に該当する人はお申し出ください • 医師の治療を受けている人 • 薬などによりアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）又は刺激症状を起こしたことがある人
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

[注意事項]

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

乾燥性皮膚治療薬

販売名: ウレパールプラスローション10

● 1箱 (100mL×1本)



包装	1箱(100mL)	内装(100mL×10箱)	梱(100mL×10箱×4)
サイズ(mm) ※1	30×54×146	110×161×149	241×339×178
重量(g)	133	1390	5880
使用期限		3年	
メーカー希望小売価格(税別)	1,840円	18,400円	73,600円
JANコード	4987117 140323	4987117 140316	4987117 140309
ITFコード	—	—	1 4987117 140306

参考画像




100mL×1本



内用液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)



ご使用前に必ずこの添付文書をお読みください。
また、必要なとき読めるように大切に保管してください。

乾燥性皮膚治療薬

第2類医薬品

ウレパール®プラスローション10


エアコンやアルミサッシによる住環境の密閉化により、季節にかかわらず皮膚が乾燥しやすい状況におかれています。また、年齢や体质、栄養のバランスなどにより、皮脂の分泌が低下したり、皮膚の表面にある角質層に水分を保持するはたらきが弱くなることがあります。このような場合、皮膚はうるおいをなくし、カサカサの「乾燥性皮膚」になります。乾燥性皮膚は、気温や湿度の変化、衣類などさまざまな刺激に敏感になり、かゆみを起こしやすくなります。特に気温が低く、空気が乾燥する冬季に多く発症し、夜間にかゆみがひどくなるのが特徴です。

●ウレパール プラス ローション10の特徴

乾燥性皮膚に伴うかゆみを鎮めると同時に、皮膚をしっとりなめらかにします。

広い範囲に塗りやすいローションタイプで、しっとりなのにペタつかず、服がすぐに着られます。


乾燥対策



尿素が
乾燥した皮膚に
水分を集め、
逃さないように
します。




かゆみ止め対策




かゆみ止め成分
ジフェンヒドラミン塩酸塩、
リドカインが
しつこいかゆみを
鎮めます。


●こんなカサカサ皮膚に効果があります。




お風呂上がりや就寝中など
体が温まってかゆい時に。



うで、あし、腰、背中など
がカサついてかゆい時に。



衣類などの刺激で
かゆい時に。



お子様のかゆみを伴う
カサついた皮膚に。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないでください。

- (1)目のまわり、粘膜(例えば口腔、鼻腔、膣等)など
- (2)炎症又は傷のある患部
- (3)ただれやひび割れのひどい患部



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)薬などによりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)
又は刺激症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに
使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談
してください。

関係部位	症 状
皮 膚	かぶれ、発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、ぴり ぴり感)、はれ、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この添付文
書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

プラスは登録商標です。

[効能・効果]

かゆみを伴う乾燥性皮膚(老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮膚)

- 老人・成人の乾皮症とは…皮脂の分泌低下により全身の皮膚が乾燥し、うるおいがなくなります。特にひざから足首までの部分、おしりの部分などに多く見られ、しばしばかゆみを伴います。
- 小児の乾燥性皮膚とは…主に毛孔(毛穴)に一致した鳥肌様のザラザラと乾燥した皮膚で、かゆみを伴います。一般に冬に悪くなり、夏に軽くなります。

[用法・用量]

1日1～数回、適量を患部に塗布します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)本剤は外用にのみ使用してください。
- (4)患部やその周辺の汚れを落としてから使用してください。
- (5)定められた用法・用量を守ってください。
- (6)化粧品ではないので、効能・効果で定められた患部のみに使用し、基礎化粧等の目的で顔面には使用しないでください。

[成分]

100mL中に次の成分を含有します。

尿素 10.0g、リドカイン 2.0g、ジフェンヒドラミン塩酸塩 1.0g

なお、添加物としてグリセリン、セバシン酸ジイソプロピル、乳酸、乳酸Na、ヒドロキシプロピルセルロース、精製水、香料、エタノールを含有します。

[保管及び取扱い上の注意]

- (1)高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)燃える性質がありますので、火気に近づけないでください。
- (5)使用済の容器は火中に投じないでください。
- (6)アルコール等に溶けるおそれのあるもの(メガネのわく、塗装家具等)には、本剤がつかないようにしてください。
- (7)本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (8)外箱及び容器に表示の使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

[包装]

110mL プラスチック瓶入り

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

連絡先 大鵬薬品工業株式会社 お客様相談室

〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27

電話番号 0120-4527-66 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

副作用被害救済制度とは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものその他、薬局などで購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用により、入院が必要な程度の疾病や障害などの健康被害を受けた方に対して、医療費等の救済給付を行う公的な制度です。

(独)医薬品医療機器総合機構

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話0120-149-931 (フリーダイヤル)

販売元



大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27

製造販売元



岡山大鵬薬品株式会社
岡山県備前市久々井字沖1775-1

2025.03 UPL250502

ウレパールプラスローション 10

医薬品を正しく購入するための
説明文書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ウレパールプラスローション10
2	成分・分量	100mL 中 尿素 10.0g リドカイン 2.0g ジフェンヒドラミン塩酸塩 1.0g
3	用法・用量	1日1～数回、適量を患部に塗布します
4	効能・効果	かゆみを伴う乾燥性皮膚（老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮膚）
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>次の部位には使用しないでください (1) 目のまわり、粘膜（例えば口腔、鼻腔、膣等）など (2) 炎症又は傷のある患部 (3) ただれやひび割れのひどい患部</p> <p>次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人 ・薬などによりアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等） 又は刺激症状を起こしたことがある人</p>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

生薬製剤

販売名: 扁鵲 へんせき

● 1箱 (2g×21包)



包 装	1箱(2g×21包)	内装[(2g×21包)×10箱]	梱[(2g×21包)×10箱×6]
サイズ(mm) ※1	33×83×153	172×174×159	360×540×180
重量(g)	77	860	5700
使用期限		5年	
メーカー希望小売価格(税別)	2,185円	21,850円	131,100円
JANコード	4987117 670448	4987117 670455	4987117 670462
ITFコード	—	—	1 4987117 670469

● 1箱 (2g×60包)



包 装	1箱(2g×60包)	内装[(2g×60包)×4箱]	梱[(2g×60包)×4箱×6]
サイズ(mm) ※1	70×84×154	172×141×158	360×435×180
重量(g)	197	840	5700
使用期限		5年	
メーカー希望小売価格(税別)	5,520円	22,080円	132,480円
JANコード	4987117 670417	4987117 670424	4987117 670431
ITFコード	—	—	1 4987117 670438

参考画像



アルミ包装



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

生薬製剤

扁 鵲

へん せき

特徴 11種類の生薬が脂肪過多症に効く。

⚠【使用上の注意】

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
- (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
- (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (6) 次の医薬品を服用している人
瀉下薬(下剤)

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛、便秘、吐き気・嘔吐
そ の 他	むくみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

軟便、下痢

4. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

脂肪過多症

用法・用量

食間に水又はお湯にて服用します。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(16歳以上)	1包	3回
7~15歳	1/2包	
7歳未満	服用しないでください	

食間とは食事と食事の間という意味で、食後2~3時間を持ちます。

〈用法・用量に連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

本品3包(6g)中、下記生薬を含有します。

タクシャ(澤瀉)…0.86g	ダイオウ(大黄)…0.43g	ショウキョウ(生姜)…0.43g
カンゾウ(甘草)…0.43g	ケイヒ(桂皮)…0.43g	シャクヤク(芍薬)…0.43g
ボタンピ(牡丹皮)…0.43g	チョレイ(猪苓)…0.86g	サイコ(柴胡)…0.86g
ハンゲ(半夏)…0.43g	ショウマ(升麻)…0.43g	

添加物は含有していません。



〈成分・分量に連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがあります、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

包 装

1包(2g)×21包、1包(2g)×60包

お問い合わせ先

お問い合わせはお買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

連絡先 大鵬薬品工業株式会社 お客様相談室

〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27

電話番号: 0120-4527-66 受付時間: 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ホームページ: <https://www.taiho.co.jp/>

販売元
2001GA



大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27

製造販売元

株式会社 連林松鶴堂
埼玉県戸田市戸田公園3-7

扁鵲

医薬品を正しく購入するための
説明文書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	扁鵲（ヘンセキ）																						
2	成分・分量	<p>3包 (6g) 中</p> <table> <tr><td>タクシャ末</td><td>0.86g</td></tr> <tr><td>ダイオウ末</td><td>0.43g</td></tr> <tr><td>ショウキョウ末</td><td>0.43g</td></tr> <tr><td>カンゾウ末</td><td>0.43g</td></tr> <tr><td>ケイヒ末</td><td>0.43g</td></tr> <tr><td>シャクヤク末</td><td>0.43g</td></tr> <tr><td>ボタンピ末</td><td>0.43g</td></tr> <tr><td>チョレイ末</td><td>0.86g</td></tr> <tr><td>サイコ末</td><td>0.86g</td></tr> <tr><td>ハンゲ末</td><td>0.43g</td></tr> <tr><td>ショウマ末</td><td>0.43g</td></tr> </table>	タクシャ末	0.86g	ダイオウ末	0.43g	ショウキョウ末	0.43g	カンゾウ末	0.43g	ケイヒ末	0.43g	シャクヤク末	0.43g	ボタンピ末	0.43g	チョレイ末	0.86g	サイコ末	0.86g	ハンゲ末	0.43g	ショウマ末	0.43g
タクシャ末	0.86g																							
ダイオウ末	0.43g																							
ショウキョウ末	0.43g																							
カンゾウ末	0.43g																							
ケイヒ末	0.43g																							
シャクヤク末	0.43g																							
ボタンピ末	0.43g																							
チョレイ末	0.86g																							
サイコ末	0.86g																							
ハンゲ末	0.43g																							
ショウマ末	0.43g																							
3	用法・用量	<p>食間に水又はお湯にて服用します</p> <table> <thead> <tr><th>年齢</th><th>1回量</th><th>1日服用回数</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>成人（16歳以上）</td><td>1包</td><td rowspan="2">3回</td></tr> <tr><td>7～15歳</td><td>1／2包</td></tr> <tr><td>7歳未満</td><td>服用しないでください</td><td></td></tr> </tbody> </table>	年齢	1回量	1日服用回数	成人（16歳以上）	1包	3回	7～15歳	1／2包	7歳未満	服用しないでください												
年齢	1回量	1日服用回数																						
成人（16歳以上）	1包	3回																						
7～15歳	1／2包																							
7歳未満	服用しないでください																							
4	効能・効果	脂肪過多症																						
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください 次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている人 ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人） ・胃腸が弱く下痢しやすい人 ・今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 ・次の医薬品を服用している人 滌下薬（下剤） 																						
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項																							

[注意事項]

- 1.本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 2.情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 3.使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

生薬製剤

かんせい
販売名: 肝生

● 1袋 (2g×1包)



包装	1包 (2g)	内装 [(2g×1包)×10]	梱 [(2g×1包)×10×16]
サイズ(mm) ※1	125×65×5	92×75×131	382×315×150
重量(g)	3.9	59	1275
使用期限		5年	
メーカー希望小売価格(税別)	230円	2,300円	36,800円
JANコード	4968 4360	4987117 219043	4987117 219050
ITFコード	—	—	1 4987117 219033

● 箱 (2g×21包)



包装	1箱 (2g×21包)	内装 [(2g×21包)×10箱]	梱 [(2g×21包)×10箱×6]
サイズ(mm) ※1	33×83×156	172×174×159	360×540×180
重量(g)	77	860	5700
使用期限		5年	
メーカー希望小売価格(税別)	2,875円	28,750円	172,500円
JANコード	4987117 219104	4987117 219111	4987117 219128
ITFコード	—	—	1 4987117 219101

● 1箱 (2g×60包)



包装	1箱 (2g×60包)	内装 [(2g×60包)×4箱]	梱 [(2g×60包)×4箱×6]
サイズ(mm) ※1	70×83×154	172×141×158	360×435×180
重量(g)	197	840	5700
使用期限		5年	
メーカー希望小売価格(税別)	6,900円	27,600円	165,600円
JANコード	4987117 219005	4987117 219012	4987117 219029
ITFコード	—	—	1 4987117 219002

参考画像



アルミ包装



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

生薬製剤

肝生

かん せい

特徴 肝臓の機能を正常に近づけます。

△【使用上の注意】

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
- (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
- (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (6) 次の医薬品を服用している人
瀉下薬(下剤)

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

軟便、下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

肝臓機能障害、肝臓肥大、急・慢性肝炎、黄疸、胆のう炎

用法・用量

食間に水又はお湯にて服用します。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包(2g)	3回
15歳未満	服用しないでください	

食間とは食事と食事の間という意味で、食後2~3時間を持ちます。

成分・分量

本品3包(6g)中、下記生薬より製した肝生乾燥エキス2gを含有します。

サンソウニン(酸棗仁) ... 1.46g	ニンジン(人参) ... 1.46g	サンシシ(山梔子) ... 1.46g
シャゼンシ(車前子) ... 1.46g	ソウハクヒ(桑白皮) ... 1.46g	キヅツ(枳実) ... 1.46g
シュクシャ(縮砂) ... 1.46g	ケイヒ(桂皮) ... 0.37g	ダイオウ(大黄) ... 0.37g
ウバイ(烏梅) ... 1.46g	キッピ(橘皮) ... 1.46g	ガイヨウ(艾葉) ... 1.46g

添加物として乳糖水和物及びカルメロースナトリウムを含有します。



サンソウニン(酸棗仁) ニンジン(人参) サンシシ(山梔子) シャゼンシ(車前子) ソウハクヒ(桑白皮) キヅツ(枳実)

〈成分・分量に関する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがあります。品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

包装

1包(2g)×60包、1包(2g)×21包

お問い合わせ先

お問い合わせはお買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

連絡先 大鵬薬品工業株式会社 お客様相談室

〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27

電話番号: 0120-4527-66 受付時間: 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ: <https://www.taiho.co.jp/>

販売元 **TAIHO** 大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27

製造販売元 株式会社 達林松鶴堂
埼玉県戸田市戸田公園3-7

肝生

医薬品を正しく購入するための
説明文書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	肝生（カンセイ）																								
2	成分・分量	<p>3包（6g）中、下記生薬より製した肝生乾燥エキス2gを含有します</p> <table> <tr><td>サンソウニン（酸棗仁）</td><td>1.46g</td></tr> <tr><td>ニンジン（人参）</td><td>1.46g</td></tr> <tr><td>サンシシ（山梔子）</td><td>1.46g</td></tr> <tr><td>シャゼンシ（車前子）</td><td>1.46g</td></tr> <tr><td>ソウハクヒ（桑白皮）</td><td>1.46g</td></tr> <tr><td>キヅツ（枳実）</td><td>1.46g</td></tr> <tr><td>シュクシャ（縮砂）</td><td>1.46g</td></tr> <tr><td>ケイヒ（桂皮）</td><td>0.37g</td></tr> <tr><td>ダイオウ（大黃）</td><td>0.37g</td></tr> <tr><td>ウバイ（烏梅）</td><td>1.46g</td></tr> <tr><td>キッピ（橘皮）</td><td>1.46g</td></tr> <tr><td>ガイヨウ（艾葉）</td><td>1.46g</td></tr> </table>	サンソウニン（酸棗仁）	1.46g	ニンジン（人参）	1.46g	サンシシ（山梔子）	1.46g	シャゼンシ（車前子）	1.46g	ソウハクヒ（桑白皮）	1.46g	キヅツ（枳実）	1.46g	シュクシャ（縮砂）	1.46g	ケイヒ（桂皮）	0.37g	ダイオウ（大黃）	0.37g	ウバイ（烏梅）	1.46g	キッピ（橘皮）	1.46g	ガイヨウ（艾葉）	1.46g
サンソウニン（酸棗仁）	1.46g																									
ニンジン（人参）	1.46g																									
サンシシ（山梔子）	1.46g																									
シャゼンシ（車前子）	1.46g																									
ソウハクヒ（桑白皮）	1.46g																									
キヅツ（枳実）	1.46g																									
シュクシャ（縮砂）	1.46g																									
ケイヒ（桂皮）	0.37g																									
ダイオウ（大黃）	0.37g																									
ウバイ（烏梅）	1.46g																									
キッピ（橘皮）	1.46g																									
ガイヨウ（艾葉）	1.46g																									
3	用法・用量	<p>食間に水又はお湯にて服用します</p> <table> <thead> <tr><th>年齢</th><th>1回量</th><th>1日服用回数</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>成人（15歳以上）</td><td>1包（2g）</td><td>3回</td></tr> <tr><td>15歳未満</td><td>服用しないでください</td><td></td></tr> </tbody> </table>	年齢	1回量	1日服用回数	成人（15歳以上）	1包（2g）	3回	15歳未満	服用しないでください																
年齢	1回量	1日服用回数																								
成人（15歳以上）	1包（2g）	3回																								
15歳未満	服用しないでください																									
4	効能・効果	肝臓機能障害、肝臓肥大、急・慢性肝炎、黄疸、胆のう炎																								
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください 次に該当する方はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている人 ・妊娠又は妊娠していると思われる人 ・体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人） ・胃腸が弱く下痢しやすい人 ・今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 ・次の医薬品を服用している人 滌下薬（下剤） 																								
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項																									

[注意事項]

- 1.本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 2.情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 3.使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

鎮咳去痰薬

販売名: ピタスせきトローチ

● 1箱 (12個)



包装	1箱(12個)	内装(12個×10箱)	梱(12個×10箱×10)
サイズ(mm) ※1	12×70×115	141×72×119	159×250×386
重量(g)	23.2	264.7	3000
使用期限	3年		
メーカー希望小売価格(税別)	805円	8,050円	80,500円
JANコード	4519 8625	4987117 219173	4987117 219180
ITFコード	—	—	1 4987117 219194

参考画像



アルミ包装



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)



ピタスせきトローチ

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ピタスせきトローチ												
2	成分・分量	6個(1日使用量) 中 フェノールフタリン酸デキストロメトルファン 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 140mg セチルピリジニウム塩化物水和物 6mg												
3	用法・用量	次の量を口中に含み、 かますにゆっくり溶かして使用してください <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>年齢</th> <th>1回量</th> <th>1日使用回数</th> <th>使用間隔</th> </tr> <tr> <td>成人(15歳以上)</td> <td>1個</td> <td>6回</td> <td>2時間以上</td> </tr> <tr> <td>15歳未満</td> <td colspan="3">使用しないこと</td> </tr> </table>	年齢	1回量	1日使用回数	使用間隔	成人(15歳以上)	1個	6回	2時間以上	15歳未満	使用しないこと		
年齢	1回量	1日使用回数	使用間隔											
成人(15歳以上)	1個	6回	2時間以上											
15歳未満	使用しないこと													
4	効能・効果	せき、たん、 のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ												
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は使用しないでください 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 2. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) 次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人 ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・高熱の症状のある人 3. 使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと(眠気等があらわれることがある。)												
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項													

[注意事項]

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

IV

第3類 医薬品

添付文書・説明文書集



滋養強壮剤

販売名: チオビタドリンク1000

●1本 (100mL)



包 装	1本(100mL)
サイズ(mm)	胴径45×高さ120
重量(g)	208
使用期限	3年
メーカー希望小売価格(税別)	184円
JANコード	4987117 437805
ITFコード	—

●1箱 (100mL×10本)



包 装	1箱(100mL×10本)	梱(100mL×10本×5)
サイズ(mm) ※1	96×231×122	240×492×128
重量(g)	2176	11196
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	1,840円	9,200円
JANコード	4987117 437812	4987117 437829
ITFコード	—	1 4987117 437826

参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)

販売名：チオビタ ドリンク 1000

⚠️ [使用上の注意] 相談すること

1. 服用後、皮膚に発疹があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。2. 服用後、下痢があらわれることがあるので、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。3. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

〔効能・効果〕○滋養強壮○虚弱体質○肉体疲労

・病中病後・食欲不振・
栄養障害・発熱性消耗
性疾患・産前産後など
の場合の栄養補給〔用
法・用量〕成人(15歳
以上)1日1回1本(100
mL)を服用して下さい。
● 小児(15歳未満)は服
用しないで下さい。●用
法・用量を守って下さい。

副作用救済制度
TEL 0120-149-931

100mL
金 属:キャップ
ガラス:瓶 L1906

滋養強壮・虚弱体質・栄養補給

チオビタ®
ドリンク
1000

TIOVITA

第3類医薬品

〔成分(1本100mL中)〕 タウリン
1000mg・イノシトール50mg・ニコチ
ン酸アミド20mg・チアミン硝化物(ビ
タミンB1)10mg・リボフラビンリン酸
エステルナトリウム(ビタミンB2)5mg・
ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)50mg
・カルニチン塩化物100mg・無水カフェ
イン50mg 添加物：白糖・果糖・ブドウ
糖・DL-リノゴ酸・没食子酸プロピル・
安息香酸Na・pH調整剤・バニリン・エ
チルバニリン・香料

●本剤に配合されているビタミン
B2により、尿が黄色になることが
あります、心配ありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない涼しい所
に保管して下さい。(2)小児の手の届
かない所に保管して下さい。(3)開栓
後の保存及び他の容器への入れ替えを
しないで下さい(誤用の原因になった
り品質が変わります)。(4)使用期限を
過ぎた製品は服用しないで下さい。

製造販売元

TAIHO
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>

使用期限 製造番号

チオビタドリンク1000

医薬品を正しく購入するための
説明文書

第3類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	チオビタドリンク1000																					
2	成分・分量	<p>1本 (100mL) 中</p> <table> <tr><td>タウリン</td><td>.....</td><td>1000mg</td></tr> <tr><td>イノシトール</td><td>.....</td><td>50mg</td></tr> <tr><td>ニコチン酸アミド</td><td>.....</td><td>20mg</td></tr> <tr><td>チアミン硝化物 (ビタミンB1)</td><td>.....</td><td>10mg</td></tr> <tr><td>ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6)</td><td>.....</td><td>50mg</td></tr> <tr><td>カルニチン塩化物</td><td>.....</td><td>100mg</td></tr> <tr><td>無水カフェイン</td><td>.....</td><td>50mg</td></tr> </table>	タウリン	1000mg	イノシトール	50mg	ニコチン酸アミド	20mg	チアミン硝化物 (ビタミンB1)	10mg	ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6)	50mg	カルニチン塩化物	100mg	無水カフェイン	50mg
タウリン	1000mg																					
イノシトール	50mg																					
ニコチン酸アミド	20mg																					
チアミン硝化物 (ビタミンB1)	10mg																					
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6)	50mg																					
カルニチン塩化物	100mg																					
無水カフェイン	50mg																					
3	用法・用量	<p>成人 (15歳以上) は、1日1回1本 (100mL) を服用してください ●小児 (15歳未満) は服用しないでください</p>																					
4	効能・効果	滋養強壮、虚弱体质、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給																					
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項																						
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項																						

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

滋養強壮剤

販売名: チオビタドリンクアイビタス

●1本 (100mL)



包 装	1本(100mL)
サイズ(mm)	胴径45×高さ120
重量(g)	208
使用期限	3年
メーカー希望小売価格(税別)	207円
JANコード	4987117 439304
ITFコード	—

●1パック (100mL×3本)



包 装	1パック(100mL×3本)	梱(100mL×3本×10)
サイズ(mm) ※1	45×135×120	280×255×130
重量(g)	624	6512
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	621円	6,210円
JANコード	4987117 439335	4987117 439342
ITFコード	—	1 4987117 439349

●1箱 (100mL×10本)



包 装	1箱(100mL×10本)	梱(100mL×10本×5)
サイズ(mm) ※1	96×231×122	240×492×128
重量(g)	2176	11196
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	2,070円	10,350円
JANコード	4987117 439311	4987117 439328
ITFコード	—	1 4987117 439325

参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)

第3類医薬品 チオビタドリンクアイビタス
(使用上の注意) [相談すること]

1. 服用後、皮膚に発疹があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。2. 服用後、下痢があらわれることがあるので、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。3. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(効能・効果)○滋養強壮○虚弱体质

質○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給 [用法・用量]成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用して下さい。●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。●用法・用量を守って下さい。

100mL

ガラス:瓶
金 属:キャップ

4 987 117 439 304

滋養強壮・虚弱体质・栄養補給

チオビタ[®]
ドリンク
アイビタス

TIOVITA

第3類医薬品

(成分(1本100mL中))タウリン 1000mg、イジトール 50mg、ニコチニ酸アミド 20mg、チアミン硝化物(ビタミンB1)10mg、リボフラビンソリシン酸エチルナトリウム(ビタミンB2)15mg、ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)50mg、カルニチン塩化物120mg、無水カフェイン50mg、添加物:白糖、果糖、ブドウ糖、DL-リノゴ酸、没食子酸プロピリ、安息香酸Na、pH調整剤、バニリン、エチルバニリン、香料 ●本剤に配合されているビタミンB2により、尿が黄色になることがあります、心配ありません。

(保管及び取扱い上の注意) (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(貯用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

L1903



大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>

副作用救済制度 TEL 0120-149-931

使用期限

製造番号

チオビタドリンクアイビタス

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第3類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	チオビタドリンクアイビタス																								
2	成分・分量	<p>1本 (100mL) 中</p> <table> <tr><td>タウリン</td><td>.....</td><td>1000mg</td></tr> <tr><td>イノシトール</td><td>.....</td><td>50mg</td></tr> <tr><td>ニコチン酸アミド</td><td>.....</td><td>20mg</td></tr> <tr><td>チアミン硝化物 (ビタミンB1)</td><td>.....</td><td>10mg</td></tr> <tr><td>リボフラビンリン酸エステルナトリウム (ビタミンB2)</td><td>...</td><td>15mg</td></tr> <tr><td>ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6)</td><td>.....</td><td>50mg</td></tr> <tr><td>カルニチン塩化物</td><td>.....</td><td>120mg</td></tr> <tr><td>無水カフェイン</td><td>.....</td><td>50mg</td></tr> </table>	タウリン	1000mg	イノシトール	50mg	ニコチン酸アミド	20mg	チアミン硝化物 (ビタミンB1)	10mg	リボフラビンリン酸エステルナトリウム (ビタミンB2)	...	15mg	ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6)	50mg	カルニチン塩化物	120mg	無水カフェイン	50mg
タウリン	1000mg																								
イノシトール	50mg																								
ニコチン酸アミド	20mg																								
チアミン硝化物 (ビタミンB1)	10mg																								
リボフラビンリン酸エステルナトリウム (ビタミンB2)	...	15mg																								
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6)	50mg																								
カルニチン塩化物	120mg																								
無水カフェイン	50mg																								
3	用法・用量	<p>成人 (15歳以上) は、1日1回1本 (100mL) を服用してください</p> <p>●小児 (15歳未満) は服用しないでください</p>																								
4	効能・効果	滋養強壮、虚弱体质、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給																								
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項																									
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項																									

[注意事項]

- 1.本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 2.情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 3.使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

滋養強壮剤

販売名：チオビタドリンクアイビタスゼロ

●1本(100mL)



包 装	1本(100mL)
サイズ(mm)	胴径45×高さ120
重量(g)	208
使用期限	3年
メーカー希望小売価格(税別)	207円
JANコード	4987117 439908
ITFコード	—

●1パック(100mL×3本)



包 装	1パック(100mL×3本)	梱(100mL×3本×10)
サイズ(mm) ※1	45×135×120	280×255×130
重量(g)	624	6512
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	621円	6,210円
JANコード	4987117 439939	4987117 439946
ITFコード	—	1 4987117 439943

●1箱(100mL×10本)



包 装	1箱(100mL×10本)	梱(100mL×10本×5)
サイズ(mm) ※1	96×231×122	240×492×128
重量(g)	2176	11196
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	2,070円	10,350円
JANコード	4987117 439915	4987117 439922
ITFコード	—	1 4987117 439929

参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ (単位：mm)

服用に際してはラベルをよく読むこと

△ [使用上の注意] 相談すること

1. 服用後、皮膚に発疹があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。2. 服用後、下痢があらわれることがあるので、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。3. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。【効能・効果】○滋養強壮○虚弱体质○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給(用法・用量)成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用して下さい。●小兒(15歳未満)は服用しないで下さい。●用法・用量を守って下さい。



100mL

ガラス:瓶
金 属:キャップ



[成分(1本100mL中)]タウリン1000mg、イノシトール50mg、ニコチン酸アミド20mg、チアミン硝化物(ビタミンB1)10mg、リボフラビン15mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)50mg、カルニチン塩化物120mg、添加物エリスリトール、アセスルフルムK、スクロース、クエン酸、クエン酸Na、没食子酸プロピル、安息香酸Na、pH調整剤、バニリン、エチルバニリン、クエン酸トリエチル、サリチル酸メチル、オイゲノール、香料
●本剤に配合されているビタミンB6により、尿が黄色になることがあります。心配ありません。
【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小兒の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
TAIHO 東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL 0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>

④登録商標 L1902

副作用救済制度 TEL 0120-149-931

使用期限 製造番号

チオビタドリンクアイビタスゼロ

医薬品を正しく購入するための
説明文書

第3類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	チオビタドリンクアイビタスゼロ																					
2	成分・分量	<p>1本 (100mL) 中</p> <table> <tr><td>タウリン</td><td>.....</td><td>1000mg</td></tr> <tr><td>イノシトール</td><td>.....</td><td>50mg</td></tr> <tr><td>ニコチン酸アミド</td><td>.....</td><td>20mg</td></tr> <tr><td>チアミン硝化物 (ビタミンB1)</td><td>.....</td><td>10mg</td></tr> <tr><td>リボフラビンリン酸エステルナトリウム (ビタミンB2)</td><td>...</td><td>15mg</td></tr> <tr><td>ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6)</td><td>.....</td><td>50mg</td></tr> <tr><td>カルニチン塩化物</td><td>.....</td><td>120mg</td></tr> </table>	タウリン	1000mg	イノシトール	50mg	ニコチン酸アミド	20mg	チアミン硝化物 (ビタミンB1)	10mg	リボフラビンリン酸エステルナトリウム (ビタミンB2)	...	15mg	ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6)	50mg	カルニチン塩化物	120mg
タウリン	1000mg																					
イノシトール	50mg																					
ニコチン酸アミド	20mg																					
チアミン硝化物 (ビタミンB1)	10mg																					
リボフラビンリン酸エステルナトリウム (ビタミンB2)	...	15mg																					
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6)	50mg																					
カルニチン塩化物	120mg																					
3	用法・用量	<p>成人 (15歳以上) は、1日1回1本 (100mL) を服用してください ●小児 (15歳未満) は服用しないでください</p>																					
4	効能・効果	滋養強壮、虚弱体质、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給																					
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項																						
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項																						

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

外用鎮痛消炎薬

販売名: ゼノールチックE

● 1箱 (33g×1本)



包 装	1箱(33g×1本)	内装[(33g×1本)×10箱]	梱[(33g×1本)×10箱×10]
サイズ(mm) ※1	33×51×141	104×175×145	365×540×165
重量(g)	74	794	8638
使用期限		3年	
メーカー希望小売価格(税別)	978円	—	97,800円
JANコード	4987117 372052	—	4987117 372069
ITFコード	—	—	1 4987117 372066

参考画像



33g×1本



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)



ゼノールチック E

医薬品を正しく購入するための
説明文書

第3類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ゼノールチック E
2	成分・分量	100g 中 サリチル酸メチル 17.50g l-メントール 6.00g dl-カンフル 5.00g グリチルレチン酸 0.02g
3	用法・用量	通常、1日1～数回、適量を患部にすり込んでください
4	効能・効果	肩こり、筋肉疲労、筋肉痛、腰痛、関節痛、打撲、捻挫（ねんざ）、しもやけ
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	次の部位には使用しないでください (1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口 次に該当する人はお申し出ください (1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

V

指定医薬部外品

添付文書・説明文書集

TAIHO 大鵬薬品

ビタミン含有保健剤

販売名: チオビタ・ドリンク

● 1本 (100mL)



包 装	1本(100mL)
サイズ(mm)	胴径45×高さ120
重量(g)	208
使用期限	3年
メーカー希望小売価格(税別)	168円
JANコード	4987117 438710
ITFコード	—

参考画像



内容液

● シュリンクパック (100mL×2本)



包 装	1パック(100mL×2本)	梱(100mL×2本×15)
サイズ(mm) ※1	45×90×120	280×255×130
重量(g)	416	6512
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	336円	5,040円
JANコード	4987117 438956	4987117 438963
ITFコード	—	1 4987117 438953

● シュリンクパック (100mL×3本)



包 装	1パック(100mL×3本)	梱(100mL×3本×10)
サイズ(mm) ※1	45×135×120	280×255×130
重量(g)	624	6512
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	504円	5,040円
JANコード	4987117 438918	4987117 438932
ITFコード	—	1 4987117 438939

● 1箱 (100mL×10本)



包 装	1箱(100mL×10本)	梱(100mL×10本×5)
サイズ(mm) ※1	96×231×122	240×492×128
重量(g)	2176	11196
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	1,680円	8,400円
JANコード	4987117 438741	4987117 438802
ITFコード	—	1 4987117 438809

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)

〔保管及び取扱い上の注意〕 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

4 987117438710

疲労回復・予防に、愛情一本

TIOVITA

指定医薬部外品

チオビタ[®]
ドリンク

製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>



服用に際してはラベルをよく読むこと

△〔使用上の注意〕相談すること 1. 服用後、皮膚に発疹があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。2. 服用後、下痢があらわれることがあるので、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。3. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

〔効能・効果〕○疲労の回復・予防○日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防△疲れやすい、疲れが残る、体力がない、身体が重い、身体がだるい△体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善○病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

〔用法・用量〕成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用すること。

・小児(15歳未満)は服用しないこと。・用法・用量を守ること(他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意すること)。

〔成分(1本 100mL 中)〕

タウリン	1000mg
イノシトール	50mg
ニコチン酸アミド	20mg
チアミン硝化物(ビタミンB1)	5mg
リポフラビン(酸エフテル)	
ヒドロキシン塩酸塩(ビタミンB6)	5mg
カルニチン塩化物	100mg
無水カフェイン	50mg

添加物: 果糖ブドウ糖液糖、DL-リノ酸、没食子酸プロピル、安息香酸Na、pH調整剤、クエン酸、クエン酸Na-D-ソルビトール、バニリン、エチルバニリン、香料●ビタミンB2により、尿が黄色になることがあります、心配ありません。

ガラス:瓶
金 属:キャップ

④登録商標 L1906

100mL
70kcal

使用期限

製造番号

ビタミン含有保健剤

販売名: チオビタドリンク2000

● 1本 (100mL)



包 装	1本(100mL)
サイズ(mm)	胴径45×高さ120
重量(g)	208
使用期限	3年
メーカー希望小売価格(税別)	207円
JANコード	4987117 439106
ITFコード	—

● 1パック (100mL×3本)



包 装	1パック(100mL×3本)	梱(100mL×3本×10)
サイズ(mm) ※1	45×135×120	280×255×130
重量(g)	624	6512
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	621円	6,210円
JANコード	4987117 439205	4987117 439212
ITFコード	—	1 4987117 439219

● 1箱 (100mL×10本)



包 装	1箱(100mL×10本)	梱(100mL×10本×5)
サイズ(mm) ※1	96×231×122	240×492×128
重量(g)	2176	11196
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	2,070円	10,350円
JANコード	4987117 439113	4987117 439120
ITFコード	—	1 4987117 439127

参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)

チオビタドリンク2000 指定医薬部外品

服用に際してはラベルをよく読むこと

△ 使用上の注意 相談すること

1.次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。(1)服用後、発疹があらわれた場合、(2)しばらく服用しても症状がよくならない場合 2.下痢があらわれることがあるので、下痢の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。【効能・効果】○滋養強壮○虚弱体質○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・

発熱性消耗性疾患・

産前産後などの場合の栄養補給【用法・用量】成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用して下さい。●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。●用法・用量を守って下さい(他のビタミン等を含有する製剤を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意して下さい)。



滋養強壮・虚弱体質・栄養補給
TIOVITA
2000
指定医薬部外品

チオビタ
ドリンク2000

製造販売元



大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>

【成分】1本(100mL)中 タウリン2000mg・イノシトール50mg・ニコチン酸アミド20mg・チアミン硝化物(ビタミンB1)5mg・リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)5mg・ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)5mg・カルニチン塩化物100mg・無水カフェイン50mg・添加物:白糖・果糖・ブドウ糖・DL-リノゴ酸・没食子酸プロピル・安息香酸Na・pH調整剤・バニリン・香料●本剤に配合されているビタミンB2により、尿が黄色になることがあります、心配ありません。【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になつたり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

④登録商標 L1905 ガラス:瓶
100mL 金属:キャップ

使用期限 製造番号

健胃清涼剤

販売名: ソルマック胃腸液プラス

●1本 (50mL)



包 装	1本(50mL)
サイズ(mm)	胴径44×高さ105
重量(g)	135
使用期限	3年
メーカー希望小売価格(税別)	350円
JANコード	4514 4622
ITFコード	—

●1箱 (50mL×8本)



包 装	1箱(50mL×8本)	梱(50mL×8本×6)
サイズ(mm) ※1	89×177×107	280×365×115
重量(g)	1145	7100
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	2,800円	16,800円
JANコード	4987117 398571	4987117 398588
ITFコード	—	1 4987117 398585

参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)



健胃清涼剤

販売名: ソルマック5

● 1本 (50mL)



包 装	1本(50mL)
サイズ(mm)	胴径44×高さ105
重量(g)	135
使用期限	3年
メーカー希望小売価格(税別)	350円
JANコード	4514 4653
ITFコード	—

● 1箱 (50mL×2本)



包 装	1箱(50mL×2)	梱(50mL×2×24)
サイズ(mm) ※1	44×88×108	377×275×123
重量(g)	288	7210
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	700円	16,800円
JANコード	4987117 396201	4987117 396218
ITFコード	—	1 4987117 396208

● 1箱 (50mL×8本)



包 装	1箱(50mL×8本)	梱(50mL×8本×6)
サイズ(mm) ※1	89×177×107	280×365×115
重量(g)	1145	7100
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	2,800円	16,800円
JANコード	4987117 396065	4987117 396072
ITFコード	—	1 4987117 396055

参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)



ビタミン含有保健剤

販売名: ソルマック キュアールS

● 1袋 (20錠)



包 装	1袋(20錠)	内装(20錠×10)	梱(20錠×10×10)
サイズ(mm) ※1	6×90×147	68×93×152	205×366×189
重量(g)	11.34	139.9	1,820
使用期限	3年		
メーカー希望小売価格(税別)	1,480円	14,800円	148,000円
JANコード	4987117 400212	4987117 400229	4987117 400236
ITFコード	—	—	1 4987117 400219

参考画像



錠剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)



開封後はチャックを閉じて保存してください。

【指定医薬部外品】服用に際しては次の説明文を必ずお読みください。

販売名: ソルマック キュアルS ビタミン含有保健剤 10回分(20錠入り)

△ 使用上の注意

【功能・効果】

- 日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防
- ◆ 二日酔いに伴う食欲の低下、だるさ
- ◆ 肌の不調（肌荒れ、肌の乾燥）

【用法・用量】

次の量を水又はお湯にて服用してください。
成人(15歳以上) 1回2錠 1日1回
15歳未満 服用しないでください。

【用法・用量に関する注意】
用法・用量を守ってください。（他のビタミン等を含有する製品を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください。）

【成分・分量】 1日量(2錠中)

アスコルビン酸(ビタミンC)	300mg	添加物として、トウモロコシデンブン、乳糖、セルロース、カルメロース、ビドロキシプロピルセルロース、ステアリック酸Mg、ヒプロピロース、酸化チタン、タルク、マクロゴル、カルナウバロウ
レシスティン	80mg	
コハク酸d-α-トコフェロール(天然型ビタミンE)	20mg	
リボフラビン(ビタミンB ₂)	2mg	
ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	4mg	

【成分・分量に関する注意】①本剤の服用により、尿および大便の検査値に影響を与えることがありますので、これらの検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください。②本剤の服用により、尿が黄色になることがあります。これは本剤中のリボフラビン(ビタミンB₂)によるもので、ご心配りませ

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない温かいところにチャックをしっかり閉めて保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(4)服用期限の過ぎた製品は使用しないでください。(5)本剤にぬれた手で触れないでください。ぬれた手にいたる錠剤を元の容器にもどしますと、他の成分に影響を与えることがありますので戻さないでください。(6)容器の中に乾燥剤を入れてありますので、本剤を使い終わるまでは捨てないでください。また、間違って服用しないよう注意してください。

使用期限

製造番号



大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お問い合わせ室 TEL0120-4527-66
ホームページ: <http://www.taiho.co.jp>

PE_金属

製造販売元
京都薬品工業株式会社
京都市中京区西ノ京月輪町3番地

S201001
HO

口腔咽喉薬

販売名: ピタスのどトローチ

● 1箱 (12個)




包 装	1箱(12個)	内装(12個×10箱)	梱(12個×10箱×10)
サイズ(mm) ※1	12×70×115	141×72×119	159×250×386
重量(g)	23.2	264.7	3000
使用期限		3年	
メーカー希望小売価格(税別)	575円	5,750円	57,500円
JANコード	4519 8618	4987117 219142	4987117 219159
ITFコード	—	—	1 4987117 219163

参考画像



アルミ包装



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)



口腔咽喉薬

販売名: ピタスのどトローチ

● 1箱 (12個)




包 装	1箱(12個)	内装(12個×10箱)	梱(12個×10箱×10)
サイズ(mm) ※1	12×70×115	141×72×119	159×250×386
重量(g)	23.2	264.7	3000
使用期限	3年		
メーカー希望小売価格(税別)	575円	5,750円	57,500円
JANコード	4520 9604	4987117 219500	4987117 219517
ITFコード	—	—	1 4987117 219521

参考画像



アルミ包装



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)



口腔咽喉薬

販売名: ピタスのどトローチ L

● 1箱 (12個)




包 装	1箱(12個)	内装(12個×10箱)	梱(12個×10箱×10)
サイズ(mm) ※1	12×70×115	141×72×119	159×250×386
重量(g)	23.2	264.7	3000
使用期限	3年		
メーカー希望小売価格(税別)	575円	5,750円	57,500円
JANコード	4520 9611	4987117 219609	4987117 219616
ITFコード	—	—	1 4987117 219620

参考画像



アルミ包装



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)



口腔咽喉薬

販売名: ピタスクールトローチS

● 1箱 (12個)



包 装	1箱(12個)	内装(12個×10箱)	梱(12個×10箱×10)
サイズ(mm) ※1	12×70×115	141×72×119	159×250×386
重量(g)	23.2	264.7	3000
使用期限		3年	
メーカー希望小売価格(税別)	633円	6,330円	63,300円
JANコード	4520 9642	4987117 219906	4987117 219913
ITFコード	—	—	1 4987117 219927

参考画像



アルミ包装



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)



口腔咽喉薬

販売名: ピタスマディカルトローチ

● 1箱 (12個)




包 装	1箱(12個)	内装(12個×10箱)	梱(12個×10箱×10)
サイズ(mm) ※1	12×70×115	141×72×119	159×250×386
重量(g)	23.2	264.7	3000
使用期限	3年		
メーカー希望小売価格(税別)	633円	6,330円	63,300円
JANコード	4987117 220025	4987117 220001	4987117 220018
ITFコード	—	—	1 4987117 220022

参考画像



アルミ包装



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)



VI

そ の 他

添付文書・説明文書集

抗菌・ウィルス除去スプレー

製品名: Efil エフィル

● 1袋 (50mL×1本)



包 装	1本(50mL)	内袋(50mL×1本)×8	梱(50mL×8×6)
サイズ(mm) ※1	20×82×205	55×265×208	275×354×223
重量(g)	84	746	4908
使用期限		—	
メーカー希望小売価格(税別)	800円	—	38,400円
JANコード	4987117 172102	—	4987117 172119
ITFコード	—	—	1 4987117 172109

● 1箱 (300mL×1本)



包 装	1本(300mL)	内袋(300mL×1本)×6	梱(300mL×6×3)
サイズ(mm) ※1	77×91×212	161×282×221	291×503×260
重量(g)	399	2574	8502
使用期限		—	
メーカー希望小売価格(税別)	1,500円	—	27,000円
JANコード	4987117 172126	—	4987117 172133
ITFコード	—	—	1 4987117 172123

参考画像



50mL×1本



300mL×1本

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)

外出先でも!

TAIHO 大鵬薬品

菌・ウイルスを取り除く
だけでなく、寄せ付けない

24時間 離菌バリア

ウイルス除去・抗菌スプレー

Efil
TURN YOUR LIFE AROUND
エフィル

■ ウィルス除去・除菌
■ 抗ウイルス・抗菌
■ 消臭

● みずみずしいアクアの香り ●

※すべての菌・ウイルスに対して効果があるわけではありません。
また、使用環境や保存環境により持続効果は異なる可能性があります。

MADE IN JAPAN

Efil【エフィル】
ウイルス除去・抗菌スプレー

S200503
外袋: PP,PET
内容量: 50mL
(約400ブッシュ)

特徴

- 独自の技術で銀イオン、亜鉛イオンとエタノールを同時に配合し、菌やウイルスに対して優れた即効性・持続性・消臭力を実現。
- 抗菌・抗ウイルス効果が24時間持続することで、菌・ウイルスを寄せ付けません(=離菌)。
- 塩素成分は含まれておません。
- 各種試験により有効性と安全性を確認しております。

※すべての菌・ウイルスに対して効果があるわけではありません。また、使用環境や保存環境により持続効果は異なる可能性があります。
効果は噴射液がついた部分に限られます。

成分

エタノール、精製水、イソプロパノール、グリセリン、
銀化合物、除菌成分(有機系)、亜鉛化合物、香料

WEBサイトはこちら

成分

エタノール、精製水、イソプロパノール、グリセリン、
銀化合物、除菌成分(有機系)、亜鉛化合物、香料

QRコード

使用上の注意

1. 本品は手指などの人体・ペットには使用しないでください。2. 用途以外には使用しないでください。3. 一部の金属等、材質によっては変質(変色)する恐れがあるため、注意してください。4. 汚れが原因のニオイは、使用後、汚れから再びニオイが発生することがあります。5. アルコールに弱い人、アレルギー症状やかぶれ等を起こしやすい体质の人は、ミストに触れたり、吸い込まないようにしてください。6. 狹い空間で使用する場合は、換気して使用してください。7. 塩素系製品と混ざると有毒なガスを発生する恐れがあるので注意してください。8. 故障の恐れがあるので、電気機器付近での使用は注意してください。9. 引火の恐れがあるので火気の付近では使用しないでください。10. 直射日光や火気および車内など高温になる場所を避け、子どもの手の届かない涼しい所に保管してください。

使えないもの

■革・和装品へは使用不可。毛・絹・レーヨン・アセテート・キュプラなど水に弱い繊維、水洗い不可の表示があるもの、防水・撥水加工など特殊加工されたものはシミになったり、風合いを損ねる恐れがあるので、あらかじめ目立たない部分で試してください。■シミ・変色の原因となるので、白地や淡い色の繊維製品や革製品、白木や桐、水性ワックス・ペンキ・ニス等の塗装部、アクリル製・スチロール製のプラスチック等に使用しないでください。

用途

布製品(衣類、カーペット、布団等寝具、タオル、ベビーカー等)、マスク、室内(床や壁、スイッチ、ドアノブ、トイレ、ベッド枠等)、PC、スマートフォン、嘔吐物、排泄物等。※マスクに使用する場合は外側にスプレーし、着用前によく乾かしてください。※スマートフォンなどの電子機器に使用する場合は、やわらかい布等を使用し、機器に直接吹きつけないでください。使用に際し、機器の説明書をよくご確認ください。

応急処置

■ 万一誤って飲み込んだ場合は、無理に吐かせず牛乳か水を飲ませるなどの処置をし、医師に相談してください。■ 万一目に入った場合は、すぐに多量の水で洗い流し、医師に相談してください。

使用方法

付属のキャップを外して使用してください。使用後は、付属のキャップを取り付けてください。【ウイルス除去・除菌・抗ウイルス・抗菌】汚染物を除去した後、約20cm離して表面が全体的に十分濡れる程度にスプレーしてください。スプレー後、しばらく置いてから使用してください。繊維製品については十分に乾いてから使用してください。【消臭】対象物に直接数回スプレーしてください。

製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>

4 987117 172102

**銀イオンとエタノールで
24時間の持続力!**

Efil ウイルス除去・抗菌スプレー
【エフィル】

特徴

- 独自の技術で銀イオン・亜鉛イオンとエタノールを同時に配合し、菌・ウイルスに対して殺された即効性・持続性・消臭力を実現。
- 抗菌・抗ウイルス効果が24時間持続することで、菌・ウイルスを寄せ付けません!【亜鉛】。
- 電離成分は含まれておません。
- 各種試験により有効性と安全性を確認しております。

※すべての菌・ウイルスに対して効果があるわけではありません。また、使用環境や保存環境により持続効果は異なる可能性があります。

成分
エタノール、精製水、イソプロパノール、グリセリン、銀化合物、
銀電離成分(有機系)、亜鉛化合物、香料

使用上の注意

1. 本品は手錠などの人・ペットには使用しないでください。
2. 用途以外には使用しないでください。
3. 一部の金属等、材質によっては変質(変色)する恐れがあるため、注意してください。
4. 汚れが原因のニオイは、使用後、汚れから再びニオイが発生することがあります。
5. アルコールに弱い人、アルギー症状やかぶれ等を起こしやすい人、皮膚の状態によってはシミになたり、風呂上がりを遅らせる恐れがあるので、あらかじめ目立たない部分で試してください。
6. 狹い空間で使用する場合は、換気して使用してください。
7. 塩素系殺菌と混ざると有毒なガスを発生する恐れがあるので、注意してください。
8. 故障の恐れがあるので、電気器具付近での使用は注意してください。引火の恐れがあるので火気の付近では使用しないでください。
9. 直射日光や火気および車内など高温になる場所を避け、子どもの手の届かない涼しい所に保管してください。

使えないもの

- 油・和装品等では使用不可。毛・綿・レーヨン・アセート・キュプラなど淡水洗濯用洗剤・水洗い不可の表示があるもの、防水・撥水加工など特殊加工されたものはシミになたり、風呂上がりを遅らせる恐れがあるので、あらかじめ目立たない部分で試してください。
- シミ・変色の原因となるので、白地や涼い色の織物製品や革製品、白木や柄、水性ワックス・ハンドギーパー等の金属製、アクリル製・スチロール製のプラスチック等に使用しないでください。

応急処置

- 万一誤って飲み込んだ場合は、無理に吐かせず牛乳か水を飲ませるなどの処置をし、医師に相談してください。
- 万一目に入った場合は、すぐに多量の水で洗い流し、医師に相談してください。

内容量: 300mL(約460ブッシュ)

製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-28
お客様相談室 TEL:0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/ 4 987117172126

効果イメージ

24時間離菌バリア Efil
【エフィル】

**菌・ウイルスを取り除く
だけでなく、寄せ付けない**

24時間離菌バリア

ウイルス除去・抗菌スプレー

Efil
TURN YOUR LIFE AROUND
【エフィル】

用途

ウイルス除去・除菌
抗ウイルス・抗菌
消臭

みずみずしいアクアの香り

銀イオンとエタノールの力

大鵬薬品

ウイルス除去・除菌・抗ウイルス・抗菌
汚染物を除去した後、約20cm離して表面が全体的に十分濡れる程度にスプレーしてください。スプレー後、しばらく置かれてから使用してください。殺菌製品については十分に乾いてから使用してください。

対象物に直接数回スプレーしてください。

MADE IN JAPAN
S200503 外箱

VII

特定先用

添付文書・説明文書集



滋養強壮剤

販売名：チオビタドリンクブイスーパー

● 1本 (100mL)



包 装	1本(100mL)
サイズ(mm)	胴径45×高さ120
重量(g)	208
使用期限	3年
メーカー希望小売価格(税別)	207円
JANコード	4987117 450002
ITFコード	—

● 1パック (100mL×3本)



包 装	1パック(100mL×3本)	梱(100mL×3本×10)
サイズ(mm) ※1	45×135×120	280×255×130
重量(g)	624	6512
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	621円	6,210円
JANコード	4987117 450033	4987117 450040
ITFコード	—	1 4987117 450030

● 1箱 (100mL×10本)



包 装	1箱(100mL×10本)	梱(100mL×10本×5)
サイズ(mm) ※1	96×231×122	240×492×128
重量(g)	2176	11196
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	2,070円	10,350円
JANコード	4987117 450019	4987117 450026
ITFコード	—	1 4987117 450009

参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ (単位：mm)

販売名:チオビタドリンクブイースター
服用に際してはラベルをよくお読み下さい

⚠️ [使用上の注意] 相談すること

1. 服用後、皮膚に発疹があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。2. 服用後、下痢があらわれることがあるので、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。3. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。[効能・効果]

- 滋養強壮・虚弱体质
- 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給[用法・用量]成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用して下さい。●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。●用法・用量を守って下さい。

100mL

ガラス:瓶
金 属:キャップ

④登録商標 L2002

第3類医薬品

滋養強壮・虚弱体质・栄養補給

チオビタ®
ドリンク
V super

販売名:チオビタドリンクブイースター

TIOVITA

[成分(1本100mL中)] タウリン2000mg、イノシトール50mg、ニコチニ酸アミド20mg、チアミン硝化物(ビタミンB1)10mg、リボフラビンリノ酸エスチルナトリウム(ビタミンB2)5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)50mg、カルニチン塩化物100mg、無水カフェイン50mg 添加物: 白糖、果糖、ブドウ糖、クエン酸、クエン酸Na、DL-リンゴ酸、没食子酸プロピル、安息香酸Na、pH調整剤、オイゲノール、香料 ●本剤に配合されているビタミンB6により、尿が黄色になることがあります、心配ありません。

[保管及び取扱い上の注意] (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保

存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい

(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

製造販売元

大鵬薬品工業株式会社

東京都千代田区神田錦町1-27

お客様相談室 TEL:0120-4527-66

<https://www.taiho.co.jp/>

副作用救済制度 TEL 0120-149-931

使用期限

製造番号

チオビタドリンクブイスパー

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第3類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	チオビタドリンクブイスパー																								
2	成分・分量	<p>1本 (100mL) 中</p> <table> <tr><td>タウリン</td><td>.....</td><td>2000mg</td></tr> <tr><td>イノシトール</td><td>.....</td><td>50mg</td></tr> <tr><td>ニコチン酸アミド</td><td>.....</td><td>20mg</td></tr> <tr><td>チアミン硝化物 (ビタミンB1)</td><td>.....</td><td>10mg</td></tr> <tr><td>リボフラビンリン酸エステルナトリウム (ビタミンB2)</td><td>...</td><td>5mg</td></tr> <tr><td>ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6)</td><td>.....</td><td>50mg</td></tr> <tr><td>カルニチン塩化物</td><td>.....</td><td>100mg</td></tr> <tr><td>無水カフェイン</td><td>.....</td><td>50mg</td></tr> </table>	タウリン	2000mg	イノシトール	50mg	ニコチン酸アミド	20mg	チアミン硝化物 (ビタミンB1)	10mg	リボフラビンリン酸エステルナトリウム (ビタミンB2)	...	5mg	ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6)	50mg	カルニチン塩化物	100mg	無水カフェイン	50mg
タウリン	2000mg																								
イノシトール	50mg																								
ニコチン酸アミド	20mg																								
チアミン硝化物 (ビタミンB1)	10mg																								
リボフラビンリン酸エステルナトリウム (ビタミンB2)	...	5mg																								
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6)	50mg																								
カルニチン塩化物	100mg																								
無水カフェイン	50mg																								
3	用法・用量	<p>成人 (15歳以上) は、1日1回1本 (100mL) を服用してください</p> <p>●小児 (15歳未満) は服用しないでください</p>																								
4	効能・効果	滋養強壮、虚弱体质、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給																								
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項																									
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項																									

[注意事項]

- 1.本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 2.情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 3.使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

滋養強壮剤

販売名：チオビタドリンク2000

● 1本 (100mL)



包 装	1本(100mL)
サイズ(mm)	胴径45×高さ120
重量(g)	208
使用期限	3年
メーカー希望小売価格(税別)	207円
JANコード	4987117 439243
ITFコード	—

● 1パック (100mL×3本)



包 装	1パック(100mL×3本)	梱(100mL×3本×10)
サイズ(mm) ※1	45×135×120	280×255×130
重量(g)	624	6512
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	621円	6,210円
JANコード	4987117 439274	4987117 439281
ITFコード	—	14987117 439288

● 1箱 (100mL×10本)



包 装	1箱(100mL×10本)	梱(100mL×10本×5)
サイズ(mm) ※1	96×231×122	240×492×128
重量(g)	2176	11196
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	2,070円	10,350円
JANコード	4987117 439250	4987117 439267
ITFコード	—	14987117 439264

参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ (単位：mm)

チオビタドリンク2000 指定医薬部外品

服用に際してはラベルをよく読むこと

△ 使用上の注意 相談すること

1.次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持つて医師又は薬剤師に相談して下さい。(1)服用後、発疹があらわれた場合、(2)しばらく服用しても症状がよくならない場合 2.下痢があらわれることがあるので、下痢の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。【効能・効果】○滋養強壮○虚弱体質○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給【用法・用量】成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用して下さい。

●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。●用法・用量を守って下さい(他のビタミン等を含有する製剤を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意して下さい)。

4 100mL



【成分】1本(100mL)中 タウリン2000mg、イノシトール50mg、ニコチン酸アミド20mg、チアミン硝化物(ビタミンB1)5mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)5mg、カルニチン塩化物100mg、無水カフェイン50mg
添加物:白糖、果糖、トウ糖、DL-リノ酸、没食子酸プロピル、安息香酸Na、pH調整剤、バニリン、香料 ●本剤に配合されているビタミンB2により、尿が黄色になることがあります、心配ありません。【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存および他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になります)。品質が変わります。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

⑧登録商標 L1905

製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
TAIHO
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>

使用期限 製造番号

ビタミン含有保健剤

販売名：チオビタドリンク3000

● 1本 (100mL)



包 装	1本(100mL)
サイズ(mm)	胴径45×高さ120
重量(g)	208
使用期限	3年
メーカー希望小売価格(税別)	253円
JANコード	4987117 438512
ITFコード	—

● 1パック (100mL×3本)



包 装	1パック(100mL×3本)	梱(100mL×3本×10)
サイズ(mm) ※1	45×135×120	280×255×130
重量(g)	624	6512
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	759円	7,590円
JANコード	4987117 438574	4987117 438598
ITFコード	—	1 4987117 438595

● 1箱 (100mL×10本)



包 装	1箱(100mL×10本)	梱(100mL×10本×5)
サイズ(mm) ※1	96×231×122	240×492×128
重量(g)	2176	11196
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	2,530円	12,650円
JANコード	4987117 438543	4987117 438604
ITFコード	—	1 4987117 438601

参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ (単位：mm)

チオビタドリンク3000 指定医薬部外品

服用に際してはラベルをよくお読み下さい

△ 使用上の注意 相談すること

1.次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持つて医師又は薬剤師に相談して下さい。(1)服用後、発疹があらわれた場合、(2)しばらく服用しても症状がよくならない場合 2.下痢があらわれることがあるので、下痢の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。【効能・効果】○滋養強壮○虚弱体质○肉体疲労・

病中病後・食欲不振
・栄養障害・発熱性
消耗性疾患・産前
産後などの場合の
栄養補給【用法・
用量】成人(15歳
以上)1日1回1本
(100mL)を服用して
下さい。●小児(15歳
未満)は服用しない
で下さい。●用法・
用量を守って下さい
(他のビタミン等を
含有する製剤を同時
に使用する場合には
過剰摂取等に注意
して下さい)。



指定医薬部外品

滋養強壮・虚弱体质・栄養補給

TIOVITA
3000
つらい疲れに

チオビタ®
ドリンク3000

タウリン3,000mg配合 ビタミンB₁・B₂・B₆10mg配合

製造販売元



大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>

【成分(1本100mL中)】タウリン3000mg、
イノシトール50mg、ニコチン酸アミド
20mg、チアミン硝化物(ビタミンB1)10mg、
リボフラビンリン酸エステルナトリウム
(ビタミンB2)10mg、ピリドキシン塩酸塩
(ビタミンB6)10mg、カルニチン塩化物
100mg、無水カフェイン50mg 添加物:白糖、
果糖、ブドウ糖、DL-リンゴ酸、没食子酸
プロピル、安息香酸Na、パラベン、pH調整
剤、バニリン、香料 ●本剤に配合されて
いるビタミンB2により、尿が黄色になるこ
とがありますが、心配ありません。【保管及
び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない
涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届
かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存
及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になつたり
品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた
製品は服用しないで下さい。

④登録商標 L1905

ガラス:瓶

100mL 金 属:キャップ

使用期限

製造番号

ビタミン含有保健剤

販売名：チオビタドリンク3000ZERO

● 1本 (100mL)



包 装	1本(100mL)
サイズ(mm)	胴径45×高さ120
重量(g)	208
使用期限	3年
メーカー希望小売価格(税別)	253円
JANコード	4987117 440003
ITFコード	—

● 1パック (100mL×3本)



包 装	1パック(100mL×3本)	梱(100mL×3本×10)
サイズ(mm) ※1	45×135×120	280×255×130
重量(g)	624	6512
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	759円	7,590円
JANコード	4987117 440034	4987117 440041
ITFコード	—	1 4987117 440048

● 1箱 (100mL×10本)



包 装	1箱(100mL×10本)	梱(100mL×10本×5)
サイズ(mm) ※1	96×231×122	240×492×128
重量(g)	2176	11196
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	2,530円	12,650円
JANコード	4987117 440010	4987117 440027
ITFコード	—	1 4987117 440024

参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ (単位：mm)

服用に際してはラベルをよくお読み下さい

△ 使用上の注意 相談すること

1.次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
(1)服用後、発疹があらわれた場合 (2)しばらく服用しても症状がよくならない場合 2.下痢があらわれることがあるので、下痢の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

(効能・効果)○滋養強壮・虚弱体質・肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

(用法・用量)成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用して下さい。●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。●用法・用量を守つて下さい(他のビタミン等を含有する製剤を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意して下さい)。



4

ガラス:瓶
金 属:キャップ

④登録商標 L1902
100mL

滋養強壮・虚弱体質・栄養補給

チオビタ
3000ZERO
糖類0ゼロ

TIOVITA

タウリン3,000mg配合 ビタミンB群配合
販売名:チオビタドリンク3000ZERO

14 kcal 指定医薬部外品

(成分(1本100mL中))タウリン3000mg、イノシトール50mg、ニコチン酸アミド20mg、チアミン硝化物(ビタミンB1)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)10mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)10mg、カルニチン塩化物100mg、無水カフェイン50mg 添加物:エリスリトール、アセスルファムK、スクロース、クエン酸、クエン酸Na、没食子酸プロピル、安息香酸Na、pH調整剤、香料 ●本剤に配合されているビタミンB2により、尿が黄色になることがあります
が、心配ありません。

(保管及び取扱い上の注意) (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

製造販売元

大鵬薬品工業株式会社
TAIHO
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL:0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>

使用期限 製造番号

ビタミン含有保健剤

販売名：チオビタドリンク3000ZERO

● 1本 (100mL)



包 装	1本(100mL)
サイズ(mm)	胴径45×高さ120
重量(g)	208
使用期限	3年
メーカー希望小売価格(税別)	253円
JANコード	4987117 440102
ITFコード	—

● 1パック (100mL×3本)



包 装	1パック(100mL×3本)	梱(100mL×3本×10)
サイズ(mm) ※1	45×135×120	280×255×130
重量(g)	624	6512
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	759円	7,590円
JANコード	4987117 440133	4987117 440140
ITFコード	—	1 4987117 440147

● 1箱 (100mL×10本)



包 装	1箱(100mL×10本)	梱(100mL×10本×5)
サイズ(mm) ※1	96×231×122	240×492×128
重量(g)	2176	11196
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	2,530円	12,650円
JANコード	4987117 440119	4987117 440126
ITFコード	—	1 4987117 440123

参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ (単位：mm)

服用に際してはラベルをよくお読み下さい

△ [使用上の注意] 相談すること

1.次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
(1)服用後、発疹があらわれた場合 (2)しばらく服用しても症状がよくならない場合 2.下痢があらわれることがあるので、下痢の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

(効能・効果)○滋養強壮○虚弱体質○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

(用法・用量)成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用して下さい。●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。●用法・用量を守つて下さい(他のビタミン等を含有する製剤を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意して下さい)。



ガラス:瓶
金 属:キャップ
④登録商標 L2003
100mL



(成分(1本100mL中))タウリン3000mg、イノシトール50mg、ニコチン酸アミド20mg、チアミン硝化物(ビタミンB1)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)10mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)10mg、カルニチン塩化物100mg、無水カフェイン50mg 添加物:エリスリトール、アセスルファムK、スクラロース、クエン酸、クエン酸Na、没食子酸プロピル、安息香酸Na、pH調整剤、香料 ●本剤に配合されているビタミンB2により、尿が黄色になることがあります。心配ありません。

(保管及び取扱い上の注意) (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

製造販売元

大鵬薬品工業株式会社
TAIHO 東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>

使用期限

製造番号

乳酸菌混合末含有食品

商品名: **FAMILACTO フェミラクト**

● 1袋 (21粒)



包 装	1袋(21粒)	梱(21粒×300)
サイズ(mm) ≈1	5×85×140	491×323×275
重量(g)	11.235	5500
賞味期限	製造後24ヶ月	
メーカー希望小売価格(税別)	1,480円	444,000円
JANコード	4987117 647037	4987117 647044
ITFコード	—	1 4987117 647034

● 1ボトル (90粒)



包 装	1ボトル(90粒)	梱(90粒×60)
サイズ(mm)	胴径55×高さ87	325×265×200
重量(g)	48.15	5200
賞味期限	製造後24ヶ月	
メーカー希望小売価格(税別)	4,600円	276,000円
JANコード	4987117 647013	4987117 647020
ITFコード	—	1 4987117 647010

参考画像



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)



FAMILACTO

フェミラクト

健康補助食品

Rosell-11&52



7日分(21粒)

1日3粒が目安

TAIHO 大鵬薬品

栄養成分表示 1粒(535mg)当たり
エネルギー2.21kcal/タンパク質0.05g/脂質0.04g/
炭水化物0.41g/食塩相当量0.004g

この表示値は、目安です。

フェミラクト 21粒 [7日分目安]

【1日の摂取目安量】3粒が目安【摂取方法】水とともに召し上がりください。【摂取上の注意】●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。●疾病などで薬を服用中あるいは通院中の方はご使用前に医師にご相談ください。●原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。お体に異変を感じた際は、ご使用をお控えください。●開封後はお早めにお召し上がりください。●お問い合わせ先:お客様相談室0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>

【名称】乳酸菌混合末含有食品【原材料名】でんぶん(カナダ製造)、乳酸菌(乳成分を含む)/HPMC、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ゲル化剤(ジェランガム)、酸化防止剤(アスコルビン酸)【内容量】11.235g [1粒重量 535mg (1粒内容量460mg)×21粒]【賞味期限】下部に記載【保存方法】高温多湿、直射日光を避け、涼しいところに保存してください。【販売者】大鵬薬品工業株式会社 東京都千代田区神田錦町1-27【製造所固有記号】下部に記載

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。



PE
M
PET

【名称】乳酸菌混合末含有食品【原材料名】でんぶん(カナダ製造)、乳酸菌(乳成分を含む)/HPMC、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ゲル化剤(ジェランガム)、酸化防止剤(アスコルビン酸)【内容量】48.15g(1粒重量535mg(1粒内容量460mg)×90粒)【賞味期限】ラベル右下に記載【保存方法】高温多湿、直射日光を避け、涼しいところに保存してください。【販売者】大鵬薬品工業株式会社東京都千代田区神田錦町1-27【製造所固有記号】賞味期限下に記載

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
香料、保存料、着色料は使用しておりません。

フェミラクト 90粒 [30日分目安]

見本
4 912345 678904
L1902

紙 ラベル
キャップ:PP
ボトル:HDPE
詰め物:PE

FAMILACTO フェミラクト

健康補助食品

Rosell-11&52



TAIHO 大鵬薬品

栄養成分表示1粒(535mg)当たり エネルギー2.21kcal/タンパク質0.05g/脂質0.04g/炭水化物0.41g/食塩相当量0.004g

この表示値は、目安です。

【1日の摂取目安量】3粒が目安【摂取方法】水とともにお召し上がりください。【摂取上の注意】●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。●疾病などで薬を服用中あるいは通院中の方はご使用前に医師にご相談ください。●原材料をご参照の上、食品アレルギーのある方は、お召し上がりにならないでください。お体に異変を感じた際は、ご使用をお控えください。●開封後はしっかりとキャップを閉め、お早めにお召し上がりください。●お問い合わせ先:お客様相談室 0120-4527-66 <https://www.taiho.co.jp/>

