

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

要指導医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	バップフォーレディ
2	成分・分量	1錠中 プロピペリン塩酸塩 …………… 10mg
3	用法・用量	成人女性（15歳以上70歳未満）、1回1錠を1日1回食後に服用してください。
4	効能・効果	尿意切迫感（急に尿がしたいとの我慢し難い訴え）、 尿意切迫感を伴う頻尿（尿の回数が多い）・尿もれ
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) 男性 (3) 70歳以上の女性 (4) 15歳未満の小児 (5) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (6) 次の症状のある人 <ul style="list-style-type: none"> ・排尿困難、尿閉（尿意があるのに排尿しづらい、できない状態） ・血尿、排尿痛、膀胱痛 (7) 医療機関にて次の診断を受けた人 <ul style="list-style-type: none"> ・胃アトニー（胃下垂に伴う胃のはたらきの低下）、腸アトニー（腸の運動低下） ・幽門・腸管の閉塞 ・パーキンソン病、脳血管障害（脳梗塞、脳出血等） ・緑内障、認知症、重症筋無力症、重篤な心疾患 <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。 胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する胃腸薬、乗物酔い薬、鼻炎用内服薬、かぜ薬</p> <p>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。 （眠気、目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります）</p> <p>4. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。</p> <p>5. 長期連用しないでください。</p> <p>次に該当する人はお申し出ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 医師の治療を受けている人 (2) 高齢者（65歳以上） (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4) 次の症状のある人 <ul style="list-style-type: none"> ・頻尿や尿もれの症状が急性（発症後1ヵ月以内） ・夜間頻尿のみで日中には頻尿がない人 (5) 不整脈、肝機能障害、腎障害、潰瘍性大腸炎、甲状腺機能亢進症の診断を受けた人 (6) 排尿困難、尿閉、血尿、排尿痛又は膀胱痛の症状を起こしたことがある人 （現在も症状がある人は服用できません） (7) 子宮癌、直腸癌等の骨盤内手術を受けたことがある人

6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	
---	-----------------------	--

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。