

肩・腰の痛みをとる フェルピナク3.0%配合。

ニオイが気にならないから
どこでも気軽に使えます。



ほのかな香りでニオイ
を気にせずオフィスな
どで気軽に使えます。



ベタつかないサラッ
とタイプなのでぬった後、
すぐに服が着られます。



底部のダイヤルを回すと(薬剤)
が出てきます。4～5mm出して
使用してください。



バッグに入れて携帯し
やすいスリムなチック。

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 揮発性がありますので、使用後はキャップをきちんと閉めて、外気にふれないようにしてください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5) 本剤を火気に近づけないでください。
- (6) 塗料(家具、塗装床、アクセサリ等)、化粧、絹、皮革等に付着すると変質することがありますので、ご注意ください。
- (7) 使用期限が過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、品質保持の点からなるべく速やかに使用してください。

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

登録商標
引火性固体
イソプロパノール

ご使用に際して、このパッケージに記載の説明書きをよくお読みください。また、必要ときに読めるように大切に保管してください。

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、打撲、捻挫(ねんざ)、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)

用法・用量

1日2～4回、適量を患部にすり込んでください。

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (4) 本剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いものでおおわないでください。
- (5) 患部の汗をふきとってから使用してください。
- (6) 容器が直接患部に当たらないように、容器の中の薬剤を4～5mm出してから使用してください。
- (7) 薬剤底部の受け皿が見え、ガタつくようになったら、本剤の使用をやめてください。また、受け皿に残った薬剤は無理に使用しないでください。

成分 (100g中)

成分	含量
フェルピナク	3.0g
l-メントール	2.7g

添加物として、マクロゴール、クロタミトン、オレイルアルコール、ステアリン酸、イソステアリン酸、乳酸Na、香料、フェニルエチルアルコール、スクワラン、pH調整剤、イソプロパノール、その他2成分を含有します。

内容量

32g

第2類医薬品

ゼノール^{EXAM}
FX

ニオイが気にならない
微香性チック

ゼノール^{EXAM}
FX

ハードゲル

肩・腰の
痛み

フローラル
グリーンの
ほのかな
香り

フェルピナク
3.0%
配合



外用鎮痛消炎薬

セルフメディケーション
税 控除 対象

携帯に便利
微香性チック

販売名：ゼノールEXAM FX

第2類医薬品

使用上の注意

⚠ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 妊娠又は妊娠を疑っていると思われる人
- (3) 15歳未満の小児

2. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口
- (3) みずむし、たれ、等又は化膿している患部



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 1週間位使用しても症状がよくなりません場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

販売元

大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL 0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/

製造販売元

三笠製薬株式会社
東京都練馬区豊玉北2-3-1

01H907



4 987117 372038

製造
番号
使用
期限



袋：PE、
PET、
金属



紙
箱

1