

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	肝生 (カンセイ)									
2	成分・分量	<p>3包 (6g) 中、下記生薬より製した肝生乾燥エキス2gを含有します</p> <p>サンソウニン (酸棗仁) 1.46g ニンジン (人參) 1.46g サンシシ (山梔子) 1.46g シャゼンシ (車前子) 1.46g ソウハクヒ (桑白皮) 1.46g キジツ (枳実) 1.46g シュクシャ (縮砂) 1.46g ケイヒ (桂皮) 0.37g ダイオウ (大黃) 0.37g ウバイ (烏梅) 1.46g キッピ (橘皮) 1.46g ガイヨウ (艾葉) 1.46g</p>									
3	用法・用量	<p>食間に水又はお湯にて服用します</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年齢</th> <th>1回量</th> <th>1日服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成人 (15歳以上)</td> <td>1包 (2g)</td> <td>3回</td> </tr> <tr> <td>15歳未満</td> <td colspan="2">服用しないでください</td> </tr> </tbody> </table>	年齢	1回量	1日服用回数	成人 (15歳以上)	1包 (2g)	3回	15歳未満	服用しないでください	
年齢	1回量	1日服用回数									
成人 (15歳以上)	1包 (2g)	3回									
15歳未満	服用しないでください										
4	効能・効果	肝臓機能障害、肝臓肥大、急・慢性肝炎、黄疸、胆のう炎									
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください 次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている人 ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人) ・胃腸が弱く下痢しやすい人 ・今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 ・次の医薬品を服用している人 瀉下薬 (下剤) 									
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項										

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合 (副作用など) には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。