

<p>名称 ゼノールチックE</p>																									
<p>リスク区分 第3類医薬品</p> <p>特徴 ●外用鎮痛消炎薬 サリチル酸メチルが患部に浸透して、肩こり、筋肉の疲労に効きます。直ぬりチックタイプだから、ぬりやすく、手を汚しません。べたつかないの、すぐ服を着ることができます。清涼感のある香りです。</p>																									
<p>成分・分量 ●100g 中</p> <table border="1" data-bbox="137 757 628 994"> <thead> <tr> <th>成分</th> <th>含量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>サリチル酸メチル</td> <td>17.50g</td> </tr> <tr> <td>l-メントール</td> <td>6.00g</td> </tr> <tr> <td>dl-カンフル</td> <td>5.00g</td> </tr> <tr> <td>グリチルレチン酸</td> <td>0.02g</td> </tr> </tbody> </table> <p>添加物として、イソプロパノール、香料、ステアリン酸Na、グリセリン、ヒマシ油を含有します。</p> <p>効能・効果 肩こり、筋肉疲労、筋肉痛、腰痛、関節痛、打撲、捻挫(ねんざ)、骨折痛、しもやけ</p>	成分	含量	サリチル酸メチル	17.50g	l-メントール	6.00g	dl-カンフル	5.00g	グリチルレチン酸	0.02g	<p>詳細情報</p> <table border="1" data-bbox="874 707 1474 1043"> <tr> <td>販売元</td> <td>大鵬薬品工業株式会社</td> </tr> <tr> <td>製造販売元</td> <td>三笠製薬株式会社</td> </tr> <tr> <td>剤形</td> <td>チック剤</td> </tr> <tr> <td>包装単位</td> <td>33g×1箱</td> </tr> <tr> <td>メーカー希望小売価格</td> <td>850円</td> </tr> <tr> <td>JANコード</td> <td>4987117372052</td> </tr> <tr> <td>使用期限</td> <td>3年</td> </tr> </table> <p>用法・用量 通常、1日1～数回、適量を患部にすり込んでください。</p> <p>[用法・用量に関連する注意] (1)用法・用量を厳守してください。 (2)目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。 (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。 (4)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。 (5)患部の汗をふきとってから使用してください。 (6)容器が直接患部に当たらないように、容器の中の薬剤を4～5mm 出してから使用してください。 (7)薬剤底部の受け皿が見え、ガタつくようになったら、本剤の使用をやめてください。また、受け皿に残った薬剤は無理に使用しないでください。</p>	販売元	大鵬薬品工業株式会社	製造販売元	三笠製薬株式会社	剤形	チック剤	包装単位	33g×1箱	メーカー希望小売価格	850円	JANコード	4987117372052	使用期限	3年
成分	含量																								
サリチル酸メチル	17.50g																								
l-メントール	6.00g																								
dl-カンフル	5.00g																								
グリチルレチン酸	0.02g																								
販売元	大鵬薬品工業株式会社																								
製造販売元	三笠製薬株式会社																								
剤形	チック剤																								
包装単位	33g×1箱																								
メーカー希望小売価格	850円																								
JANコード	4987117372052																								
使用期限	3年																								
<p>使用上の注意</p> <p>⊗してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。) 次の部位には使用しないでください。 (1)目の周囲、粘膜等 (2)湿疹、かぶれ、傷口</p> <p>🗨 相談すること 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。</p>																									

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。