

名称 ソルマック®5

特徴

指定医薬部外品

●生薬配合胃腸薬

ソルマックシリーズで初めての食前タイプ

スッキリ飲みやすいプラム風味

ウコン最大量2000mg配合(指定医薬部外品基準内最大量・1本50ml中原生薬換算量)

胃腸の働きをよくするソヨウ・コウジンを配合しております。

指定医薬部外品の「ソルマック5」は5種類の生薬を配合。

食べ過ぎ又は飲み過ぎによる、胃部不快感及びはきけにすぐれた効き目を発揮します。



成分・分量

1本(50mL)中

ウコンエキス 200mg (鬱金2000mgに相当)

コウジンエキス 83.3mg (紅参333.2mgに相当)

ソヨウエキス 37mg (蘇葉333mgに相当)

チョウジ油(丁子油) 5mg

グリチルリチン酸二カリウム 7.2mg

添加物:グリセリン、果糖、プロピレングリコール、ブドウ糖、ポビドン、クエン酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、L-メントール、安息香酸Na、pH調整剤、バニリン、香料

効能・効果

食べ過ぎ又は飲み過ぎによる胃部不快感及びはきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心)

詳細情報

| | | |
|------------|------------|---------------|
| 製造販売元 | 大鵬薬品工業株式会社 | |
| 剤形 | 液剤 | |
| 包装単位 | 50mlx1本 | 50mlx8本 |
| メーカー希望小売価格 | 350円 | 2800円 |
| JANコード | 45144653 | 4987117396065 |
| 使用期限 | 3年 | |

用法・用量

成人(15歳以上)1日1回1本(50mL)を食前に服用してください。

●小児(15歳未満)は服用しないでください。

●用法・用量を守ってください。

使用上の注意

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

●医師の治療を受けている人。

2. 次の場合は、服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください。

●しばらく服用しても症状がよくなる場合。

Brand name: Solmack® 5

CHARACTERISTICS

Designated quasi-drug
 ● Gastrointestinal medicine containing crude drugs
 The first product of Solmack series to be taken before meals
 Easy-to-take refreshing plum flavor
 It contains a maximum of 2,000 mg of turmeric (maximum amount within the standard range for registered quasi-drug: equivalent to the amount of crude drug per 50 mL bottle)
 The medicine contains perilla herb and red ginseng which help improve gastrointestinal function.
 A designated quasi-drug "Solmack 5" contains five types of crude drugs.
 It exerts an excellent effect on stomach discomfort and feeling queasy due to overeating or overdrinking.



ACTIVE INGREDIENTS

Per bottle (50 mL)
 Turmeric Extract 200 mg (equivalent to 2,000 mg of turmeric)
 Red Ginseng Extract 83.3 mg (equivalent to 333.2 mg of red ginseng)
 Perilla Herb Extract 37 mg (equivalent to 333 mg of perilla herb)
 Clove Oil 5 mg
 Dipotassium Glycyrrhizinate 7.2 mg
 Inactive ingredients: Glycerin, Fructose, Propylene Glycol, Glucose, Povidone, Citric Acid, Polyoxyethylene Hardened Caster Oil, l-Menthol, Sodium Benzoate, pH Adjuster, Vanillin, Flavor
 ● Shake well before use. As this medicine contains crud drugs, it may cause precipitation.

For further information:

| | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Manufactured and Distributed by | TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. | |
| Dosage form | Liquid | |
| Packaging unit | 50 mL x 1 bottle | 50 mL x 8 bottles |
| Manufacturer's recommended price | 350 yen | 2,800 yen |
| JAN Code | 45144653 | 4987117396065 |
| Expiration | 3 years | |

DOSAGE AND ADMINISTRATION

Adults (15 years and over): Take 1 bottle (50 mL) before meals once daily.
 ● Do not use in children (under 15 years).
 ● Follow the dosing instruction.

INDICATIONS

Stomach discomfort or feeling queasy (sickness, churning of stomach, hangover, drunken sickness, queasy, nausea) due to overeating or overdrinking

PRECAUTIONS FOR USE

- The following persons should consult a physician or pharmacist before using the medicine.
 - Persons under treatment by a physician
- In the following case, discontinue the use of the medicine, and consult a physician or pharmacist with this medicine.
 - If symptoms do not improve after using the medicine for a while

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|------------|--|----|----|--|------|---------|---------|---------|-------|--------|-------|----------|---------------|------|----|--|
| 名称 Solmack 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>特征</p> <p>日本指定医药部外品 ●中草药配制的肠胃药 Solmack系列首款饭前服用药品 清爽好喝的李子口味 添加了最大量2000mg的郁金(指定医药部外品基准内最大量、1支50ml本品中的原药材换算量) 含改善肠胃功能的紫苏叶和红参。 指定医药部外品“Solmack5”配制有5种中草药。 对于因过食或过饮引起的胃部不适及恶心有很好的功效。</p> |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>成分、含量</p> <p>1支(50mL)中 郁金精华 200mg(相当于郁金2000mg) 红参精华 83.3mg(相当于红参333.2mg) 紫苏叶精华 37mg(相当于苏叶333mg) 丁香油 5mg 甘草酸二钾盐 7.2mg 添加物: 甘油、果糖、丙二醇、葡萄糖、聚乙烯吡咯烷酮、柠檬酸、聚氧乙烯化蓖麻油、1-薄荷醇、苯甲酸钠、pH调整剂、香草醛、香料 ●因含有中草药成分,可能会产生沉淀,请摇匀后服用。</p> | <p>详细信息</p> <table border="1"> <tr> <td>制造销售商</td> <td colspan="2">大鵬药品工业株式会社</td> </tr> <tr> <td>剂型</td> <td colspan="2">液剂</td> </tr> <tr> <td>包装单位</td> <td>50ml×1支</td> <td>50ml×8支</td> </tr> <tr> <td>厂商建议零售价</td> <td>350日元</td> <td>2800日元</td> </tr> <tr> <td>JAN编码</td> <td>45144653</td> <td>4987117396065</td> </tr> <tr> <td>使用期限</td> <td colspan="2">3年</td> </tr> </table> <p>用法、用量 成人(15岁以上)请每日1次,每次1支(50mL),于饭前服用。 ●儿童(不满15岁)请勿服用。 ●请遵守用法、用量。</p> | 制造销售商 | 大鵬药品工业株式会社 | | 剂型 | 液剂 | | 包装单位 | 50ml×1支 | 50ml×8支 | 厂商建议零售价 | 350日元 | 2800日元 | JAN编码 | 45144653 | 4987117396065 | 使用期限 | 3年 | |
| 制造销售商 | 大鵬药品工业株式会社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 剂型 | 液剂 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 包装单位 | 50ml×1支 | 50ml×8支 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 厂商建议零售价 | 350日元 | 2800日元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAN编码 | 45144653 | 4987117396065 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用期限 | 3年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>功能、效果</p> <p>因过食或过饮引起的胃部不适及恶心(恶心、反胃、宿醉或醉酒不适、想吐、作呕)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>使用时的注意事项</p> <ol style="list-style-type: none"> 以下人群在服用前请咨询医师或药剂师。 <ul style="list-style-type: none"> ●正接受医师治疗的人。 以下情况请停止服用,并携本品向医师或药剂师咨询。 <ul style="list-style-type: none"> ●服用一段时间后症状仍未见好转。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

명칭 술맥® 5

특징
의약품
 ●생약 배합 위장약
 술맥 시리즈 최초의 식전 타입
 깔끔하게 마시기 쉬운 자두맛
 강황 최대량 2000mg 배합(지정 의약품외품 기준 내 최대량, 1 병 50ml 중 원생약 환산량)
 위장 활동을 활발하게 하는 소엽과 홍삼을 배합하였습니다.
 지정 의약품외품인 '술맥 5'는 5종류의 생약을 배합.
 과식 또는 과음에 의한 위장 불편감 및 구역질에 뛰어난 효능을 발휘합니다.



성분 및 분량
 1병(50mL) 중
 강황 추출물 200mg (강황 2000mg에 상당)
 홍삼 추출물 83.3mg (홍삼 333.2mg에 상당)
 소엽 추출물 37mg (소엽 333mg에 상당)
 정향유 5mg
 글리시리진산디칼륨 7.2mg
 첨가물: 글리세린, 과당, 프루필렌글리콜, 포도당, 포비돈, 구연산, 폴리옥시에틸렌하이드로제네이티드캐스터오일, L-멘톨, 벤조산 Na, pH 조절제, 바닐린, 향료
 ●생약 성분을 함유하고 있으므로 침전물이 생길 수 있습니다. 잘 흔들어 복용하십시오.

상세 정보

| | | |
|--------|--------------|---------------|
| 제조 판매원 | 다이호약품공업 주식회사 | |
| 제형 | 액상 | |
| 포장 단위 | 50mlx1병 | 50mlx8병 |
| 희망소매가격 | 350엔 | 2800엔 |
| JAN 코드 | 45144653 | 4987117396065 |
| 사용 기한 | 3년 | |

효능 및 효과
 과식 또는 과음에 의한 위장 불편감과 구역질(메스꺼움, 위의 메스꺼움, 숙취 · 음주 후 메스꺼움, 욕지기, 오심)

용법 및 용량
 성인(15세 이상) 1일 1회 1병(50mL)을 식전에 복용하십시오.
 ●소아(15세 미만)는 복용하지 마십시오.
 ●용법과 용량을 지켜 주십시오.

사용상의 주의사항
 1. 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 ●의사의 치료를 받고 있는 사람.
 2. 아래와 같은 경우는 복용을 중지하고 이 제품을 가지고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 ●일정 기간 복용해도 증상이 개선되지 않는 경우.