

服用に際して、ラベルの説明文をよくお読みください。

滋養強壯剤

第3類医薬品

チオビタ® ドリンク1000

TIOVITA DRINK 1000

【使用上の注意】

相談すること

1. 服用後、皮膚に発疹があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
2. 服用後、下痢があらわれることがあるため、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
3. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【効能・効果】

- 滋養強壯 ● 虚弱体質 ● 肉体疲労 ・ 病中病後 ・ 食欲不振 ・ 栄養障害 ・ 発熱性消耗性疾患 ・ 産前産後などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人（15歳以上）1日1回1本（100mL）を服用して下さい。

- 小児（15歳未満）は服用しないで下さい。
- 用法・用量を守って下さい。

【成分（1本100mL中）】

タウリン1000mg、イノシトール50mg、ニコチン酸アミド20mg、
チアミン硝化物（ビタミンB₁）10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム
（ビタミンB₂）5mg、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB₆）50mg、カルニチン塩化物100mg、
無水カフェイン50mg

添加物：白糖、果糖、ブドウ糖、DL-リンゴ酸、没食子酸プロピル、
安息香酸Na、pH調整剤、バニリン、エチルバニリン、香料

- 本剤に配合されているビタミンB₂より、尿が黄色になることがありますが、心配ありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わります）。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

包装

100mL瓶入り

●上記の内容はラベルに表示しております。

副作用被害救済制度の問合せ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

TEL 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元



大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.03-3293-4509
<http://www.taiho.co.jp/>