

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|------------|--|----|----|--|------|---------|---------|------------|------|-------|--------|----------|---------------|------|----|--|
| <p>名称 ソルマック®胃腸液プラス</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>特徴 指定医薬部外品 ●生薬配合胃腸薬 飲み過ぎ・食べ過ぎによる胃部不快感及びはきけに効果のある医薬品です。 ニンジン・ウコン・カンゾウ・エンメイソウ・アカメガシワ・ケイヒ・チョウジ・カルニチン塩化物を配合</p> |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>成分・分量 1本(50mL)中 ウコン流エキス 0.3mL (鬱金300mgに相当) カンゾウ抽出物 10mg (甘草143mgに相当) エンメイソウエキス 30mg (延命草201mgに相当) ニンジンエキス 200mg (人参606mgに相当) アカメガシワエキス 50mg (赤芽榭500mgに相当) ケイヒ油 1.5mg チョウジ油 5mg カルニチン塩化物 120mg 添加物:プロピレングリコール、果糖、ブドウ糖、アルコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、l-メントール、安息香酸Na、pH調整剤、香料 (アルコール0.5mL以下) ●生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用して下さい。</p> | <p>詳細情報</p> <table border="1"> <tr> <td>製造販売元</td> <td colspan="2">大鷗薬品工業株式会社</td> </tr> <tr> <td>剤形</td> <td colspan="2">液剤</td> </tr> <tr> <td>包装単位</td> <td>50mlx1本</td> <td>50mlx8本</td> </tr> <tr> <td>メーカー希望小売価格</td> <td>350円</td> <td>2800円</td> </tr> <tr> <td>JANコード</td> <td>45144622</td> <td>4987117398571</td> </tr> <tr> <td>使用期限</td> <td colspan="2">3年</td> </tr> </table> <p>用法・用量 成人(15歳以上)1日1回1本(50mL)を食前または食間に服用して下さい。 ●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。 ●用法・用量を守って下さい。</p> | 製造販売元 | 大鷗薬品工業株式会社 | | 剤形 | 液剤 | | 包装単位 | 50mlx1本 | 50mlx8本 | メーカー希望小売価格 | 350円 | 2800円 | JANコード | 45144622 | 4987117398571 | 使用期限 | 3年 | |
| 製造販売元 | 大鷗薬品工業株式会社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 剤形 | 液剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 包装単位 | 50mlx1本 | 50mlx8本 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| メーカー希望小売価格 | 350円 | 2800円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JANコード | 45144622 | 4987117398571 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用期限 | 3年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>効能・効果 食べ過ぎ又は飲み過ぎによる胃部不快感及びはきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>使用上の注意 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。 ●医師の治療を受けている人。 2. 次の場合は、服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。 ●しばらく服用しても症状がよくなる場合。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Brand name: Solmack® Digestive Drink Plus

CHARACTERISTICS
 Designated quasi-drug
 ● Gastrointestinal medicine containing crude drugs
 This medicine is effective for stomach discomfort and feeling queasy due to overdrinking and overeating.
 It contains ginseng, turmeric, glycyrrhiza, isodonis herba, mallotus bark, cinnamon bark, clove, and carnitine hydrochloride.



ACTIVE INGREDIENTS
 Per bottle (50 mL)
 Turmeric Fluidextract 0.3 mL (equivalent to 300 mg of turmeric)
 Glycyrrhiza Extract 10 mg (equivalent to 143 mg of glycyrrhiza)
 Isodonis herba Extract 30 mg (equivalent to 201 mg of isodonis herba)
 Ginseng Extract 200 mg (equivalent to 606 mg of ginseng)
 Mallotus Bark Extract 50 mg (equivalent to 500 mg of mallotus bark)
 Cinnamon Oil 1.5 mg
 Clove oil 5 mg
 Carnitine Hydrochloride 120 mg
 Inactive ingredients: Propylene Glycol, Fructose, Glucose, Alcohol, Polyoxyethylene Hardened Caster Oil, I-Menthol, Sodium Benzoate, pH Adjuster, Flavor
 (≥ 0.5 mL of alcohol)
 ● Shake well before use. As this medicine contains crud drugs, it may cause precipitation.

For further information:

| | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Manufactured and Distributed by | TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. | |
| Dosage form | Liquid | |
| Packaging unit | 50 mL x 1 bottle | 50 mL x 8 bottles |
| Manufacturer's recommended price | 350 yen | 2,800 yen |
| JAN Code | 45144622 | 4987117398571 |
| Expiration | 3 years | |

DOSAGE AND ADMINISTRATION
 Adults (15 years and over): Take 1 bottle (50 mL) before or between meals once daily.
 ● Do not use in children (under 15 years).
 ● Follow the dosing instruction.

INDICATIONS
 Stomach discomfort or feeling queasy (sickness, churning of stomach, hangover, drunken sickness, queasy, nausea) due to overeating or overdrinking

PRECAUTIONS FOR USE
 1. The following persons should consult a physician or pharmacist.
 ● Persons under treatment by a physician
 2. In the following case, discontinue the use of the medicine, and consult a physician or pharmacist with this medicine.
 ● If symptoms do not improve after using the medicine for a while

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|------------|--|----|----|--|------|---------|---------|---------|-------|--------|-------|----------|---------------|------|----|--|
| 名称 Solmack Ichoueki Plus (Solmack肠胃口服液Plus) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>特征</p> <p>日本指定医药部外品</p> <p>●中草药配制的肠胃药</p> <p>对因过饮、过食引起的胃部不适及恶心颇有效果的药品。</p> <p>由人参、郁金、甘草、延命草、赤芽榭、桂皮、丁香、左旋肉碱氯化物配制</p> |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>成分、含量</p> <p>1支（50mL）本品中</p> <p>郁金流浸膏 0.3mL（相当于郁金300mg）</p> <p>甘草提取物 10mg（相当于甘草143mg）</p> <p>延命草精华 30mg（相当于延命草201mg）</p> <p>人参精华 200mg（相当于胡萝卜606mg）</p> <p>赤芽榭精华 50mg（相当于赤芽榭500mg）</p> <p>桂皮油 1.5mg</p> <p>丁香油 5mg</p> <p>左旋肉碱氯化物 120mg</p> <p>添加物：丙二醇、果糖、葡萄糖、酒精、聚氧乙烯化蓖麻油、1-薄荷醇、苯甲酸钠、pH调整剂、香料（酒精为0.5mL以下）</p> <p>●因含有中草药成分，可能会产生沉淀，请摇匀后服用。</p> | <p>详细信息</p> <table border="1"> <tr> <td>制造销售商</td> <td colspan="2">大鵬药品工业株式会社</td> </tr> <tr> <td>剂型</td> <td colspan="2">液剂</td> </tr> <tr> <td>包装单位</td> <td>50ml×1支</td> <td>50ml×8支</td> </tr> <tr> <td>厂商建议零售价</td> <td>350日元</td> <td>2800日元</td> </tr> <tr> <td>JAN编码</td> <td>45144622</td> <td>4987117398571</td> </tr> <tr> <td>使用期限</td> <td colspan="2">3年</td> </tr> </table> <p>用法、用量</p> <p>成人（15岁以上）请每日1次，每次1支（50mL），于饭前或饭间服用。</p> <p>●儿童（不满15岁）请勿服用。</p> <p>●请遵守用法、用量。</p> | 制造销售商 | 大鵬药品工业株式会社 | | 剂型 | 液剂 | | 包装单位 | 50ml×1支 | 50ml×8支 | 厂商建议零售价 | 350日元 | 2800日元 | JAN编码 | 45144622 | 4987117398571 | 使用期限 | 3年 | |
| 制造销售商 | 大鵬药品工业株式会社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 剂型 | 液剂 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 包装单位 | 50ml×1支 | 50ml×8支 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 厂商建议零售价 | 350日元 | 2800日元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAN编码 | 45144622 | 4987117398571 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用期限 | 3年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>功能、效果</p> <p>因过食或过饮引起的胃部不适及恶心（恶心、反胃、宿醉或醉酒不适、想吐、作呕）</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>使用时的注意事项</p> <p>1. 以下人群在服用前请咨询医师或药剂师。</p> <p>●正接受医师治疗的人。</p> <p>2. 以下情况请停止服用，并携本品向医师或药剂师咨询。</p> <p>●服用一段时间后症状仍未见好转。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

명칭 술맥® 위장액 플러스

특징
의약품
 ●생약 배합 위장약
 과음 및 과식에 의한 위장 불쾌감과 구역질에 효과가 있는
 의약품입니다.
 인삼, 강황, 감초, 연명초, 예덕나무 껍질, 계피, 정향, 카르니
 틴 염화물을 배합



성분 및 분량
 1병(50mL) 중

| | | |
|-------------|-------|---------------------|
| 강황 유동엑스제 | 0.3mL | (강황 300mg에 상당) |
| 감초 추출물 | 10mg | (감초 143mg에 상당) |
| 연명초 추출물 | 30mg | (연명초 201mg에 상당) |
| 인삼 추출물 | 200mg | (인삼 606mg에 상당) |
| 예덕나무 껍질 추출물 | 50mg | (예덕나무 껍질 500mg에 상당) |
| 계피유 | 1.5mg | |
| 정향유 | 5mg | |
| 카르니틴 염화물 | 120mg | |

첨가물: 프로필렌글리콜, 과당, 포도당, 알코올, 폴리옥시에칠
 렌하이드로제네이티드캐스터오일, L-멘톨, 벤조산 Na, pH
 조절제, 향료
 (알코올 0.5mL 이하)
 ●생약 성분을 함유하고 있으므로 침전물이 생길 수 있습니
 다. 잘 흔들어 복용하십시오.

상세 정보

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 제조 판매원 | 다이호 약품공업 주식회사 | |
| 제형 | 액상 | |
| 포장 단위 | 50mlx1병 | 50mlx8병 |
| 희망소매가격 | 350엔 | 2800엔 |
| JAN 코드 | 45144622 | 4987117398571 |
| 사용 기한 | 3년 | |

용법 및 용량
 성인(15세 이상) 1일 1회 1병(50mL)을 식전 또는 식간에 복용하십시오.
 ●소아(15세 미만)는 복용하지 마십시오.
 ●용법과 용량을 지켜 주십시오.

효능 및 효과
 과음 또는 과식에 의한 위장 불쾌감과 구역질(메스거림, 위
 의 메스거림, 숙취·음주 후 메스거림, 욕지기, 오심)

사용상의 주의사항

- 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 - 의사의 치료를 받고 있는 사람.
- 아래와 같은 경우는 복용을 중지하고 이 제품을 가지고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 - 일정 기간 복용해도 증상이 개선되지 않는 경우.