

名称 大鵬かぜ内服液銀翹散			
リスク区分 第2類医薬品			
特徴 大鵬かぜ内服液銀翹散は、中国の医書「温病条弁」に記載されている「銀翹散」を基本につくられたかぜ内服液です。 のどの痛み、せき、頭痛などの症状のある風邪には、金銀花、連翹、羚羊角など10種の生薬を配合した「銀翹散」での治療が効果的です。			
成分・分量 1日量90mL(30mL×3本)中 銀翹散エキス……………9.7g 原生薬として		詳細情報	
キンギンカ(金銀花)	…4.260g	製造販売元	大鵬薬品工業株式会社
レンギョウ(連翹)	…4.260g	剤形	液剤
キキョウ(桔梗)	…2.556g	包装単位	30mLx1本 30mLx3本
カンゾウ(甘草)	…2.556g	メーカー希望小売価格	310円 930円
ハッカ(薄荷)	…2.556g	JANコード	45144677 4987117234619
タンズシ(淡豆豉)	…2.136g	使用期限	3年
ゴボウシ(牛蒡子)	…2.136g	用法・用量	
タンチクヨウ(淡竹葉)	…1.704g	次の量を食間によく振ってから服用してください (食間とは、食後2～3時間を指します。)	
ケイガイ(荊芥)	…1.704g	年齢	成人(15歳以上) 小児(15歳未満)
レイヨウカク(羚羊角)	…0.132g	1回量	1本
添加物:白糖、果糖液糖、キシリトール、クエン酸、クエン酸Na、安息香酸Na、パラベン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、アルコール、香料(メントール)		1日服用回数	3回(食間)
〈成分に関連する注意〉 本剤は生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用してください。	[用法・用量に関連する注意] (1)用法・用量を厳守してください。 (2)本剤は1回1本の服用で飲みきり、飲み残しのないようにしてください。		
効能・効果 かぜによるのどの痛み・せき・口(のど)の渴き・頭痛	服用しないでください		
使用上の注意 <input checked="" type="checkbox"/> してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 短期間の服用にとどめ、連用しないでください。			
<input checked="" type="checkbox"/> 相談すること 1. 次の人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 (1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) (4)胃腸の弱い人 (5)高齢者 (6)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (7)次の症状のある人 むくみ (8)次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください			

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感
まれに下記の重篤な症状が起きることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。	
症状の名称	
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
3. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。	