

名称 ハルンケア内服液

リスク区分
指定第2類医薬品

特徴

- おしっこの症状に特化したオリジナル製法の医薬品
- ①8種類の生薬(ジオウ・タクシャ・ボタンピ・ブクリョウ・サンシュユ・サンヤク・ケイヒ・炮附子)から抽出・濃縮し、更にエタノールを加え、澱粉等を分離除去した後、エタノールを蒸発除去して製したエキスを含む生薬製剤です。
- ②体力の低下、下半身の衰え、手足の冷えを伴う方の軽い尿もれ、頻尿(小便の回数が多い)、残尿感、尿が出渋るの症状を緩和します。
- ③服用しやすい液剤です。



成分・分量

1日量2本(60mL)中:
生薬エキスH……11mL

ジオウ ……5g ブクリョウ ……3g
ケイヒ ……1g タクシャ ……3g
サンシュユ…3g 炮附子 ……1g
ボタンピ ……3g サンヤク ……3g より抽出

添加物としてグリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、pH調整剤、トウモロコシデンプン、香料を含有します。

◆本剤は生薬成分を含むため、経時的に沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用してください。

効能・効果

体力の低下、下半身の衰え、手足の冷えを伴う次の症状を緩和します。
軽い尿もれ、頻尿(小便の回数が多い)、残尿感、尿が出渋る

詳細情報

製造販売元	大鵬薬品工業株式会社	
剤形	液剤	
包装単位	30mLX2本	30mLX10本
メーカー希望小売価格	880円	4180円
JANコード	4987117612028	4987117612219
使用期限	3年	

用法・用量

次の量を朝夕食前又は食間に服用してください。

年齢	成人(15歳以上)	小児(15歳未満)
1回量	1本(30mL)	服用しないでください
1日服用回数	2回	

注)食間とは食事と食事の間という意味で、食後約2時間のことです。
●定められた用法・用量を厳守してください。

使用上の注意

⊗してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は服用しないでください。

- (1) 胃腸の弱い人
- (2) 下痢しやすい人
- (3) 次の症状のある人
 - 脊髄損傷や認知症等により、「尿がもれたことに気が付かない」
 - 前立腺肥大症等により、「少量ずつ常に尿がもれる」

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人
 - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - (5) 漢方製剤等を服用している人(含有生薬の重複に注意する)
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、下痢、腹痛、便秘
精神神経系	頭痛、めまい
循環器	動悸

呼吸器	息切れ
泌尿器	尿閉
その他	のぼせ、悪寒、浮腫、口唇、舌のしびれ

3. 14日間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。