

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| 1         | 名称                                | 扁鵲(ヘンセキ)   |    |     |        |           |    |    |       |      |      |            |  |
|-----------|-----------------------------------|--|----|-----|--------|-----------|----|----|-------|------|------|------------|--|
| 2         | 成分・分量                             | 3包(6g)中<br>タクシャ末 0.86g                      ダイオウ末 0.43g<br>ショウキョウ末 0.43g                      カンゾウ末 0.43g<br>ケイヒ末 0.43g                      シャクヤク末 0.43g<br>ポタンピ末 0.43g                      チョレイ末 0.86g<br>サイコ末 0.86g                      ハンゲ末 0.43g<br>ショウマ末 0.43g           |    |     |        |           |    |    |       |      |      |            |  |
| 3         | 用法・用量                             | 食間に水又はお湯にて服用します<br><table border="1"><thead><tr><th>年齢</th><th>1回量</th><th>1日服用回数</th></tr></thead><tbody><tr><td>成人(16歳以上)</td><td>1包</td><td rowspan="2">3回</td></tr><tr><td>7~15歳</td><td>1/2包</td></tr><tr><td>7歳未満</td><td colspan="2">服用しないでください</td></tr></tbody></table> | 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 | 成人(16歳以上) | 1包 | 3回 | 7~15歳 | 1/2包 | 7歳未満 | 服用しないでください |  |
| 年齢        | 1回量                               | 1日服用回数   |    |     |        |           |    |    |       |      |      |            |  |
| 成人(16歳以上) | 1包                                | 3回   |    |     |        |           |    |    |       |      |      |            |  |
| 7~15歳     | 1/2包                              |  |    |     |        |           |    |    |       |      |      |            |  |
| 7歳未満      | 服用しないでください                        |  |    |     |        |           |    |    |       |      |      |            |  |
| 4         | 効能・効果                             | 脂肪過多症  |    |     |        |           |    |    |       |      |      |            |  |
| 5         | 保健衛生上の<br>危害を防止<br>するために<br>必要な事項 | 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください<br><br>次に該当する人はお申し出ください<br>・医師の治療を受けている人<br>・妊婦又は妊娠していると思われる人<br>・体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)<br>・胃腸が弱く下痢しやすい人<br>・今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人<br>・次の医薬品を服用している人 瀉下薬(下剤)  |    |     |        |           |    |    |       |      |      |            |  |
| 6         | 薬剤師または<br>登録販売者が<br>必要と判断<br>する事項 |  |    |     |        |           |    |    |       |      |      |            |  |

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。