

<p>名称 扁鵲</p>																																	
<p>リスク区分 第2類医薬品</p> <p>特徴 ●余分な脂肪を減らす医薬品 配合される11種類の生薬がお腹の脂肪だけでなく、からだ全体の余分な脂肪を減らします。 扁鵲(へんせき)に含まれる生薬は、便や血中の老廃物・水分などを体外に排出したり、新陳代謝を活発にする作用があります。 ●体質のタイプを選ばず服用できる 扁鵲(へんせき)は、オリジナル処方<sup>®</sup>の生薬製剤。 体質のタイプを選ばず服用できるので、余分な脂肪対策には扁鵲をオススメ致します。 ●無添加 天然の生薬のみを原料として製造しており、添加物を含んでおりません。</p>																																	
<p>成分・分量 本品3包(6g)中、下記生薬を含有します。</p> <p>タクシャ末 ……0.86g    ダイオウ末 ……0.43g シヨウキョウ末……0.43g    カンゾウ末 ……0.43g ケイヒ末 ……0.43g    シャクヤク末 ……0.43g ポタンピ末 ……0.43g    チョレイ末 ……0.86g サイコ末 ……0.86g    ハンゲ末 ……0.43g シヨウマ末 ……0.43g</p> <p>添加物は含有していません。 (成分・分量に関連する注意) 本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。</p>	<p>詳細情報</p> <table border="1"> <tr> <td>販売元</td> <td colspan="2">大鵬薬品工業株式会社</td> </tr> <tr> <td>製造販売元</td> <td colspan="2">株式会社建林松鶴堂</td> </tr> <tr> <td>剤形</td> <td colspan="2">散剤</td> </tr> <tr> <td>包装単位</td> <td>2g×21包</td> <td>2g×60包</td> </tr> <tr> <td>メーカー希望小売価格</td> <td>1900円</td> <td>4800円</td> </tr> <tr> <td>JANコード</td> <td>4987117670448</td> <td>4987117670417</td> </tr> <tr> <td>使用期限</td> <td colspan="2">5年</td> </tr> </table> <p>用法・用量 食間に水又はお湯にて服用します</p> <table border="1"> <tr> <td>年齢</td> <td>1回量</td> <td>1日服用回数</td> </tr> <tr> <td>成人(16歳以上)</td> <td>1包</td> <td rowspan="2">3回</td> </tr> <tr> <td>7～15歳</td> <td>1/2包</td> </tr> <tr> <td>7歳未満</td> <td colspan="2">服用しないでください</td> </tr> </table> <p>食間とは食事と食事の間という意味で、食後2～3時間を指します。 [用法・用量に関連する注意] 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。</p>	販売元	大鵬薬品工業株式会社		製造販売元	株式会社建林松鶴堂		剤形	散剤		包装単位	2g×21包	2g×60包	メーカー希望小売価格	1900円	4800円	JANコード	4987117670448	4987117670417	使用期限	5年		年齢	1回量	1日服用回数	成人(16歳以上)	1包	3回	7～15歳	1/2包	7歳未満	服用しないでください	
販売元	大鵬薬品工業株式会社																																
製造販売元	株式会社建林松鶴堂																																
剤形	散剤																																
包装単位	2g×21包	2g×60包																															
メーカー希望小売価格	1900円	4800円																															
JANコード	4987117670448	4987117670417																															
使用期限	5年																																
年齢	1回量	1日服用回数																															
成人(16歳以上)	1包	3回																															
7～15歳	1/2包																																
7歳未満	服用しないでください																																
<p>効能・効果 脂肪過多症</p>	<p>使用上の注意</p> <p>⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。) 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。</p> <p>■ 相談すること</p> <p>1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人 (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (6) 次の医薬品を服用している人 瀉下薬(下剤)</p> <p>2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。</p>																																
<table border="1"> <tr> <td>関係部位</td> <td>症状</td> </tr> <tr> <td>皮膚</td> <td>発疹・発赤、かゆみ</td> </tr> </table>	関係部位	症状	皮膚	発疹・発赤、かゆみ																													
関係部位	症状																																
皮膚	発疹・発赤、かゆみ																																

消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛、便秘、吐き気・嘔吐
その他	むくみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

軟便、下痢

4. 1か月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。