

名称 ゼノールチックE

リスク区分
第3類医薬品

特徴
●外用鎮痛消炎薬
サリチル酸メチルが患部に浸透して、肩こり、筋肉の疲労に効きます。
直ぬりチックタイプだから、ぬりやすく、手を汚しません。
べたつかないので、すぐ服を着ることができます。
清涼感のある香りです。



成分・分量
●100g 中

成分	含量
サリチル酸メチル	17.50g
l-メントール	6.00g
dl-カンフル	5.00g
グリチルレチン酸	0.02g

詳細情報

販売元	大鵬薬品工業株式会社
製造販売元	三笠製薬株式会社
剤形	チック剤
包装単位	33g×1箱
メーカー希望小売価格	935円(税抜価格 850円)
JANコード	4987117372052
使用期限	3年

添加物として、イソプロパノール、香料、ステアリン酸Na、グリセリン、ヒマシ油を含有します。

効能・効果
肩こり、筋肉疲労、筋肉痛、腰痛、関節痛、打撲、捻挫(ねんざ)、しもやけ

用法・用量
通常、1日1～数回、適量を患部にすり込んでください。

[用法・用量に関連する注意]
(1)用法・用量を厳守してください。
(2)目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
(3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(4)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
(5)患部の汗をふきとってから使用してください。
(6)容器が直接患部に当たらないように、容器の中の薬剤を4～5mm 出してから使用してください。
(7)薬剤底部の受け皿が見え、ガタつくようになったら、本剤の使用をやめてください。また、受け皿に残った薬剤は無理に使用しないでください。

使用上の注意
⊗してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
次の部位には使用しないでください。
(1)目の周囲、粘膜等
(2)湿疹、かぶれ、傷口

■相談すること
1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。