

名称 ゼノールエクサムFX																					
リスク区分 第2類医薬品  特徴 ●外用鎮痛消炎薬 フェルビナク(3%配合)が肩・腰の痛みなどをとります。 さらっとしてべたつかず透明なので、すぐ服が着られます。 スリムなスティックで持ちやすく、携帯に便利です。 ほのかなフローラルグリーンの香りです。																					
成分・分量 100g 中	詳細情報																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>成分</th> <th>含量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>フェルビナク</td> <td>3.0g</td> </tr> <tr> <td>l-メントール</td> <td>2.7g</td> </tr> </tbody> </table>	成分	含量	フェルビナク	3.0g	l-メントール	2.7g	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>販売元</td> <td>大鵬薬品工業株式会社</td> </tr> <tr> <td>製造販売元</td> <td>三笠製薬株式会社</td> </tr> <tr> <td>剤形</td> <td>チック剤</td> </tr> <tr> <td>包装単位</td> <td>32gx1箱</td> </tr> <tr> <td>メーカー希望小売価格</td> <td>1,265円(税抜価格 1,150円)</td> </tr> <tr> <td>JANコード</td> <td>4987117372038</td> </tr> <tr> <td>使用期限</td> <td>3年</td> </tr> </tbody> </table>	販売元	大鵬薬品工業株式会社	製造販売元	三笠製薬株式会社	剤形	チック剤	包装単位	32gx1箱	メーカー希望小売価格	1,265円(税抜価格 1,150円)	JANコード	4987117372038	使用期限	3年
成分	含量																				
フェルビナク	3.0g																				
l-メントール	2.7g																				
販売元	大鵬薬品工業株式会社																				
製造販売元	三笠製薬株式会社																				
剤形	チック剤																				
包装単位	32gx1箱																				
メーカー希望小売価格	1,265円(税抜価格 1,150円)																				
JANコード	4987117372038																				
使用期限	3年																				
添加物として、マクロゴール、クロタミトン、オレイルアルコール、ステアリン酸、イソステアリン酸、乳酸Na、香料、フェニルエチルアルコール、スクワラン、pH調整剤、イソプロパノール、その他2成分を含有します。	用法・用量 1日2～4回、適量を患部にすり込んでください。																				
効能・効果 肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、打撲、捻挫(ねんざ)、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)	[用法・用量に関連する注意] (1)用法・用量を厳守してください。 (2)目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。 (3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。 (4)本剤塗布後の患部を、ラップフィルム等の通気性の悪いものでおおわないでください。 (5)患部の汗をふきとってから使用してください。 (6)容器が直接患部に当たらないように、容器の中の薬剤を4～5mm出してから使用してください。 (7)薬剤底部の受け皿が見え、ガタつくようになったら、本剤の使用をやめてください。また、受け皿に残った薬剤は無理に使用しないでください。																				
使用上の注意 ☒してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。) 1. 次の人は使用しないでください。 (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)ぜんそくを起こしたことがある人 (3)妊婦又は妊娠していると思われる人 (4)15歳未満の小児 2. 次の部位には使用しないでください。 (1)目の周囲、粘膜等 (2)湿疹、かぶれ、傷口 (3)みずむし・たむし等又は化膿している患部																					

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 1週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。