

名称 ゼノールエクサム液ゲル

リスク区分
第2類医薬品

特徴
●外用鎮痛消炎薬
フェルピナクが肩・腰の痛みをとる
ロングボディ・ワイドフェイス
トロツとした液ゲル状で液だれしにくい
なめらかな塗り心地で乾いた後ベタつかない
臭いが気にならない



成分・分量
100g 中

成分	含量
フェルピナク	3.0g
l-メントール	2.0g

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、香料、トリエタノールアミン、アルコールを含有します。

詳細情報

販売元	大鵬薬品工業株式会社
製造販売元	三笠製薬株式会社
剤形	ゲル剤
包装単位	52mLx1箱
メーカー希望小売価格	1,650円(税抜価格 1,500円)
JANコード	4987117372304
使用期限	3年

効能・効果
肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、筋肉痛、関節痛、打撲、捻挫(ねんざ)、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)

用法・用量
1日2～4回、適量を患部に塗布してください。

[用法・用量に関連する注意]
(1) スポンジ面が破れるおそれがありますので、お使いになる時は、スポンジ面に液が十分に浸透したことを確かめてから塗布してください。
(2) 用法・用量を厳守してください。
(3) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
(4) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
(5) 本剤塗布後の患部を、ラップフィルム等の通気性の悪いものでおおわないでください。

使用上の注意

☒ してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
1. 次の人は使用しないでください。
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(2) ぜんそくを起こしたことがある人
(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(4) 15歳未満の小児
2. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目の周囲、粘膜等
(2) 湿疹、かぶれ、傷口
(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部

🗨 相談すること
1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさを、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 1週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。