

名称 ピタスせきトローチ

リスク区分
第2類医薬品

特徴

- ・ 鎮咳成分であるフェノールフタリン酸デキストロメトルファンが咳中枢にはたらい、つらい咳を抑える
- ・ 去たん成分であるグアヤコールスルホン酸カリウムがたんを抑える
- ・ 水なしで服用できる
- ・ スリムな形状でかさばらず、携帯に便利



成分・分量（6個中）

フェノールフタリン酸デキストロメトルファン 60mg
グアヤコールスルホン酸カリウム 140mg
セチルピリジニウム塩化物水和物 6mg

[添加物]

ヒドロキシプロピルセルロース、ポビドン、プルラン、マクロゴール、l-メントール、タンニン酸、D-ソルビトール、サッカリンNa、シヨ糖脂肪酸エステル、スクラロース、銅クロロフィリンNa、香料

詳細情報

製造販売元	大鵬薬品工業株式会社
剤形	トローチ
包装単位	12個
メーカー希望小売価格	770円（税抜価格 700円）
JANコード	45198625
賞味期限	3年

用法・用量

次の量を口中に含み、かまずにゆっくり溶かして使用すること。

年齢	1回量	1日使用回数	使用間隔
成人 (15歳以上)	1個	6回	2時間以上

15歳未満 使用しないこと。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること。
- (2) かんだり、のみこんだりしないこと。

効能・効果

せき、たん、のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ

使用上の注意・してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 次の人は使用しないこと

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。高熱

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	皮膚	消化器	精神神経系	呼吸器
症状	発疹・発赤、かゆみ	吐き気・嘔吐、食欲不振	めまい	息苦しさ、息切れ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6回使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること