

<p>名称 チオビタドリンクアイピタス</p>																																		
<p>リスク区分 第3類医薬品</p> <p>特徴 ●滋養強壮剤</p> <p>・女性にも飲みやすい「ブルーベリー風味」 ・ビタミンB1を2倍、ビタミンB2を3倍、ビタミンB6を10倍配合(チオビタ・ドリンク当社比) ・有効成分のタウリンを1,000mg配合 ・気になるカロリーは「68kcal」</p>																																		
<p>成分・分量 1本100mL中 タウリン1000mg、イノシトール50mg、ニコチン酸アミド20mg、チアミン硝化物(ビタミンB1)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)15mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)50mg、カルニチン塩化物120mg、無水カフェイン50mg</p> <p>添加物:白糖、果糖、ブドウ糖、DL-リンゴ酸、没食子酸プロピル、安息香酸Na、pH調整剤、バニリン、エチルバニリン、香料</p> <p>●本剤に配合されているビタミンB2より、尿が黄色になることがあります。心配ありません。</p>		<p>詳細情報</p> <table border="1"> <tr> <td>製造販売元</td> <td colspan="4">大鵬薬品工業株式会社</td> </tr> <tr> <td>剤形</td> <td colspan="4">液剤</td> </tr> <tr> <td>包装単位</td> <td>100mLx1本</td> <td>100mLx3本</td> <td>100mLx10本</td> <td>100mLx50本</td> </tr> <tr> <td>メーカー希望小売価格</td> <td>198円 (税抜価格 180円)</td> <td>594円 (税抜価格 540円)</td> <td>1,980円 (税抜価格 1,800円)</td> <td>9,900円 (税抜価格 9,000円)</td> </tr> <tr> <td>JANコード</td> <td>4987117439304</td> <td>4987117439335</td> <td>4987117439311</td> <td>4987117439328</td> </tr> <tr> <td>使用期限</td> <td colspan="4">3年</td> </tr> </table> <p>用法・用量 成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用して下さい。 ●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。 ●用法・用量を守って下さい。</p>			製造販売元	大鵬薬品工業株式会社				剤形	液剤				包装単位	100mLx1本	100mLx3本	100mLx10本	100mLx50本	メーカー希望小売価格	198円 (税抜価格 180円)	594円 (税抜価格 540円)	1,980円 (税抜価格 1,800円)	9,900円 (税抜価格 9,000円)	JANコード	4987117439304	4987117439335	4987117439311	4987117439328	使用期限	3年			
製造販売元	大鵬薬品工業株式会社																																	
剤形	液剤																																	
包装単位	100mLx1本	100mLx3本	100mLx10本	100mLx50本																														
メーカー希望小売価格	198円 (税抜価格 180円)	594円 (税抜価格 540円)	1,980円 (税抜価格 1,800円)	9,900円 (税抜価格 9,000円)																														
JANコード	4987117439304	4987117439335	4987117439311	4987117439328																														
使用期限	3年																																	
<p>効能・効果 滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給</p>																																		
<p>使用上の注意</p> <p>■相談すること</p> <p>1. 服用後、皮膚に発疹があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。</p> <p>2. 服用後、下痢があらわれることがあるため、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。</p> <p>3. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。</p>																																		