

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

生薬製剤

# 肝生

かん せい

**特徴** 肝臓の機能を正常に近づけます。

## ⚠【使用上の注意】

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)  
授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

### 👤 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
  - 胃腸が弱く下痢しやすい人
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
  - 次の医薬品を服用している人  
瀉下薬(下剤)
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
軟便、下痢
- 1カ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効能・効果

肝臓機能障害、肝臓肥大、急・慢性肝炎、黄疸、胆のう炎

## 用法・用量

食間に水又はお湯にて服用します。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包(2g)	3回
15歳未満	服用しないでください	

食間とは食事と食事の間という意味で、食後2～3時間を指します。

## 成分・分量

本品3包(6g)中、下記生薬より製した肝生乾燥エキス2gを含有します。

サンソウニン(酸棗仁)…1.46g ニンジン(人参)…1.46g サンシシ(山梔子)…1.46g  
シャゼンシ(車前子)…1.46g ソウハクヒ(桑白皮)…1.46g キジツ(枳実)…1.46g  
シュクシャ(縮砂)…1.46g ケイヒ(桂皮)…0.37g ダイオウ(大黄)…0.37g  
ウバイ(烏梅)…1.46g キッピ(橘皮)…1.46g ガイヨウ(艾葉)…1.46g

添加物として乳糖水和物及びカルメロースナトリウムを含有します。



サンソウニン(酸棗仁) ニンジン(人参) サンシシ(山梔子) シャゼンシ(車前子) ソウハクヒ(桑白皮) キジツ(枳実)



シュクシャ(縮砂) ケイヒ(桂皮) ダイオウ(大黄) ウバイ(烏梅) キッピ(橘皮) ガイヨウ(艾葉)

## 〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

## 包装

1包(2g)×60包、1包(2g)×21包

## お問い合わせ先


お問い合わせはお買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

連絡先 大鵬薬品工業株式会社 お客様相談室

〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27

電話番号：03-3293-4509 受付時間：9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

ホームページ：http://www.taiho.co.jp/

販売元  大鵬薬品工業株式会社  
東京都千代田区神田錦町1-27

製造販売元 株式会社 建林松鶴堂  
埼玉県戸田市戸田公園3-7