

服用に際して、パッケージ又はラベルの説明文をよくお読みください。

生薬配合胃腸薬

第2類医薬品

ソルマック[®]
プラス

SOLMACK PLUS

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

●長期連用しないで下さい。



■ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人 (2) 高齢者 (3) むくみのある人
 - (4) 高血圧、腎臓病、心臓病の診断を受けた人
- 服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師の診療を受けて下さい。
偽アルドステロン症、ミオパチー（手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。）
- 3～6日間服用しても症状がよくなる場合場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、消化不良、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、もたれ(胃もたれ)、胃弱、食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、胸やけ、胸つかえ

用法・用量

成人(15歳以上)、1回1本(25mL)を1日2回服用して下さい。

服用間隔は4時間以上おいて下さい。

●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。

●用法・用量を厳守して下さい。

成 分 -1日量2本(50mL)中-

ウコン流エキス	0.3mL (原生薬300mgに相当)
カンゾウ抽出物	135mg (原生薬1930.5mgに相当)
ニンジン流エキス	0.5mL (原生薬500mgに相当)
オウレンチンキ	0.826mL (原生薬247.8mgに相当)
チョウジチンキ	0.126mL (原生薬37.8mgに相当)
ゲンチアナチンキ	0.376mL (原生薬112.8mgに相当)
ソウジュツ流エキス	1.2mL (原生薬1200mgに相当)
ケイヒチンキ	0.25mL (原生薬75mgに相当)
カルニチン塩化物	120mg

添加物：ハチミツ、白糖、アラビアゴム、エデト酸Ca/2Na、L-メントール、アルコール、安息香酸Na、pH調整剤、安息香酸ベンジル、香料

(アルコール0.8mL以下/本)

●生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用して下さい。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

包 装

- 1箱2本(25mL×2本)入り
- 1箱5本(25mL×5本)入り

●上記の内容はパッケージ又はラベルに表示しております。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
TEL 0120-149-931 (フリーダイヤル)



製造販売元

大鵬薬品工業株式会社

東京都千代田区神田錦町1-27

お客様相談室 TEL.03-3293-4509

<http://www.taiho.co.jp/>

® : 登録商標