

新登場

薬局・薬店様用

Z E N O L

# ゼノール ジクロダイレクト®

外用鎮痛消炎薬 第2類医薬品

肩こり・腰痛にダイレクトに浸透



ジクロフェナクナトリウム

1.0%

腰・肩にすり込んで、  
つらい痛み  
にダイレクトに  
浸透


手を汚さず、  
べたつかない

太塗り  
チック剤

販売名 ゼノールジクロダイレクト

効能・効果 関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛

TAIHO 大鵬薬品



**ジクロフェナクナトリウムとは・・・**  
シクロオキシゲナーゼを阻害することでプロスタグランジン合成を抑制し、鎮痛効果があると考えられています。

# ゼノール ジクロダイレクト®

外用鎮痛消炎薬 [第2類医薬品]

## ■使用上の注意

### ⊗してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。
  - (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (2)ぜんそくを起こしたことがある人
  - (3)妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (4)15歳未満の小児
2. 次の部位には使用しないでください。
  - (1)目の周囲、粘膜等
  - (2)皮膚の弱い部位(顔、頭、わきの下等)
  - (3)湿疹、かぶれ、傷口
  - (4)みずむし・たむし等又は化膿している患部
3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤を使用しないでください。
4. 長期連用しないでください。

### 🗨️相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1)医師の治療を受けている人
  - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (3)次の医薬品の投与を受けている人 ニューキノロン系抗菌剤
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み、刺激感、熱感、皮膚のあれ、落屑(らくせつ:フケ、アカのような皮膚のはがれ)、水疱、色素沈着

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。
接触皮膚炎、 光線過敏症	塗擦部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱・ただれ等の激しい皮膚炎症状や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身にひろがる場合があります。また、日光があたった部位に症状があらわれたり、悪化することがあります。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## ■製品概要

販売名	ゼノールジクロダイレクト
区分	第2類医薬品
剤型	チック剤
用法・用量	1日3~4回適量を患部にすり込んでください。
内容量	42g
成分(100g中)	・ジクロフェナクナトリウム 1.0g ・l-メントール 3.0g
効能・効果	関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫(ねんざ)
製造販売元	三笠製薬株式会社
販売元	大鵬薬品工業株式会社
希望小売価格	1,600円(本体価格)

## 規格、サイズ、重量、JAN、ITFコード

包装	規格・容量	サイズ (縦×横×高さ[mm])	重量[g]	メーカー希望 小売価格(税別)	JANコード	ITFコード
 個装	42g×1箱	48×55 ×141	104g	1,600円	 4 987117 372335	—
 中箱	42g×10箱	114×251 ×144	1,113g	—	—	—
 外箱	42g×10箱 ×10	261×598 ×306	11,750g	—	 4 987117 372342	 149 87117 37233 2

