

ペレックストローチ添付文書2013年4月改訂.txt

【添付文書記載商品名】

◇添付文書記載商品名◇  
ペレックストローチ

◇添付文書記載商品名カナ◇  
ペレックストローチ

【添付文書作成・改訂年月】

◇初回添付文書作成年月◇  
2002/06

◇添付文書改訂年月◇  
2013/04

【添付文書版番号】

YM13D08

【添付文書記載商品情報】

◇添付文書記載薬効名◇  
口腔咽喉薬

◇添付文書記載商品説明◇

【添付文書の必読等に関する事項】

ご使用に際して、この説明文書をよくお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

【特徴】

のどの痛み、イガイガに

- 殺菌剤 セチルピリジニウム塩化物水和物  
口腔内の殺菌・消毒し、口臭を除去します。
- 抗ヒスタミン剤 クロルフェニラミンマレイン酸塩  
炎症をしずめ、のどの痛み・はれを改善します。
- 抗炎症剤 グリチルリチン酸二カリウム  
炎症をしずめ、のどの痛み・はれを改善します。

【使用上の注意】

◇前書き注意◇

■■してはいけないこと■■

◇してはいけないことカッコ書き◇

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります

◇「してはいけないこと」の内容◇

1. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。  
抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬、  
他の口腔咽喉薬（トローチ剤）等）
2. 使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。  
（眠気等があらわれることがあります。）

■ ■ 相談すること ■ ■

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (4) 次の症状のある人：排尿困難
  - (5) 次の診断を受けた人：緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って

医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔関係部位〕	〔症 状〕
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

〔症状の名称〕	〔症 状〕
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、

疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする。血尿等があらわれる。

無顆粒球症 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 使用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、

使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

口のかわき、眠気

4. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

◇その他の注意◇

【効能・効果】

- のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ
- 口腔内の殺菌・消毒 ●口臭の除去

◇その他記載事項◇

【用法・用量】

次の量を口中に含み、かみ砕かずゆっくり溶かしてください。

〔年 齢〕 成人（15歳以上）

〔一 回 量〕 1個

〔一日使用回数〕 4～6回

〔年 齢〕 小児（5歳以上15歳未満）

〔一 回 量〕 1個

〔一日使用回数〕 2～3回

〔年 齢〕 5歳未満

〔一 回 量〕 使用しないでください。

◇用法・用量に関連する注意◇

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児（5歳以上15歳未満）に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 本剤はトローチ剤ですので、かみ砕いたり、そのままのみこんだりしないでください。

【成分・分量】

1日量6個（成人）中に次の成分を含有する黄緑色半透明のフィルム状トローチ剤です。

〔成分〕 セチルピリジニウム塩化物水和物  
〔6個中の含量〕 6mg  
〔働き〕 口腔内を殺菌・消毒し、口臭を除去します。

〔成分〕 クロルフェニラミンマレイン酸塩  
〔6個中の含量〕 6mg  
〔働き〕 炎症をしずめ、のどの痛み・はれを改善します。

〔成分〕 グリチルリチン酸ニカリウム  
〔6個中の含量〕 15mg  
〔働き〕 炎症をしずめ、のどの痛み・はれを改善します。

◇添加物◇

添加物としてヒドロキシプロピルセルロース、ポビドン、プルラン、マクロゴール、1-メントール、タンニン酸、D-ソルビトール、サッカリンNa、シヨ糖脂肪酸エステル、銅クロロフィリンNa、バニリン、エチルバニリン、香料を含有します。

◇成分・分量に関連する注意◇

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 薬剤入りアルミ包装開封後はすみやかに使用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。  
使用期限は外箱に記載しています。

【その他の添付文書記載内容】

〔のみこまないために〕

ペレックスストローチは、厚さ0.3mmのフィルム上の円形のトローチです。下図のようにトローチを手にとって舌にのせ、口を閉じると上あごにうまくつき、のみこみにくくなります。

①取りだす。 ②手に取り、舌にのせる。 ③口を閉じて上あごにつける。 ④そのままのみこまないでください。

【問合せ先】

◇問合せ先書き◇

お問い合わせはお買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

◇問合せ先名◇

大鵬薬品工業株式会社 お客様相談室

◇問合せ先住所◇

〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27

◇問合せ先電話◇

03-3293-4509

◇問合せ受付時間◇

9:00~17:30 (土、日、祝日を除く)

◇問合せ先に関する上記以外の記載内容◇

◇問合せ先メーカーHP名◇

◇問合せ先メーカーHPのURL◇

<http://www.taiho.co.jp>

◇当該製品に関するWebページ名◇

◇当該製品WebページのURL◇

**【包装別共通商品 (JAN) コード】**

9個×800袋	4987117670295
18個×100個	4987117670264
9個	4987117670288
18個	4987117670257

**【備考】**

eof (この「添付文書」の終わり)