

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ペレックストローチ			
2	成分・分量	1日量6個(成人)中 セチルピリジニウム塩化物水和物 6mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg グリチルリチン酸二カリウム 15mg			
3	用法・用量	次の量を口中に含み、かみ砕かずにゆっくり溶かしてください			
		年齢	成人 (15歳以上)	小児 (5歳以上15歳未満)	5歳未満
		1回量	1個	1個	使用しないで ください
1日使用回数	4~6回	2~3回			
4	効能・効果	のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ、口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去			
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬、他の口腔咽喉薬(トローチ剤)等) 2. 使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気等があらわれることがあります) 次に該当する人はお申し出ください ・医師又は歯科医師の治療を受けている人 ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・排尿困難の症状のある人 ・緑内障の診断を受けた人 【小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください】			
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項				

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。