

◇説明文書記載商品名◇

ペレックストローチ

◇説明文書記載商品名カナ◇

ペレックストローチ

◇初回説明文書作成年月◇

2009/05

◇説明文書改訂年月◇

2013/04

◇説明文書版番号◇

1

【成分・分量】

1日量6個（成人）中

セチルピリジニウム塩化物水和物 6mg

クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg

グリチルリチン酸二カリウム 15mg

【用法・用量】

次の量を口中に含み、かみ砕かずゆっくり溶かしてください

年齢：成人（15歳以上）

1回量：1個

1日服用回数：4～6回

年齢：小児（5歳以上15歳未満）

1回量：1個

1日服用回数：2～3回

年齢：小児（5歳未満）

使用しないでください

【効能・効果】

のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ、口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去

【してはいけないこと】

1. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬、他の口腔咽喉薬（トローチ剤）等）

2. 使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

（眠気があらわれることがあります）

【相談すること】

次に該当する人はお申し出ください

- ・ 医師又は歯科医師の治療を受けている人
- ・ 妊婦又は妊娠していると思われる人
- ・ 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- ・ 排尿困難の症状のある人
- ・ 緑内障の診断を受けた人

[小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください]

eof （この「説明文書」の終わり）