

第2類医薬品

販売名:ピタセキトローチ
 特長 ●口内殺菌成分・セチルトリニウム塩化物の両者を配合しており、のどの炎症によるのどの痛み・はれを抑えます。●鎮痛成分・フェノールフタリン酸ナトリウムトローチ錠中瓶にはたらいいて、つらい咳を抑えます。

使用上の注意

❗してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 次の人は使用しないこと 本剤は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮痛薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(消炎内服薬、薬物酔い、薬アレルギー用薬等)
- 使用後、薬物又は機械類の運転操作をしないこと(眠気等があらわれることがある)。

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 (1)医師の治療を受けている人、(2)妊婦又は妊娠していると思われる人、(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人、(4)次の症状のある人。高熱
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

風邪部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息苦しさ、息切れ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診察を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどがかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

- 使用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の特長又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。重症
- 4.5-6回使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

S231005 | 副作用被害救済制度 TEL 0120-149-931

使用
期限
製造
番号



使用に際してはこの説明書をよく読み、本剤とともに保管してください。

【保管及び取扱い上の注意】
 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
 (2)お肌の手触りがない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。(4)アルミ袋開封後はすみやかに使用すること。
 (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

【効能・効果】せき、たん、のどの炎症によるのどの痛み、のどのはれ、のどのあれ、のどの不快感、声がれ

【用法・用量】次の量を口中に含み、かまずにゆっくり溶かして使用すること。

年齢	回数	1回使用回数	使用期間
成人(15歳以上)	1回	1回	2週間以上
15歳未満			使用しないこと

<用法・用量に関連する注意>


- 定められた用法、用量を厳守すること。
- かんだり、のみこんだりしないこと。

【成分】6回(1日使用量)中


成分	含量
フェノールフタリン酸ナトリウムトローチ錠	60mg
グアヤコリンスルホン酸カリウム	140mg
セチルトリニウム塩化物水和物	6mg

添加物:ヒドロキシアロピルセルロース、ポリドキシフルラン、マクロゴール、トコメチルタンニン酸、D-ソルビトール、サッカリンNa、ショ糖脂肪酸エステル、スクラロース、銷クロロフィリンNa、香料

<のこまにないために>*使用例



舌には、口を開き、上あごに貼る等により口中でゆっくり溶かしてください



製造販売元
 大鵬薬品工業株式会社
 東京都千代田区神田錦町1-27
 お客様相談室 TEL.0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>



TAHO 大鵬薬品

PITAS

話しながら使える
 貼り付くトローチ

咳やたんを
 おさえる

ぴたっと

PITAS

—ピタス—



実物大



咳 中



会 議 中



話 中

販売名:
 ピタセキトローチ
 第2類医薬品

セルフメディケーション
 税 控除 対象

12 個入り

PITAS