

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

要指導医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	バップフォーレディ
2	成分・分量	1錠中 プロピペリン塩酸塩 10mg
3	用法・用量	成人女性(15歳以上70歳未満)、1回1錠を1日1回食後に服用してください。
4	効能・効果	尿意切迫感(急に尿がしたいとの我慢し難い訴え)、 尿意切迫感を伴う頻尿(尿の回数が多い)・尿もれ
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<p>1.次の人は服用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人</li> <li>(2)男性</li> <li>(3)70歳以上の女性</li> <li>(4)15歳未満の小児</li> <li>(5)妊婦又は妊娠していると思われる人</li> <li>(6)次の症状のある人 <ul style="list-style-type: none"> <li>・排尿困難、尿閉(尿意があるのに排尿しづらい、できない状態)</li> <li>・血尿、排尿痛、膀胱痛</li> </ul> </li> <li>(7)医療機関にて次の診断を受けた人 <ul style="list-style-type: none"> <li>・胃アトニー(胃下垂に伴う胃のはたらきの低下)、腸アトニー(腸の運動低下)</li> <li>・幽門・腸管の閉塞</li> <li>・パーキンソン病、脳血管障害(脳梗塞、脳出血等)</li> <li>・緑内障、認知症、重症筋無力症、重篤な心疾患</li> </ul> </li> </ul> <p>2.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。 胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する胃腸薬、乗物酔い薬、鼻炎用内服薬、 かぜ薬</p> <p>3.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。 (眠気、目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります)</p> <p>4.授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。</p> <p>5.長期連用しないでください。</p> <p>次に該当する人はお申し出下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)医師の治療を受けている人</li> <li>(2)高齢者(65歳以上)</li> <li>(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人</li> <li>(4)次の症状のある人 <ul style="list-style-type: none"> <li>・頻尿や尿もれの症状が急性(発症後1ヵ月以内)</li> </ul> </li> </ul>

		<p>・夜間頻尿のみで日中には頻尿がない人</p> <p>(5)不整脈、肝機能障害、腎障害、潰瘍性大腸炎、甲状腺機能亢進症の診断を受けた人</p> <p>(6)排尿困難、尿閉、血尿、排尿痛又は膀胱痛の症状を起こしたことがある人 (現在も症状がある人は服用できません)</p> <p>(7)子宮癌、直腸癌等の骨盤内手術を受けたことがある人</p>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。