

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	肝生(カンセイ)									
2	成分・分量	3包(6g)中、下記生薬より製した肝生乾燥エキス 2g を含有します サンソウニン(酸棗仁) 1.46g ニンジン(人參) 1.46g サンシシ(山梔子) 1.46g シャゼンシ(車前子) 1.46g ソウハクヒ(桑白皮) 1.46g キジツ(枳実) 1.46g シュクシャ(縮砂) 1.46g ケイヒ(桂皮) 0.37g ダイオウ(大黃) 0.37g ウバイ(烏梅) 1.46g キツピ(橘皮) 1.46g ガイヨウ(艾葉) 1.46g									
3	用法・用量	食間に水又はお湯にて服用します <table border="1"><thead><tr><th>年齢</th><th>1回量</th><th>1日服用回数</th></tr></thead><tbody><tr><td>成人(15歳以上)</td><td>1包(2g)</td><td>3回</td></tr><tr><td>15歳未満</td><td colspan="2">服用しないでください</td></tr></tbody></table>	年齢	1回量	1日服用回数	成人(15歳以上)	1包(2g)	3回	15歳未満	服用しないでください	
年齢	1回量	1日服用回数									
成人(15歳以上)	1包(2g)	3回									
15歳未満	服用しないでください										
4	効能・効果	肝臓機能障害、肝臓肥大、急・慢性肝炎、黄疸、胆のう炎									
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください 次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人 ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) ・胃腸が弱く下痢しやすい人 ・今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 ・次の医薬品を服用している人 瀉下薬(下剤)									
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項										

【注意事項】

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。