

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	大鵬かぜ内服液銀翹散									
2	成分・分量	1日量90mL(30mL×3本)中 銀翹散エキス 9.7g 原生薬として キンギンカ(金銀花) 4.260g タンズシ(淡豆豉) 2.136g レンギョウ(連翹) 4.260g ゴボウシ(牛蒡子) 2.136g キキョウ(桔梗) 2.556g タンチクヨウ(淡竹葉) 1.704g カンゾウ(甘草) 2.556g ケイガイ(荊芥) 1.704g ハッカ(薄荷) 2.556g レイヨウカク(羚羊角) 0.132g									
3	用法・用量	次の量を食間によく振ってから服用してください <table border="1"><thead><tr><th>年齢</th><th>1回量</th><th>1日服用回数</th></tr></thead><tbody><tr><td>成人(15歳以上)</td><td>1本</td><td>3回(食間)</td></tr><tr><td>15歳未満</td><td colspan="2">服用しないでください</td></tr></tbody></table>	年齢	1回量	1日服用回数	成人(15歳以上)	1本	3回(食間)	15歳未満	服用しないでください	
年齢	1回量	1日服用回数									
成人(15歳以上)	1本	3回(食間)									
15歳未満	服用しないでください										
4	効能・効果	かぜによるのどの痛み・せき・口(のど)の渇き・頭痛									
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	短期間の服用にとどめ、連用しないでください 次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人 ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) ・胃腸の弱い人 ・高齢者 ・今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 ・むくみの症状のある人 ・高血圧、心臓病、腎臓病の診断を受けた人									
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項										

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。