

【添付文書記載商品名】

◇添付文書記載商品名◇
ソルマックEX2

◇添付文書記載商品名カナ◇
ソルマックEX2

【添付文書作成・改訂年月】

◇初回添付文書作成年月◇
2012/09

◇添付文書改訂年月◇

【添付文書版番号】

L1102

【添付文書記載商品情報】

◇添付文書記載薬効名◇
生薬配合胃腸薬

◇添付文書記載商品説明◇

【添付文書の必読等に関する事項】

【特徴】

【使用上の注意】

◇前書き注意◇

■■してはいけないこと■■

◇してはいけないことカッコ書き◇

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります

◇「してはいけないこと」の内容◇

●長期連用しないで下さい。

■■相談すること■■

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 高齢者

(3) むくみのある人

(4) 高血圧、腎臓病、心臓病の診断を受けた人

2. 服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師の診療を受けて下さい。

偽アルドステロン症、ミオパチー（手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。）

3. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って

医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

◇その他の注意◇

【効能・効果】

食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、もたれ（胃もたれ）、はきけ（二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、胃弱、食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部膨満感、消化不良、胸やけ、胸つかえ

◇その他記載事項◇

【用法・用量】

成人（15歳以上）1日1回1本（50mL）を服用して下さい。

◇用法・用量に関連する注意◇

- 小児（15歳未満）は服用しないで下さい。
- 用法・用量を厳守して下さい。

【成分・分量】

	1本（50mL）中	（ ）内は原生薬換算値
エンメイソウエキス	30mg	（201mg）
ウコン流エキス	0.3mL	（300mg）
カンゾウ抽出物	115mg	（1644.5mg）
チョウジチンキ	0.126mL	（37.8mg）
ゲンチアナチンキ	0.376mL	（112.8mg）
ニンジン流エキス	0.5mL	（500mg）
オウレンチンキ	0.792mL	（237.6mg）
ソウジュツ流エキス	1.2mL	（1200mg）
ケイヒチンキ	0.25mL	（75mg）
カルニチン塩化物	120mg	

◇添加物◇

白糖、ハチミツ、アルコール、プロピレングリコール、アラビアゴム、エデト酸Ca/2Na、l-メントール、安息香酸Na、pH調整剤、香料。（アルコール1.5mL以下）

◇成分・分量に関連する注意◇

- 生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用して下さい。

【保管及び取り扱い上の注意】

- （1）直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- （2）小児の手の届かない所に保管して下さい。
- （3）開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わります）。
- （4）使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

【その他の添付文書記載内容】

【問合せ先】

◇問合せ先書き◇

◇問合せ先名◇

大鵬薬品工業株式会社 お客様相談室

◇問合せ先住所◇

東京都千代田区神田錦町1-27

◇問合せ先電話◇

03-3293-4509

◇問合せ受付時間◇

9:00~17:30 (土、日、祝日を除く)

◇問合せ先に関する上記以外の記載内容◇

◇問合せ先メーカーHP名◇

◇問合せ先メーカーHPのURL◇

<http://www.taiho.co.jp/>

◇当該製品に関するWebページ名◇

◇当該製品WebページのURL◇

【包装別共通商品 (JAN) コード】

50mL	45144639
50mL×8本	4987117397895
50mL×48本	4987117397901

【備考】

eof (この「添付文書」の終わり)