

服用に際して、ラベルの説明文をよくお読みください。

滋養強壮剤

第3類医薬品

チオビタ® ドリンク1000

TIOVITA DRINK 1000

[使用上の注意]

相談すること

- 服用後、皮膚に発疹があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
- 服用後、下痢があらわれることがあるので、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
- しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

[効能・効果]

- 滋養強壮 ● 虚弱体質 ● 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

[用法・用量]

成人（15歳以上）1日1回1本（100mL）を服用して下さい。

- 小児（15歳未満）は服用しないで下さい。
- 用法・用量を守って下さい。

[成分（1本100mL中）]

タウリン1000mg、イノシトール50mg、ニコチン酸アミド20mg、
チアミン硝化物（ビタミンB₁）10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム
(ビタミンB₂) 5mg、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB₆）50mg、カルニチン塩化物100mg、
無水カフェイン50mg

添加物：白糖、果糖、ブドウ糖、D L-リンゴ酸、没食子酸プロピル、
安息香酸Na、pH調整剤、バニリン、エチルバニリン、香料

- 本剤に配合されているビタミンB₂より、尿が黄色になることがあります、心配ありません。

[保管及び取扱い上の注意]

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わります）。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

包 装

100mL瓶入り

●上記の内容はラベルに表示しております。

副作用被害救済制度の問合せ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

TEL 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元



大鵬薬品工業株式会社

東京都千代田区神田錦町1-27

お客様相談室 TEL.03-3293-4509

受付時間:9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

<https://www.taiho.co.jp/>

® : 登録商標