

<p>名称 ウレパールプラスクリーム</p>															
<p>リスク区分 第2類医薬品</p> <p>特徴 ●乾燥性皮膚治療薬</p> <p>・保湿成分として、天然保湿因子の尿素とビタミンE(酢酸トコフェロール)が乾燥肌に水分を保持し、しっとり、なめらかにします。 ・かゆみ止め成分として、3種類のかゆみ止め成分を配合しています。 ・肌になじみやすく、のびのいいクリーム剤です。</p>															
<p>成分・分量 [成分] 100g中に次の成分を含有するクリーム剤です。 尿素10.0g、ジフェンヒドラミン塩酸塩1.0g、d-カンフル1.0g、リドカイン2.0g、トコフェロール酢酸エステル0.3g</p> <p>なお、添加物としてメチルパラベン、BHT、トリイソオクタン酸グリセリン、ミリスチン酸オクチルドデシル、コレステロール、メチルポリシロキサン、ステアリルアルコール、セタノール、ベヘニルアルコール、ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸ソルビタン、ポリオキシエチレンベヘニルエーテル、ステアリン酸マクロゴール、ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸Na、グリシン、DL-アラニン、塩化Na、グリセリン、乳酸Na、乳酸、精製水を含有します。</p>	<p>詳細情報</p> <table border="1"> <tr> <td>販売元</td> <td>大鵬薬品工業株式会社</td> </tr> <tr> <td>製造販売元</td> <td>株式会社大塚製薬工場</td> </tr> <tr> <td>剤形</td> <td>クリーム剤</td> </tr> <tr> <td>包装単位</td> <td>80g</td> </tr> <tr> <td>メーカー希望小売価格</td> <td>1600円</td> </tr> <tr> <td>JANコード</td> <td>4987117140125</td> </tr> <tr> <td>使用期限</td> <td>3年</td> </tr> </table> <p>用法・用量 1日1～数回、適量を患部に塗布します。</p> <p>[用法・用量に関連する注意] (1) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。 (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。 (3) 本剤は外用にのみ使用してください。 (4) 患部やその周辺の汚れを落としてから使用してください。 (5) 定められた用法・用量を守ってください。 (6) 化粧品ではないので、効能・効果で定められた患部のみに使用し、基礎化粧等の目的で顔面には使用しないでください。</p>	販売元	大鵬薬品工業株式会社	製造販売元	株式会社大塚製薬工場	剤形	クリーム剤	包装単位	80g	メーカー希望小売価格	1600円	JANコード	4987117140125	使用期限	3年
販売元	大鵬薬品工業株式会社														
製造販売元	株式会社大塚製薬工場														
剤形	クリーム剤														
包装単位	80g														
メーカー希望小売価格	1600円														
JANコード	4987117140125														
使用期限	3年														
<p>効能・効果 かゆみを伴う乾燥性皮膚(老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮膚)</p>															
<p>使用上の注意</p> <p>⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 次の部位には使用しないでください。 (1) 目のまわり、粘膜(例えば口腔、鼻腔、膣等)など (2) 炎症又は傷のある患部 (3) ただれやひび割れのひどい患部</p> <p>🗨 相談すること 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 (1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)又は刺激症状を起こしたことがある人 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。</p>															
<table border="1"> <tr> <td>関係部位</td> <td>症状</td> </tr> <tr> <td>皮膚</td> <td>かぶれ、発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、びりびり感)、はれ、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態</td> </tr> </table>	関係部位	症状	皮膚	かぶれ、発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、びりびり感)、はれ、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態											
関係部位	症状														
皮膚	かぶれ、発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、びりびり感)、はれ、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態														

3. 2週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。