

【添付文書記載商品名】

◇添付文書記載商品名◇

ウレパールプラスクリーム

◇添付文書記載商品名カナ◇

ウレパールプラスクリーム

【添付文書作成・改訂年月】

◇初回添付文書作成年月◇

2008/09

◇添付文書改訂年月◇

2012/01

【添付文書版番号】

2957S

【添付文書記載商品情報】

◇添付文書記載薬効名◇

乾燥性皮膚治療薬

◇添付文書記載商品説明◇

【添付文書の必読等に関する事項】

ご使用前に必ずこの添付文書をお読みください。

また、必要なとき読めるように大切に保管してください。

【特徴】

エアコンやアルミサッシによる住環境の密閉化により、季節にかかわらず皮膚が乾燥しやすい状況におかれています。また、年齢や体質、栄養のバランスなどにより、皮脂の分泌が低下したり、皮膚の表面にある角質層に水分を保持するはたらきが弱くなることがあります。このような場合、皮膚はうるおいをなくし、カサカサの「乾燥性皮膚」になりがちです。乾燥性皮膚は、気温や湿度の変化、衣類などさまざまな刺激に敏感になり、かゆみを起こしやすくなります。

特に気温が低く、空気が乾燥する冬季に多く発症し、夜間にかゆみがひどくなるのが特徴です。

●ウレパール プラスクリームの特徴

乾燥性皮膚に伴うかゆみを鎮めると同時に、皮膚をしっとりなめらかにします。

親水性のクリームで皮膚によくのび、患部にすっとなじみます。

・乾燥対策

尿素が乾燥した皮膚に水分を集め、逃がさないようにします。

+

・かゆみ止め対策

かゆみ止め成分ジフェンヒドラミン塩酸塩、d-カンフル、リドカインがしつこいかゆみを鎮めます。

●こんなカサカサ皮膚に効果があります。

- ・お風呂上がりや就寝中など体が温まってかゆい所に。
- ・うで、あし、腰、背中などがカサついてかゆい所に。
- ・衣類などの刺激でかゆい所に。
- ・お子様のかゆみを伴うカサついた皮膚に。

【使用上の注意】

◇前書き注意◇

■■してはいけないこと■■

◇してはいけないことカッコ書き◇

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

◇「してはいけないこと」の内容◇

次の部位には使用しないでください。

- (1) 目のまわり、粘膜（例えば口腔、鼻腔、膣等）など
- (2) 炎症又は傷のある患部
- (3) ただれやひび割れのひどい患部

■■相談すること■■

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）
又は刺激症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位：皮膚

症 状：かぶれ、発疹・発赤、かゆみ、刺激感（痛み、熱感、ぴりぴり感）、
はれ、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態

3. 2週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この添付文書を持って

医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

◇その他の注意◇

【効能・効果】

かゆみを伴う乾燥性皮膚（老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮膚）

○老人・成人の乾皮症とは・・・

皮脂の分泌低下により全身の皮膚が乾燥し、うるおいがなくなります。特にひざから足首までの部分、おしりの部分などに多く見られ、しばしばかゆみを伴います。

○小児の乾燥性皮膚とは・・・

主に毛孔（毛穴）に一致した鳥肌様のザラザラと乾燥した皮膚で、かゆみを伴います。一般に冬に悪くなり、夏に軽くなります。

◇その他記載事項◇

【用法・用量】

1日1～数回、適量を患部に塗布します。

◇用法・用量に関連する注意◇

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 本剤は外用にのみ使用してください。
- (4) 患部やその周辺の汚れを落としてから使用してください。
- (5) 定められた用法・用量を守ってください。
- (6) 化粧品ではないので、効能・効果で定められた患部のみに使用し、基礎化粧品等の目的で顔面には使用しないでください。

【成分・分量】

100g中に次の成分を含有するクリーム剤です。

尿素10.0g、ジフェンヒドラミン塩酸塩1.0g、d-カンフル1.0g、リドカイン2.0g、トコフェロール酢酸エステル0.3g

◇添加物◇

なお、添加物としてメチルパラベン、BHT、トリイソオクタン酸グリセリン、ミリスチン酸オクチルドデシ

ル、コレステロール、メチルポリシロキサン、ステアリルアルコール、セタノール、ベヘニルアルコール、ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸ソルビタン、ポリオキシエチレンベヘニルエーテル、ステアリン酸マクロゴール、ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸Na、グリシン、DL-アラニン、塩化Na、グリセリン、乳酸Na、乳酸、精製水を含有します。

◇成分・分量に関連する注意◇

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (4) 外箱及び容器に表示の使用制限をすぎた製品は使用しないでください。

【その他の添付文書記載内容】

【問合せ先】

◇問合せ先前書き◇

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

◇問合せ先名◇

大鵬薬品工業株式会社 お客様相談室

◇問合せ先住所◇

〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27

◇問合せ先電話◇

03-3293-4509

◇問合せ受付時間◇

9:00~17:30 (土、日、祝日を除く)

◇問合せ先に関する上記以外の記載内容◇

◇問合せ先メーカーHP名◇

大鵬薬品工業株式会社

◇問合せ先メーカーHPのURL◇

<http://www.taiho.co.jp/>

◇当該製品に関するWebページ名◇

◇当該製品WebページのURL◇

【包装別共通商品（JAN）コード】

80g×40個 4987117140101

80g×10個 4987117140118

80g 4987117140125

【備考】

eof （この「添付文書」の終わり）