

【添付文書記載商品名】

◇添付文書記載商品名◇
ゼノールエクサム 液ゲル

◇添付文書記載商品名カナ◇
ゼノールエクサム エキゲル

【添付文書作成・改訂年月】

◇初回添付文書作成年月◇
1999/01

◇添付文書改訂年月◇
2014/06

【添付文書版番号】

01G406

【添付文書記載商品情報】

◇添付文書記載薬効名◇
外用鎮痛消炎薬

◇添付文書記載商品説明◇

【添付文書の必読等に関する事項】

ご使用に際して、このパッケージに記載の説明書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

【特徴】

【手の届きにくい肩・関節の痛みにラクにぬれるロングボディ】
肩甲骨などの、ぬりにくい患部にラクにぬれます。

フェルビナク3.0%配合
関節など、曲面の患部にも簡単にぬれます。
ベタつかないので、服がすぐに着られます。

【容器の正しい使い方】

- (1) スポンジ中央をしっかりと押す
- (2) スポンジが十分に湿ったことを確認
- (3) ゆっくりと患部に塗布

【使用上の注意】

◇前書き注意◇

■■してはいけないこと■■

◇してはいけないことカッコ書き◇
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

◇「してはいけないこと」の内容◇

1. 次の人は使用しないでください。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (4) 15歳未満の小児
2. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口
- (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部

■■相談すること■■

- 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔関係部位〕 〔症 状〕

皮 膚 : 発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

〔症状の名称〕 〔症 状〕

ショック(アナフィラキシー) : 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

- 3. 1週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

◇その他の注意◇

【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、筋肉痛、関節痛、打撲、捻挫(ねんざ)、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)

◇その他記載事項◇

【用法・用量】

1日2~4回、適量を患部に塗布してください。

◇用法・用量に関連する注意◇

<用法・用量に関連する注意>

- (1) スポンジ面が破れるおそれがありますので、お使いになる時は、スポンジ面に液が十分に浸透したことを確かめてから塗布してください。
- (2) 用法・用量を厳守してください。
- (3) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (5) 本剤塗布後の患部を、ラップフィルム等の通気性の悪いものでおおわないでください。

【成分・分量】

100g中

〔成分〕 〔含 量〕

フェルビナク・・・・・・・・・・3.0g

1-メントール・・・・・・・・・・2.0g

◇添加物◇

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、香料、

トリエタノールアミン、アルコールを含有します。

◇成分・分量に関連する注意◇

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをしっかりと閉めて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 本剤を火気に近づけないでください。また、使用済みの容器は火中に投げないでください。
- (5) 液が漏れるおそれがありますので、使用後は、キャップをしっかりと閉めてください。
- (6) 塗料(家具、塗装床、アクセサリ等)、化繊、絹、皮革等に付着すると変質することがありますので、ご注意ください。
- (7) 使用期限が過ぎた製品は、使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、品質保持の点からなるべく速やかに使用してください。

【その他の添付文書記載内容】

【問合せ先】

◇問合せ先書き◇

◇問合せ先名◇

大鵬薬品工業株式会社 お客様相談室

◇問合せ先住所◇

〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27

◇問合せ先電話◇

03-3293-4509

◇問合せ受付時間◇

9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

◇問合せ先に関する上記以外の記載内容◇

◇問合せ先メーカーHP名◇

◇問合せ先メーカーHPのURL◇

<http://www.taiho.co.jp/>

◇当該製品に関するWebページ名◇

◇当該製品WebページのURL◇

【包装別共通商品(JAN)コード】

52ml	4987117372304
52ml×10個×10箱	4987117372328

ゼノルエケム液ゲル添付文書2014年改訂.txt

【備考】

264Z00A00331

eof (この「添付文書」の終わり)