



4 987117 310900

ご使用に際して、この箱の説明書きをよくお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

押しあける

第2類医薬品

フェルピナクス

特長

- 効き目成分フェルピナクを配合
- 急冷感がひんやり気持ちいい高含水バップ剤
- 切らずにそのまま貼れる便利なクォーターサイズ
- 肌にやさしくフィットして、はがれにくい不織布を使用

毎日のこんな痛みに



△ 使用上の注意

⊗ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。
 - (1) 今までに本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状 (例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等) を起こしたことがある人。
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (4) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
 - (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 連続して2週間以上使用しないでください。

⊗ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書きを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ等

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書きを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

- 1日2回を限度として、患部に貼ってください。
 〈用法・用量に関連する注意〉
- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
 - (2) 本剤は、痛みやはれ等の原因となっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
 - (3) 汗をかいた後や皮膚がぬれている場合は、よく拭き取ってからお貼りください。

成分・分量(膏体2.5g/枚)

フェルピナクス……0.7g(膏体100g中)
 添加物として、*o*-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、プロピレングリコール、カルボキシビニルポリマー、ジソプロポパノールアミン、トメントール、ヒマシ油、メタケイ酸アルミン酸Mg、エドト酸Na、メチルパラベン、プロピルパラベン、酒石酸を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 品質保持のため未使用分は元の袋に入れ、開口部を二重に折り込み密閉し、保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6) 開封後は、なるべく早く使用してください。

使用期限

製造番号

Ⓒ 登録商標

S140203