

【添付文書記載商品名】

◇添付文書記載商品名◇
ゼノールエクサム FX

◇添付文書記載商品名カナ◇
ゼノールエクサム FX

【添付文書作成・改訂年月】

◇初回添付文書作成年月◇
1900/01

◇添付文書改訂年月◇
2014/06

【添付文書版番号】

01F405

【添付文書記載商品情報】

◇添付文書記載薬効名◇
外用鎮痛消炎薬

◇添付文書記載商品説明◇

【添付文書の必読等に関する事項】

ご使用に際して、このパッケージに記載の説明書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

【特徴】

【肩・腰の痛みをとるフェルビナク3.0%配合】

ニオイが気にならないからどこでも気軽に使えます。
ほのかなフローラルグリーンの香りでニオイを気にせずオフィスなどで
気軽に使えます。
ベタつかないサラッとタイプなのでぬった後、すぐに服が着られます。
バッグに入れて携帯しやすいスリムなチック。
底部のダイヤルを回すと《薬剤》が出てきます。
4～5mm出して使用してください。

【使用上の注意】

◇前書き注意◇

■■してはいけないこと■■

◇してはいけないことカッコ書き◇
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

◇「してはいけないこと」の内容◇

1. 次の人は使用しないでください。
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(2) ぜんそくを起こしたことがある人
(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(4) 15歳未満の小児
2. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口
- (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部

■■相談すること■■

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔関係部位〕 〔症 状〕
皮 膚 : 発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

- 〔症状の名称〕 〔症 状〕
ショック(アナフィラキシー) : 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。
3. 1週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

◇その他の注意◇

【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、打撲、捻挫(ねんざ)、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)

◇その他記載事項◇

【用法・用量】

1日2～4回、適量を患部にすり込んでください。

◇用法・用量に関連する注意◇

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (4) 本剤塗布後の患部を、ラップフィルム等の通気性の悪いものでおおわないでください。
- (5) 患部の汗をふきとってから使用してください。
- (6) 容器が直接患部に当たらないように、容器の中の薬剤を4～5mm出してから使用してください。
- (7) 薬剤底部の受け皿が見え、ガタつくようになったら、本剤の使用をやめてください。また、受け皿に残った薬剤は無理に使用しないでください。

【成分・分量】

100g中

〔成分〕 〔含 量〕
フェルピナク・・・・・・・・・・3.0g

1-メントール・・・・・・・・・・2.7g

◇添加物◇

添加物として、マクロゴール、クロタミトン、オレイルアルコール、ステアリン酸、イソステアリン酸、乳酸Na、香料、フェニルエチルアルコール、スクワラン、pH調整剤、イソプロパノール、その他2成分を含有します。

◇成分・分量に関連する注意◇

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 揮発性がありますので、使用後はキャップをきちんと閉めて、外気にふれないようにしてください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5) 本剤を火気に近づけないでください。また、使用後は火中に投げないでください。
- (6) 塗料(家具、塗装床、アクセサリー等)、化繊、絹、皮革等に付着すると変質することがありますので、ご注意ください。
- (7) 使用期限が過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、品質保持の点からなるべく速やかに使用してください。

【その他の添付文書記載内容】

【問合せ先】

◇問合せ先前書き◇

◇問合せ先名◇

大鵬薬品工業株式会社 お客様相談室

◇問合せ先住所◇

〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27

◇問合せ先電話◇

03-3293-4509

◇問合せ受付時間◇

9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

◇問合せ先に関する上記以外の記載内容◇

◇問合せ先メーカーHP名◇

◇問合せ先メーカーHPのURL◇

<http://www.taiho.co.jp/>

◇当該製品に関するWebページ名◇

セノールエケムFX添付文書2014年改訂.txt

◇当該製品WebページのURL◇

【包装別共通商品（JAN）コード】

32g 4987117372038

32g×10個×10箱 4987117372045

【備考】

264Z00A00424

eof （この「添付文書」の終わり）