

名称 ゼノールしゅぶびたつと

リスク区分  
第3類医薬品

特徴  
●外用鎮痛消炎薬  
1.「消炎効果と冷しゅぶぶ効果でよく効きます」サリチル酸グリコールの消炎効果と高含水基剤の冷しゅぶぶ効果で関節痛、筋肉痛、捻挫(ねんざ)によく効きます。  
2.「よく伸びて、ピタッと付いてはがれない」伸縮性の高い不織布と、粘着性の高い膏体を使用していますので、ひじ、ひざ等動きの多いところにもピタッとついて、しゅぶぶ効果を発揮します。  
3.「チャック付きアルミ袋入り」保存に便利なチャック付きアルミ袋がしゅぶぶ剤の乾燥を防ぎます。



成分・分量  
膏体100g中(面積875cm<sup>2</sup>当たり)

詳細情報

成分		含量	販売元	大鵬薬品工業株式会社		
サリチル酸グリコール		1.70g	製造販売元	三笠製薬株式会社		
l-メントール		0.50g	剤形	パップ剤		
トコフェロール酢酸エステル		0.30g	包装単位	1箱 (14cmx10cmx12枚)	1箱 (14cmx10cmx24枚)	1箱(14cmx10cmx24枚) x2箱/パック
			メーカー希望小売価格	1200円	2000円	4000円

添加物:ゼラチン、プロピレングリコール、ミリスチン酸イソプロピル、ポリソルベート80、エデト酸Na、パラベン、グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、ポリアクリル酸、カルメロースNa、酒石酸、ヒマシ油、プロピレングリコール脂肪酸エステル、アクリル酸デンプン、酸化チタン、水酸化Al

JANコード	4987117372106	4987117372151	4987117372182
使用期限	3年		

用法・用量  
薬面のフィルムをはがして、1日1~2回患部に貼ってください。  
[用法・用量に関連する注意]  
(1)用法・用量を厳守してください。  
(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。  
(3)患部の汗をふきとってから使用してください。

効能・効果  
関節痛、筋肉痛、捻挫(ねんざ)、肩こり、筋肉疲労、腰痛、打撲、骨折痛、しもやけ

使用上の注意  
⊗ してはいけないこと  
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)  
次の部位には使用しないでください。  
(1)目の周囲、粘膜等  
(2)湿疹、かぶれ、傷口  
■ 相談すること  
1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。