

ご使用に際して、このパッケージに記載の説明書をよくお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

外用鎮痛消炎薬

ZENOL ゼノールエクサム®SX

関節・筋肉・肩の痛みをとる

【本剤の特長】

【つらい肩・腰の痛みにグリッと広くぬれる太ぬりチック】
太ぬりチックだから、肩から首すじまで広範囲にしっかりぬれます。
フェルピナク3.0%配合

【こんな時に使いやすい太ぬりチック】
腰の痛みと周辺患部にしっかりぬれます。
腕や足の筋肉の痛み幅広くぬれます。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

- 次の人は使用しないでください。
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - ぜんそくを起こしたことがある人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 15歳未満の小児
- 次の部位には使用しないでください。
 - 目の周囲、粘膜等
 - 湿疹、かぶれ、傷口
 - みずむし・たむし等又は化膿している患部

【相談すること】

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

- 1週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

関節痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、打撲、捻挫(ねんざ)、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)

【用法・用量】

1日2~4回、適量を患部にすり込んでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (4) 本剤塗布後の患部を、ラップフィルム等の通気性の悪いものでおかないでください。
- (5) 患部の汗をふきとってから使用してください。
- (6) 容器が直接患部に当たらないように、容器の中の薬剤を4～5mm出してから使用してください。
- (7) 薬剤底部の受け皿が見え、皿の上面が露出するようになったら、本剤の使用をやめてください。
また、受け皿に残った薬剤は無理に使用しないでください。

〔成分〕

100g 中

成分	含量
フェルピナク	3.0g
l-メントール	3.0g

添加物として、イソプロパノール、プロピレングリコール、マクロゴール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ステアリン酸Na、1, 3-ブチレングリコール、オレイルアルコール、スクワラン、pH調整剤を含有します。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 揮発性がありますので、使用後はキャップをきちんと閉めて、外気にふれないようにしてください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5) 本剤を火気に近づけないでください。また、使用後は火中に投じないでください。
- (6) 塗料(家具、塗装床、アクセサリ等)、化繊、絹、皮革等に付着すると変質することがありますので、ご注意ください。
- (7) 使用期限が過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、品質保持の点からなるべく速やかに使用してください。

〔内容量〕

43g

副作用被害救済制度の問合せ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

TEL 0120-149-931 (フリーダイヤル)

販売元



大鵬薬品工業株式会社

東京都千代田区神田錦町1-27

お客様相談室 TEL.03-3293-4509

<http://www.taiho.co.jp/>

製造販売元

三笠製薬株式会社

東京都練馬区豊玉北 2-3-1

®: 登録商標