

**【添付文書記載商品名】**

◇添付文書記載商品名◇

ゼノールエクサム SX

◇添付文書記載商品名カナ◇

ゼノールエクサム SX

**【添付文書作成・改訂年月】**

◇初回添付文書作成年月◇

1900/01

◇添付文書改訂年月◇

2014/06

**【添付文書版番号】**

11F405

**【添付文書記載商品情報】**

◇添付文書記載薬効名◇

外用鎮痛消炎薬

◇添付文書記載商品説明◇

**【添付文書の必読等に関する事項】**

ご使用に際して、このパッケージに記載の説明書きをよくお読みください。

また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

**【特徴】**

**【つらい肩・腰の痛みにグリッと広くぬれる太ぬりチック】**

太ぬりチックだから、肩から首すじまで広範囲にしっかりぬれます。

痛みとその周辺患部にグリッと押しつけるようにぬってください。

下をまわすと《薬剤》が出てきます。

4～5 mm出して使用してください。

フェルビナク 3.0%配合

**【こんな時に使いやすい太ぬりチック】**

腰の痛みと周辺患部にしっかりぬれます。

腕や足の筋肉の痛み幅広くぬれます。

**【使用上の注意】**

◇前書き注意◇

■■してはいけないこと■■

◇してはいけないことカッコ書き◇

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

◇「してはいけないこと」の内容◇

1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (4) 15歳未満の小児

2. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口
- (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部

■■相談すること■■

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書きを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔関係部位〕          〔症 状〕

皮 膚           : 発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

〔症状の名称〕                  〔症 状〕

ショック(アナフィラキシー) : 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん

声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 1週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書きを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

◇その他の注意◇

【効能・効果】

関節痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、打撲、捻挫（ねんざ）、  
腱鞘炎（手・手首・足首の痛みとはれ）、肘の痛み（テニス肘など）

◇その他記載事項◇



**【問合せ先】**

◇問合せ先書き◇

◇問合せ先名◇

大鵬薬品工業株式会社 お客様相談室

◇問合せ先住所◇

〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27

◇問合せ先電話◇

03-3293-4509

◇問合せ受付時間◇

9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

◇問合せ先に関する上記以外の記載内容◇

◇問合せ先メーカーHP名◇

◇問合せ先メーカーHPのURL◇

<http://www.taiho.co.jp/>

◇当該製品に関するWebページ名◇

◇当該製品WebページのURL◇

**【包装別共通商品（JAN）コード】**

43g 4987117372014

43g×10個×10箱 4987117372021

**【備考】**

264Z00A00032

eof（この「添付文書」の終わり）