

品牌名称: BUP-4 LADY

风险类别
第1类医药品

特征
BUP-4 LADY 是一种女性专用药物,
可控制膀胱异常收缩,
改善尿频和伴有尿急的尿失禁。

BUP-4 LADY 可以改善因膀胱过度活动症症状而受损的日常活动。



成分和数量
在 1 片中:

盐酸丙哌维林... 10 毫克

添加剂:
乳糖水合物、结晶纤维素、
羟丙基淀粉、羧甲基纤维素钙、
羟丙甲纤维素、滑石粉、聚乙二醇 6000、
氧化钛、硬脂酸镁和巴西棕榈蜡。

更多信息

制造商和分销商	大鹏药品工业株式会社
剂型	药片
包装单位	7 片
建议零售价	2,750 日元 (不含税 2,500 日元)
一月代码	4987117614008
截止日期	3 年

剂量和给药

成年女性 (15 岁及以上和 70 岁以下) 应每天饭后服用一粒。

年龄	单剂量	每 24 小时最大剂量
成年女性 (15 岁以上, 70 岁以下)	1	一次
成年女性 (70 岁以上)	不要拿	
成年男性 (15 岁及以上)		
小的 儿童 (15 岁以下)		

〈剂量及给药注意事项〉

- (1) 严格遵守剂量和给药方法。
- (2) 每次在同一时间服用这种药。
- (3) 取出药片的方法: 用指尖用力推动装有药片的 PTP 片的凸出部分, 使背面的铝箔破裂取出药片 (不慎吞下药片, 可能导致意外事故, 如将其粘在食道粘膜中)。

效能、效果

尿急 (抱怨无法忍受的小便冲动)、尿频 (尿频) 和尿失禁

储存和操作注意事项

- (1) 存放在阴凉潮湿的地方, 避免阳光直射。
- (2) 放在儿童接触不到的地方。
- (3) 请勿用其他容器替换本产品 (导致误用或改变质量)。
- (4) 不要服用超过保质期的产品。

到期日期列在外盒中。

如需查询, 请联系您购买产品的商店或以下人员。

联系人: 大鹏药品工业株式会社客户关系处
〒101-8444 1-27 东京都千代田区神田锦町 1-27
电话 0120-4527-66
受理时间 9:00-17:00 (周末及节假日除外)

制造和分销商

大鹏药品工业株式会社
1-27 东京都千代田区神田锦町

使用注意事项

应遵守以下预防措施。

(如果不观察, 当前症状可能会加重, 更可能发生不良反应和事件。)

1. 以下人员不应服用此药。

(1) 对这种药物或其成分有过敏反应的人

(2) 男性

(3) 70 岁以上的女性

(4) 15 岁以下儿童

(5) 怀孕或可能怀孕的妇女

(6) 有以下症状的人：

· 排尿困难, 尿潴留 (排尿困难, 即使需要也无法排尿)

· 血尿、排尿痛和膀胱痛

(7) 以下人员在医疗机构确诊：

· 胃疲劳 (与胃下垂相关的胃功能下降)、肠道疲劳 (排便减少)

· 幽门和肠道堵塞

· 帕金森病、脑血管病 (脑梗塞、脑出血等)

· 青光眼; 痴呆; 重症肌无力; 严重的心脏病

2. 服用本药时, 请勿服用以下药物。

胃镇痛药/解痉药; 其他含有莨菪提取物的胃肠道药物; 晕车药; 鼻炎口服药物; 感冒药

3. 服用此药后请勿驾驶汽车或操作机器。

(可能会出现嗜睡、视力模糊、异常头晕等症状。)

4. 母乳喂养的人不应服用该药或在服用该药时避免母乳喂养。

5. 不要长期服用这种药。

咨询事项

1. 以下人员服用本药前应咨询医生或药剂师。

- (1) 正在接受医生治疗的人。
- (2) 长者（65 岁以上）
- (3) 对任何药物有过敏反应的人。
- (4) 有以下症状的人：
 - 尿频或尿失禁的急性症状（发病后 1 个月内）。
 - 人只有夜间尿频，白天无尿频。
- (5) 被诊断患有心律失常、肝功能障碍、肾损伤、溃疡性结肠炎或甲状腺功能亢进症的人。
- (6) 有排尿困难、尿潴留、血尿、排尿痛或膀胱痛症状的人（仍有症状的人不应服用该药）。
- (7) 接受过盆腔手术的人，如子宫癌、直肠癌等。

2. 以下症状可能是该药的不良反应。如果服用该药后出现任何这些症状，请立即停止使用该药并携带此文件咨询您的医生或药剂师。

受影响的身体	症状
皮肤	皮疹/发红、瘙痒、荨麻疹
消化器官	食欲不振、恶心/呕吐、腹痛、消化不良、口腔炎
精神神经病	头痛、头晕、无力、麻木、双腿无力、步幅缩短、手脚颤抖、意识下降、定向障碍
循环器官	心悸、胸闷、血压升高、脉搏紊乱
泌尿器官	排尿困难和残留尿感
其他	口齿不清，舌痛，喉咙痛，声音嘶哑，味觉障碍，喉咙有痰，腰痛，眼干，光异常，水肿，全身不适。

3. 极少数情况下，服用该药后可能会出现以下严重症状。由于它们可能是不良反应，请立即停止使用该药物并使用本文件咨询医生。

症状名称	症状
尿潴留	一种痛苦的病症，患者有排尿的冲动但不能排尿。
幻觉、谵妄	感觉有些东西实际上并不存在，可能会出现注意力、认知和认知功能的恶化。
急性青光眼发作	可能会出现突然的恶心、眼睛疼痛和头痛、眼睛困难等。
麻痹性肠梗阻 (肠梗阻样症状)	腹痛剧烈，停气，呕吐，便秘明显，腹胀。
横纹肌溶解症	可出现手、足、肩、腰肌肉酸痛，手足麻木，力气不足，僵硬，全身不适，小便呈红褐色。
肾功能不全	可能会出现发烧、皮疹、尿量减少、全身水肿、全身不适、关节痛（关节痛）、腹泻等。
肝功能障碍	可能会出现发烧、瘙痒、皮疹、黄疸（皮肤和眼白发黄）、褐色尿液、全身不适、食欲不振等。
血小板减少症	由于作为血液成分的血小板数量减少，可能会出现流鼻血、牙龈出血、瘀伤等出血症状。
皮肤粘膜眼综合征 (史蒂文斯-约翰逊综合症)	高烧、眼睛发红、风湿、唇糜烂、喉咙痛、广泛的皮疹/发红等可能持续存在或迅速恶化。
QT 间期延长；室性心动过速	可能会出现头晕、心悸、胸痛、心率加快和意识丧失。

4. 服用该药后可能会出现以下症状。如果任何这些症状持续或加重，请停止使用该药并使用本文件咨询您的医生或药剂师。

口干、便秘、腹泻、嗜睡、眼睛模糊、暂时健忘

5. 如果使用该药物 2 周后症状没有改善，请停止使用该药物并持此文件咨询您的医生或药剂师。