

名称 ZENOL DICLODIRECT R		
风险类别 第2类医药品		
特征 【大范围涂抹肩痛和腰痛患处的大口径涂膏】 大口径涂膏药，可以大范围，充分地涂抹到肩部至颈部。请按住疼痛处和周围患处进行涂抹。旋转底部挤出“药剂”。请在挤出4～5mm后使用。 双氯芬酸钠1.0％配合 【方便使用的大口径涂膏】 充分地涂抹到腰痛和周边患处。大范围地涂抹到手臂和脚部肌肉。		
成分、含量 100g本品中 双氯芬酸钠 1.0g，L-薄荷醇 3.0g 作为添加物，含有硬脂酸钠、棕榈酸、1,3-丁二醇、异丙醇及其他两种成分。	详细信息	
	销售商	大鹏药品工业株式会社
	制造销售商	三笠制药株式会社
	剂型	硬凝胶剂
	包装单位	42gx1盒
	厂商建议零售价	2,024日圆（不含税 1,840日圆）
	JAN代码	4987117372601
	使用期限	3年
效能、效果 关节痛，伴有肩酸的肩痛，腱鞘炎（手和手腕疼痛），肘部疼痛（网球肘等），肌肉疼痛，腰痛，跌打损伤，扭伤	用法用量 3～4次/日， 取适量涂抹于患处。 请勿用保鲜膜等透气性差的材料覆盖在涂抹部位。另外，请勿同时使用含有本成分的其他外用药物。	
	[用法用量相关注意事项] （1）请严格遵照规定的用法用量。 （2）本品并非用于治疗引发疼痛和肿胀等的疾病，而是仅治疗疼痛和肿胀等症状的药品，因此仅限于在出现相关症状时使用。 （3）本品仅限于外用，请勿内服。 （4）每周用量不得超过50g。 （5）请注意避免本品进入眼睛。不慎入眼时，请立即用清水或温水冲洗。另外，当症状严重时，请接受眼科医生诊治。 （6）请勿在使用部位联用其他外用剂。 （7）请勿使用密封性差的物品（保护膜，矫正带等）覆盖或封住使用部位。 （8）请在擦除患处的汗渍后再开始使用。 （9）请将容器内的药品挤出4～5mm后再使用，避免容器直接接触患处。 （10）当可以看见药剂容器的底盘，且底盘上端露出时，请勿使用本品。请勿随意使用残留在底盘上的药剂。	
使用时的注意事项		
1. 下述人员在使用前请咨询医师、药剂师或登记销售人员。		

- # 新型喹诺酮类抗菌剂

〔相关部位〕

〔症状名称〕 〔症状〕

接触性皮炎、光线过敏症：可致涂抹部位有强烈瘙痒的发疹/发红，肿胀，刺激感，水疱，糜烂等剧烈的皮肤炎症状和色素沉淀，白斑，其中发疹/发红，瘙痒等症状可能遍布全身。而且，经过阳光照射的部位，症状可能出现或恶化。

三笠制药株式会社