

Brand Name: Pitas Cough Troche

RISK CATEGORIES

Second-class OTC drugs

CHARACTERISTICS

- A cough suppressant ingredient, dextromethorphan phenolphthalinate, acts on the cough center and controls painful coughs
- An expectorant, potassium guaiacolsulfonate, suppresses phlegm
- Can be taken without water
- A slim package makes it convenient to carry around



ACTIVE INGREDIENTS (In 6 troches)

Dextromethorphan Phenolphthalinate 60 mg
Potassium Guaiacolsulfonate 140 mg
Cetylpyridinium Chloride Hydrate 6 mg

[Inactive ingredients]: Hydroxypropylcellulose, Povidone, Pullulan, Macrogol, l-Menthol, Tannic Acid, D-Sorbitol, Sodium Saccharine, Sucrose Fatty Acid Ester, Sucralose, Sodium Copper Chlorophyllin, Flavor

For further information:

Manufactured by	TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Dosage form	Troche
Packaging unit	12 troches
Manufacturer's suggested retail price	JPY 770 (JPY 700 excluding tax)
JAN Code	45198625
Expiration date	3 years

DOSAGE AND ADMINISTRATION

Put the following dose in the mouth, and slowly dissolve without chewing.

Dose for Adults (15 years and over): 1 troche

Frequency of daily dosing: 6 times

Dosing interval: 2 hours or longer

Do not use for children under 15 years of age

<Precautions>

- (1) Strictly follow the dosing instructions.
- (2) Do not chew or swallow whole.

INDICATIONS

Cough

Phlegm

Throat pain, throat swelling, sore throat, throat discomfort, and hoarse voice due to throat inflammation

PRECAUTIONS FOR USE

The precaution should be observed.

(If not observed, it may aggravate the current symptoms or increase the risk of adverse reactions.)

1. The following persons should not take this medicine:

- Persons having a history of allergy to this product or any component of this product.

2. During use of this product, the following drugs may not be used.

Other antitussive expectorants, cold medicines, sedatives, oral-dose drugs containing antihistamine, and so on (oral-dose drugs for rhinitis, drugs for motion sickness, anti-allergy drugs, etc.)

Consultation

1. The following persons should consult a physician, pharmacist or registered salesperson before using this medicine.

- (1) Persons under treatment by a physician

- (2) Pregnant or possibly pregnant women
- (3) Persons having a history of allergy to drugs, etc.
- (4) Persons having any of the following symptoms: High fever

2. The following symptoms may be adverse reactions to the medicine. If any of these symptoms occur, discontinue the use of this medicine immediately, and consult a physician, pharmacist or registered salesperson with this leaflet.

Affected area	Skin	Gastrointestinal System	Neuropsychiatric System	Respiratory System
Symptoms	Eruption/redness, itching sensation	nausea/vomiting, anorexia	dizziness	dyspnea, shortness of breath

Although rarely, the following serious symptoms may appear. In such an event, immediately consult a physician.

Symptom name	Features
Shock (anaphylaxis)	Immediately after intake of the product, there may appear an itching sensation, urticaria, hoarse voice, sneezing, throat pruritus, dyspnea, palpitation, consciousness clouding, etc

3. If the symptoms do not improve after using the medicine for 5-6 times, discontinue the use of this medicine, and consult a physician, pharmacist or registered salesperson with this leaflet.

名称 ピタスせきトローチ

リスク区分
第2類医薬品

特徴

- ・ 鎮咳成分であるフェノールフタリン酸デキストロメトルファンが咳中枢にはたらい、つらい咳を抑える
- ・ 去たん成分であるグアヤコールスルホン酸カリウムがたんを抑える
- ・ 水なしで服用できる
- ・ スリムな形状でかさばらず、携帯に便利
- ・ 眠くなる成分が入っていない



成分・分量（6個中）

フェノールフタリン酸デキストロメトルファン 60mg
グアヤコールスルホン酸カリウム 140mg
セチルピリジニウム塩化物水和物 6mg

[添加物]

ヒドロキシプロピルセルロース、ポビドン、プルラン、マクロゴール、l-メントール、タンニン酸、D-ソルビトール、サッカリンNa、シヨ糖脂肪酸エステル、スクラロース、銅クロロフィリンNa、香料

詳細情報

販売元	大鵬薬品工業株式会社
製造販売元	救急薬品工業株式会社
剤形	トローチ
包装単位	12個
メーカー希望小売価格	700円（税抜）
JANコード	45198625
賞味期限	3年

用法・用量

次の量を口中に含み、かまずにゆっくり溶かして使用すること。

年齢	1回量	1日使用回数	使用間隔
成人 (15歳以上)	1個	6回	2時間以上

15歳未満 使用しないこと。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること。
- (2) かんだり、のみこんだりしないこと。

効能・効果

せき、たん、のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ

使用上の注意・してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。高熱

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	皮膚	消化器	精神神経系	呼吸器
症状	発疹・発赤、かゆみ	吐き気・嘔吐、食欲不振	めまい	息苦しさ、息切れ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6回使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

명칭 피타스 기침 트로키

위험 카테고리
카테고리 2 의약품

특징

- 기침 억제제 성분 인 덱스 트로 메 토르 판 페놀 프 탈리 네이트는 기침 센터에 작용하여 고통스러운 기침을 조절합니다
- 거담제 칼륨 과이 아콜 솔포 네이트는 가래를 억제합니다
- 물없이 섭취 가능
- 슬림 한 패키지로 휴대가 편리
- 졸음을 유발하지 않습니다



성분 및 함량 성분 함량(6 개 당)
페놀프탈린산 덱스트로메트로판 60mg
과이어콜술폰산칼륨 140mg
세틸피리디늄염화물수화물 6mg

첨가물:

히드록시프로필셀룰로오스, 포비돈, 플루란, 마크로골, l-멘톨, 탄닌산, D-솔비톨, 사카린나트륨, 자당지방산에스터, 수크랄로스, 동클로로필린나트륨, 향료

상세 정보

판매원	다이호 약품공업 주식회사
제조판매원	규규 약품공업 주식회사
제형	트로키
포장 단위	12 개
제조사 희망 소비자 가격	700 엔(부가세 별도)
JAN 코드	45198625
유통기한	3 년

용법 및 용량

지시 된 복용량을 입에 넣고 천천히 씹지 않고 녹입니다.

연령	1 회 용량	1 일 사용 횟수	1 일 사용 횟수
성인 (15 세 이상)	1 개	6 회	2 시간 이상

15 세 미만은 사용하지 말 것.

<용법 및 용량 관련 주의사항>

- (1) 규정된 용법과 용량을 엄수할 것.
- (2) 씹거나 삼키지 말 것.

효능 및 효과

기침
가래
목의 염증에 의한 목의 통증, 부종, 칼칼함,
불쾌감, 목이 쉬

사용상의 주의사항 금기

(지키지 않으면 현재 증상이 악화하거나 부작용이 발생하기 쉬워진다.)

1. 다음 사람은 사용하지 말 것

이 약 또는 이 약의 성분에 의해 알레르기 증상이 나타난 적이 있는 사람.

2. 이 약을 사용하는 동안에는 다음 중 어떤 의약품도 사용하지 말 것

다른 진해거담제, 감기약, 진정제, 항히스타민제를 포함한 내복약 등(비염용 내복약, 멀미약, 알레르기용 약 등)

상담이 필요한 경우

1. 다음과 같은 사람은 사용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 사람.
- (2) 임신 중이거나 임신하고 있을 가능성이 있는 사람.
- (3) 약에 의해 알레르기 증상이 나타난 적이 있는 사람.
- (4) 다음 증상이 나타난 사람. 고열

2. 사용 후 다음 증상이 나타난 경우는 부작용 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중지하고, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것

관계 부위	피부	소화기	정신신경계	호흡기
증상	발진, 발적, 가려움	구역질, 구토, 식욕부진	현기증	답답함, 숨이 참

다음의 위독한 증상이 간혹 발생하는 경우가 있다. 그런 경우는 즉시 의사의 진료를 받을 것.

증상의 명칭	증상
쇼크 (아나필락시)	사용 후 즉시 피부의 가려움, 두드러기, 목이 씹, 재채기, 간지러움, 답답함, 동계(두근거림), 의식의 혼탁 등이 나타난다.

3. 5~6 회 사용해도 증상이 개선되지 않는 경우 사용을 중지하고 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것

名称 PITAS 咳嗽含片

风险类别
第 2 类医药品

特点

- 咳嗽抑制剂成分右美沙芬酞酸盐作用于咳嗽中枢并控制疼痛性咳嗽
- 祛痰，愈创木酚磺酸钾，抑制痰
- 可以不用水服用
- 纤巧的包装使携带方便
- 不会引起嗜睡



成分、含量（每 6 粒中）

邻苯二甲酸右美沙芬 60mg

愈创木酚磺酸钾 140mg

十六烷基氯化吡啶单水合物 6mg

辅料：羟丙基纤维素，聚维酮，普鲁兰多糖，聚乙二醇，L-薄荷醇，单宁酸，D-山梨醇，糖精钠，蔗糖脂肪酸酯，三氯蔗糖，叶绿酸铜钠，香料

详细信息

销售商	大鹏药品工业株式会社
制造销售商	救急药品工业株式会社
剂型	含片
包装单位	12 粒
厂商建议零售价	700 日元（不含税）
JAN 代码	45198625
有效期限	3 年

用法用量

将指定剂量放入口中，慢慢溶解，不要咀嚼。

年龄	1 次量	1 日使用次数	使用间隔
成人 (15 岁以上)	1 粒	6 次	2 小时以上

未满 15 岁禁止使用。

(用法用量的注意事项)

- (1) 严格遵照规定的用法用量。
- (2) 不得咀嚼或吞服。

适应症

咳嗽

痰

喉部炎症等引起的喉痛，喉干，喉部不适，声音嘶哑

使用注意事项 禁止事项

(如不遵守可能导致当前症状恶化，或容易出现不良反应)

1. 下述人群禁止使用

因本品或本品成分等引起过敏症状的人

2. 使用本品期间，请勿使用下述任一种药品

其他镇咳祛痰药，感冒药，镇静药，含欧组胺剂的内服药等（鼻炎用内服药，晕车药，过敏药等）

咨询事项

1. 下述人员在使用前请咨询医生，药剂师或注册销售员

- (1) 正在接受医生治疗的人。
- (2) 孕妇或可能怀孕的妇女。
- (3) 有过药物等引起过敏症状的人。
- (4) 患有下述症状的人：高烧

2. 使用后，如出现下述症状则可能是本品引起的不良反应，请立即停止使用，持本说明书向医生，药剂师或者注册销售员咨询。

相关部位	皮肤	消化器官	精神神经系统	呼吸器官
症状	发疹/发红，瘙痒	暖气/呕吐，食欲不振	眩晕	呼吸困难，气喘

偶见下述严重症状。如出现这些症状，请立即就医。

症状名称	症状
休克 (过敏反应)	使用后可能即刻出现皮肤瘙痒，荨麻疹，声音嘶哑，打喷嚏，喉部瘙痒，呼吸困难，心悸，意识混乱等症状。

3. 使用 5~6 次后症状仍未缓解时，请暂停使用，持本说明书咨询医生，药剂师或者注册销售员。

名稱 PITAS 咳嗽口含錠

風險類別
第 2 類醫藥品

特色

- 咳嗽抑制劑成分右美沙芬酚酞酸鹽作用於咳嗽中樞並控制疼痛性咳嗽
- 祛痰·癒創木酚磺酸鉀·抑制痰
- 可以不用水服用
- 纖巧的包裝使攜帶方便
- 不會引起嗜睡



成分 / 份量 (6 個中)

鄰苯二甲酸右美沙芬 60mg
鄰一甲氧基酚磺酸鉀 140mg
氯化十六烷基吡啶水合物 6mg

添加物：羥丙基纖維素，聚維酮，茁微多糖，聚乙烯二醇，L-薄荷醇，單寧酸，D-山梨糖醇，糖精鈉，蔗糖油酸酯，三氯蔗糖，銅葉綠素鈉，香料

詳細資料

總經銷	大鵬藥品工業株式會社
製造總經銷	救急藥品工業株式會社
劑型	口含錠
包裝單位	12 粒
製造商建議售價	700 日圓 (未稅)
JAN 碼	45198625
有效期限	3 年

用法與用量

將指定劑量放入口中，慢慢溶解，不要咀嚼。

年齡	1 次量	1 日使用次數	使用間隔
成人 (15 歲以上)	1 粒	6 次	2 小時以上

未滿 15 歲請勿使用。

〈用法與用量注意事項〉

- (1) 請嚴格遵照規定的用法與用量。
- (2) 請勿咬碎或直接吞服。

效能與效果

咳嗽

咳痰

喉嚨發炎造成的喉嚨疼痛，喉嚨腫脹，喉嚨沙啞，喉嚨不舒服感或聲音嘶啞

使用須知之禁止事項

(若未遵守，容易造成現有症狀惡化，產生副作用)

1. 以下情況者，請勿使用

曾經因本劑或本劑成分引起過敏症狀者。

2. 使用本劑時，請勿使用以下任一種藥品

其他止咳去痰藥，感冒藥，鎮定劑，含抗組織胺劑內服藥等 (鼻炎用內服藥，暈車藥，過敏用藥等)

諮詢事項

1. 以下情況者，請於使用前向醫師，藥劑師或登記經銷商諮詢

- (1)正在接受醫師治療者。
- (2)孕婦或可能懷孕中。
- (3)曾因藥物等而引起過敏症狀者。
- (4)出現以下症狀者：發高燒

2. 使用後，有可能出現以下症狀的副作用，此時立即停用，並攜帶本說明書向醫師，藥劑師或登記經銷商諮詢。

相關部位	皮膚	消化系統	精神神經系統	呼吸道
症狀	出疹, 發紅, 發癢	噁心, 嘔吐, 食慾不振	眩暈	呼吸困難, 呼吸急促

極少數可能出現以下的嚴重症狀。如出現這些症狀，請立即就醫接受治療。

症狀名稱	症狀
休克 (嚴重過敏反應)	使用後立即出現皮膚發癢，蕁麻疹，聲音嘶啞，打噴嚏，喉嚨發癢，呼吸困難，心悸，意識模糊等。

3. 使用 5~6 次後症狀仍未改善時，請停用並攜帶本說明書向醫師，藥劑師或登記經銷商諮詢。


名称 チオビタ®・ドリンク

リスク区分
指定医薬部外品

特徴

●ビタミン含有保健剤

- ・「疲れた体に愛情 1 本」でお馴染みの栄養ドリンク！
- ・有効成分タウリン 1000mg、ビタミン B 群、カルニチン塩化物を配合
- ・飲みやすい「ミックスフルーツ風味」
- ・気になるカロリーは「70kcal」



成分・分量

1 本 100mL 中
タウリン 1000mg、イノシトール 50mg、ニコチン酸アミド 20mg、チアミン硝化物（ビタミン B 1）5mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミン B 2）5mg、ピリドキシン塩酸塩（ビタミン B 6）5mg、カルニチン塩化物 100mg、無水カフェイン 50mg

添加物：果糖ブドウ糖液糖、DL-リンゴ酸、没食子酸プロピル、安息香酸 Na、pH 調整剤、クエン酸、クエン酸 Na、D-ソルビトール、バニリン、エチルバニリン、香料
●本剤に配合されているビタミン B 2 により、尿が黄色になることがありますが、心配ありません。

効能・効果

- 疲労の回復・予防
- 日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防
 - ◇疲れやすい、疲れが残る、体力がない、身体が重い、身体がだるい
- 体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善
- 病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

詳細情報

販売元	大鵬薬品工業株式会社				
剤形	液剤				
包装単位	100mLx1 本	100mLx2 本	100mLx3 本	100mLx10 本	100mLx50 本
メーカー希望小売価格	146 円	292 円	438 円	1460 円	7300 円
JAN コード	4987117438710	4987117438956	4987117438918	4987117438741	4987117438802
賞味期限	3 年				

用法・用量

成人（15 歳以上）1 日 1 回 1 本（100mL）を服用して下さい。

- 小児（15 歳未満）は服用しないで下さい。
- 用法・用量を守って下さい（他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意して下さい）。

使用上の注意

■相談すること

1. 服用後、皮膚に発疹があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

2. 服用後、下痢があらわれることがあるので、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

3. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。