

브랜드 이름: BUP-4 LADY																																
위험 범주 지도가 필요한 약물 특징 BUP-4 LADY는 방광의 이상수축을 조절하여 요절박을 동반한 빈뇨 및 요실금을 개선하는 여성전용제입니다. BUP-4 LADY는 과민성 방광 증상으로 인해 손상된 일상 활동을 개선할 수 있습니다.																																
성분 및 수량 1 태블릿에서: 프로피베린 염산염..... 10 mg 첨가제: 유당수화물, 결정성셀룰로오스, 하이드록시프로필 전분, 카멜로스 Ca, 하이프로멜로스, 활석, 마크로골 6000, 산화티타늄, 스테아르산마그네슘, 카나우바 왁스.	추가 정보 <table><tr><td>제조업체 및 유통업체</td><td colspan="2">다이호 약품공업 주식회사</td></tr><tr><td>투여 형태</td><td colspan="2">정제</td></tr><tr><td>포장단위</td><td colspan="2">7 정</td></tr><tr><td>권장 소매 가격</td><td colspan="2">JPY 2,750(JPY 2,500 세금 별도)</td></tr><tr><td>JAN 코드</td><td colspan="2">4987117614008</td></tr><tr><td>만료일</td><td colspan="2">3년</td></tr></table> 복용량 및 투여 성인 여성(15 세 이상 70 세 미만)은 1 일 1 회 식후에 1 정을 섭취하십시오. <table><tr><th>연도 나이</th><th>단일 복용량</th><th>24 시간당 최대 복용량</th></tr><tr><td>성인 여성(15 세 이상, 70 세 미만)</td><td>1 정</td><td>한 번</td></tr><tr><td>성인 여성(70 세 이상)</td><td colspan="2" rowspan="3">복용하지 마십시오</td></tr><tr><td>성인 남성(15 세 이상)</td></tr><tr><td>작은 어린이(15 세 미만)</td></tr></table> <지침> (1)용량 및 투여량을 엄격히 준수하십시오. (2)이 약을 매번 같은 시간에 복용하십시오. (3)정제 꺼내, 방법: 정제가 들어 있, PTP 시트의 불록한 부분을 손가락 끝으로 세게 눌러 뒷면의 알루미늄 호일을 깨뜨리고 정제를 꺼냅니다. 식도 점막에 붙이기).			제조업체 및 유통업체	다이호 약품공업 주식회사		투여 형태	정제		포장단위	7 정		권장 소매 가격	JPY 2,750(JPY 2,500 세금 별도)		JAN 코드	4987117614008		만료일	3년		연도 나이	단일 복용량	24 시간당 최대 복용량	성인 여성(15 세 이상, 70 세 미만)	1 정	한 번	성인 여성(70 세 이상)	복용하지 마십시오		성인 남성(15 세 이상)	작은 어린이(15 세 미만)
제조업체 및 유통업체	다이호 약품공업 주식회사																															
투여 형태	정제																															
포장단위	7 정																															
권장 소매 가격	JPY 2,750(JPY 2,500 세금 별도)																															
JAN 코드	4987117614008																															
만료일	3년																															
연도 나이	단일 복용량	24 시간당 최대 복용량																														
성인 여성(15 세 이상, 70 세 미만)	1 정	한 번																														
성인 여성(70 세 이상)	복용하지 마십시오																															
성인 남성(15 세 이상)																																
작은 어린이(15 세 미만)																																
보관 및 취급상의 주의사항 (1)열, 습기 및 직사광선을 피해 보관하십시오. (2)영유아의 손이 닿지 않, 곳에 보관하십시오. (3)이 제품을 다른 용기로 교체하지 마십시오(오용의 원인이 되거나 품질이 변경됨). (4)유통 기한이 지난 제품을 복용하지 마십시오. 만료 날짜, 외부 상자에 나열되어 있습니다. 문의사항은 제품을 구매하신 매장 또, 아래로 연락주세요. 연락처: 다이호 약품공업 주식회사 〒101-8444 1-27 도쿄도 지요다구 간다 니시키토 1-27 전화번호 0120-4527-66 접수시간 9:00-17:00 (주말 및 공휴일 제외) 제조 및 유통업체 다이호 약품공업 주식회사 1-27 도쿄도 지요다구 간다 니시키토																																

사용상의 주의

다음 주의사항을 준수해야 합니다.

(지키지 않으면 현재의 증상을 악화시킬 수 있으며, 이상반응 및 사건이 발생할 가능성이 높아집니다.)

1. 다음 사람은 이 약을 복용해서 ✖ 안됩니다.

(1) 이 약 또 ✖ 그 성분으로 인해 알레르기 반응을 일으킨 적이 있 ✖ 사람

(2) 남성

(3) 70 세 이상의 여성

(4) 15 세 미만의 어린이

(5) 임산부 또 ✖ 임신 가능성이 있 ✖ 여성

(6) 다음과 같은 증상이 있 ✖ 사람:

- 배뇨곤란, 요저류(배뇨 곤란, 배뇨가 필요한데도 소변을 볼 수 없음)
- 혈뇨, 배뇨통, 방광통

(7) 의료기관에서 다음 각 호의 진단을 받은 자

- 위무력증(Gastroptosis 와 관련된 위 기능 감소), 장무력증(장의 운동성 감소)
- 유문 및 장관의 막힘
- 파킨슨병, 뇌혈관질환(뇌경색, 뇌출혈 등)
- 녹내장; 백치; 중증 근무력증; 심각한 심장병

2. 이 약을 복용하 ✖ 동안 다음 약을 복용하지 마십시오.

위장에 대한 진통/진경제; 스코폴리아 추출물을 함유한 기타 위장약; 멀미약; 비염에 대한 경구 약물; 감기약

3. 이 약을 복용한 후에 ✖ 자동차를 운전하거나 기계를 조작하지 마십시오.

(졸음, 시야흐림, 이상 현기증 등의 증상이 나타날 수 있습니다.)

4. 수유 중인 사람은 이 약을 복용하지 않거나 이 약을 복용하 ✖ 동안 수유를 피해야 합니다.

5. 이 약을 장기간 복용하지 마십시오.

상의

1. 다음 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사 또 약사와 상의해야 합니다.

(1) 의사의 치료를 받고 있 사람.

(2) 고령자(65 세 이상)

(3) 어떤 약물로 인해 알레르기 반응을 경험한 사람.

(4) 다음과 같은 증상이 있 사람:

- 빈뇨 또 요실금의 급성 증상(발현 후 1 개월 이내).
- 야행성만 있고 낮에 소변을 자주 보지 않 사람.

(5) 부정맥, 간기능장애, 신장애, 궤양성대장염 또 갑상선기능항진증 진단을 받은 사람.

(6) 배뇨곤란, 요폐, 혈뇨, 배뇨통 또 방광통 증상이 있었던 사람(아직 증상이 있 사람은 이 약을 복용해서 안 된다).

(7) 자궁암, 직장암 등으로 골반 수술을 받은 사람

2. 다음 증상은 이 약의 이상반응일 수 있습니다. 이 약을 복용한 후 이러한 증상이 나타난 경우에 즉시 사용을 중지하고 이 문서를 가지고 의사 또 약사와 상의하십시오.

영향을받	증상
피부	발진/발적, 가려움, 두드러기
소화기	식욕부진, 구역/구토, 복통, 소화불량, 구내염
정신 신경증	두통, 현기증, 쇠약감, 저림, 다리 쇠약, 보폭 감소, 손발 떨림, 의식 감소 및 방향 감각 상실
순환기	두근거림, 가슴 통증, 혈압 상승, 맥박 장애
비뇨기관	배뇨곤란 및 잔뇨감
다른	어눌한 언어, 혀의 통증, 인후통, 쉼 목소리, 미각 장애, 인후 가래, 요통, 안구 건조, 밝기 이상, 부종, 전신 권태감.

3. 드물게 이 약을 복용한 후 다음과 같은 심각한 증상이 나타납니다. 이상반응이 나타날 수 있으므로 즉시 이 약의 사용을 중지하고 이 문서를 가지고 의사와 상담하십시오.

증상의 이름	증상
요폐	소변을 보고 싶지만 소변을 볼 수 없 고통스러운 상태입니다.
환각, 섬망	실제로 존재하지 않 무언가가 있다 느낌이 들고 주의력, 인지력, 인지 기능의 저하가 나타날 수 있습니다.
급성 녹내장 발작	갑작스러운 메스꺼움, 두통을 동반한 눈의 통증, 눈의 피로 등이 나타날 수 있습니다.
마비 성 장폐색 (장폐색과 유사한 증상)	심한 복통, 가스 배출 중단, 구토 및 복부 팽만감을 동반한 상당한 변비가 나타납니다.
횡문근 용해증	손, 발, 어깨, 허리의 근육통, 손발의 저림, 힘의 부족, 뻣뻣함, 전신 권태감, 적갈색 소변 등이 나타날 수 있습니다.
신장 기능 장애	발열, 발진, 소변량 감소, 전신부종, 전신 권태감, 관절통(관절통), 설사 등이 나타날 수 있다.
간 기능 장애	발열, 가려움, 발진, 황달(피부와 눈의 흰자위가 노랗게 변함), 갈색뇨, 전신 권태감, 식욕 부진 등이 나타날 수 있다.
혈소판 감소	혈액을 구성하 혈소판 수가 감소하여 코피, 잇몸출혈, 타박상 등의 출혈 증상이 나타날 수 있습니다.
피부 점막 안 증후군 (스티븐스-존슨 증후군)	고열, 적목 현상, 류머티즘, 입술 미란, 인후통, 피부의 넓은 부위의 발진/발적 등이 지속되거나 급격히 악화될 수 있습니다.
QT 연장; 심실 빈맥	현기증, 심계항진, 흉통, 심박수 증가 및 의식 상실이 발생할 수 있습니다.

4. 이 약을 복용한 후 다음과 같은 증상이 나타날 수 있습니다. 이러한 증상이 지속되거나 증가하 경우에 이 약의 사용을 중지하고 이 문서를 가지고 의사 또 약사와 상의하십시오.

구강건조, 변비, 설사, 졸음, 눈의 흐림, 일시적 건망증

5. 이 약을 2 주간 사용해도 증상이 개선되지 않 경우에 사용을 중지하고 이 문서를 가지고 의사 또 약사와 상의한다.