

명칭 ZENOL DICLODIRECT R																
위험 카테고리 제2류의약품 특징 [심한 어깨 및 허리 통증에 바를 수 있는 굵은 타입의 스틱] 굵은 타입의 스틱이라서 어깨에서 목덜미까지 넓은 부위를 확실하게 바를 수 있습니다. 통증과 그 주변의 환부를 지긋이 누르면서 바르십시오. 아래 부분을 돌리면 《약제》가 나옵니다. 4~5mm 정도 꺼내서 사용하십시오. 다이클로페낙 나트륨 1.0% 배합[이런 때 사용하기 쉬운 굵은 타입의 스틱] 허리의 통증과 주변 환부에 확실하게 바를 수 있습니다. 팔과 다리 근육의 통증에 넓게 바를 수 있습니다.																
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">상세 정보</td></tr> <tr> <td>판매원</td><td>다이호 약품공업 주식회사</td></tr> <tr> <td>제조판매원</td><td>미카사 제약주식회사</td></tr> <tr> <td>제형</td><td>스틱제</td></tr> <tr> <td>포장 단위</td><td>42gx1 상자</td></tr> <tr> <td>제조업체 권장 소매 가격</td><td>2,024 엔 (세금 별도1,840 엔)</td></tr> <tr> <td>JAN 코드</td><td>4987117372601</td></tr> <tr> <td>사용기한</td><td>3년</td></tr> </table> 용법 및 용량 1일 3~4회 적당량을 환부에 바르십시오. 단, 약을 바른 부위를 비닐랩 등 통기성이 없는 것으로 감싸지 마십시오. 또한, 본 성분을 포함한 다른 외용제를 병용하지 마십시오. <용법 및 용량 관련 주의사항> (1) 정해진 용법 및 용량을 엄수하십시오. (2) 이 약은 통증이나 부종 등의 원인이 된 질병을 치료하지 않고 통증이나 부종 등의 증상만을 치료하는 약제이므로 증상이 있는 경우에만 사용하십시오. (3) 이 약은 외용제로만 사용하고 내복하지 마십시오. (4) 1주당 50g을 초과하여 사용하지 마십시오. (5) 눈에 들어가지 않도록 주의하십시오. 만일, 눈에 들어간 경우는 바로 물 또는	상세 정보		판매원	다이호 약품공업 주식회사	제조판매원	미카사 제약주식회사	제형	스틱제	포장 단위	42gx1 상자	제조업체 권장 소매 가격	2,024 엔 (세금 별도1,840 엔)	JAN 코드	4987117372601	사용기한
상세 정보																
판매원	다이호 약품공업 주식회사															
제조판매원	미카사 제약주식회사															
제형	스틱제															
포장 단위	42gx1 상자															
제조업체 권장 소매 가격	2,024 엔 (세금 별도1,840 엔)															
JAN 코드	4987117372601															
사용기한	3년															
효능 및 효과 관절통, 어깨 결림을 수반하는 어깨의 통증, 건초염(손, 손목의 통증), 팔꿈치의 통증(테니스 엘보 등), 근육통, 요통, 타박상, 염좌	미지근한 물로 씻어내십시오. 증상이 심한 경우에는 안과 의사의 진료를 받으십시오. (6) 사용 부위에 다른 외용제를 병용하지 마십시오. (7) 통기성이 나쁜 것(비닐랩, 교정 벨트 등)으로 사용 부위를 덮거나 감싸지 마십시오. (8) 환부의 땀을 닦아낸 후에 사용하십시오. (9) 용기가 직접 환부에 닿지 않도록 용기 안의 약제를 4~5mm 꺼낸 후에 사용하십시오. (10) 약제 바닥의 받침 접시 부분이 보이고 접시 윗면이 노출되면 그만 사용하십시오. 받침 접시에 남은 약제를無理해서 사용하지 마십시오.															

사용상의 주의사항

1. 다음 사람은 사용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상의하십시오.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 사람
- (2) 약 등에 의해 알레르기 증상이 나타난 적이 있는 사람
- (3) 다음 의약품을 투여 받고 있는 사람

뉴퀴놀론계 항균제

2. 사용 후 다음 증상이 나타난 경우는 부작용 가능성이 있으므로 즉시 사용을 중지하고 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

[관련 부위] [증상]

피 부: 발진, 발적, 가려움, 알레르기성 피부염, 부종, 통증, 자극, 열감, 피부가 거칠어짐,

낙설(비듬, 각질 등의 피부 벗겨짐), 물집, 색소침착

다음의 위독한 증상이 간혹 발생하는 경우가 있습니다. 그런 경우는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

[증상의 명칭] [증상]

쇼크(아나필락시): 약을 바른 후 바로 가려움, 두드러기, 목이 쉼, 재채기,

목의 가려움, 호흡 곤란, 두근거림, 의식 혼탁 등이 나타납니다.

접촉성 피부염, 광선과민증: 약을 바른 부위에 심한 가려움을 수반하는 발진, 발적, 부종, 자극, 물집,

진무름 등 심한 피부염 증상과 색소침착, 백반이 나타나고,

그 중에는 발진, 발적, 가려움 등의 증상이 전신으로 번질 수 있습니다.

또한, 직사광선에 노출된 부위에서 증상이 나타나거나

악화할 가능성이 있습니다.

3. 5~6일정도 사용해도 증상이 개선되지 않는 경우 사용을 중지하고 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

문의처

이 제제에 관하여 궁금하신 점이 있으시다면 구매하신 가게 혹은 아래 연락처로 문의해 주시기 바랍니다.

판매원 연락처 다이호 약품 공업 주식회사 고객상담실

우편번호 101-8444 도쿄도 치요다구 간다니시키초 1-27

전화번호 0120-4527-66 접수시간 9:00 ~ 17:00 (토, 일, 공휴일 제외)

홈페이지 <https://www.taiho.co.jp/>

제조판매원

미카사 제약 주식회사