

명칭 ZENOL XUM Liquid

위험 카테고리  
카테고리2 의약품

특징

- 외용 진통소염약
- 펠비낙이 어깨와 허리의 통증을 완화
- 몸체가 길고 바르는 면이 넓다
- 점도가 높은 겔 상태이므로 쉽게 흘러내리지 않는다
- 바르는 느낌이 부드러우며 마른 후에 끈적거리지 않는다
- 냄새가 신경 쓰이지 않는다



성분 및 분량  
100g 중

성분	함량
펠비낙	3.0g
l-멘톨	2.0g

첨가물로서 하이드록시프로필셀룰로스, 폴리옥실경화피마자유, 향료, 트리에탄올아민, 알코올을 함유하고 있습니다.

효능 및 효과

어깨 결림에 따른 어깨의 통증, 요통, 근육통, 관절통, 타박, 염좌, 건초염(힘줄윤활막염), 팔꿈치의 통증(테니스 엘보 등)

상세 정보

판매원	다이호 약품공업 주식회사
제조 판매원	미카사 제약 주식회사
제형	겔제
포장 단위	52mLx1상자
제조업체 권장 소매 가격	1,898 엔 (세금 별도1,725 엔)
JAN 코드	4987117372304
사용 기한	3년

용법 및 용량

1일 2~4회 적당량을 환부에 바르십시오.

[용법 및 용량에 관한 주의사항]

- (1) 스펀지 면이 찢어질 우려가 있으므로 사용하실 때는 스펀지 면에 액이 충분히 적셔져 있는지 확인한 후에 바르십시오.
- (2) 용법과 용량을 반드시 지켜 주십시오.
- (3) 눈에 들어가지 않도록 주의하십시오. 만일 눈에 들어간 경우에는 바로 찬물 또는 미지근한 물로 씻어내십시오. 증상이 심한 경우에는 안과 의사의 진찰을 받으십시오.
- (4) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 마십시오.
- (5) 이 약을 바른 후, 환부를 랩 등과 같이 통기성이 나쁜 것으로 덮지 마십시오.

사용상의 주의사항

금기

(지키지 않으면 현재 증상이 악화되거나 부작용이 발생하기 쉬워집니다.)

1. 다음에 해당하는 사람은 사용하지 마십시오.

- (1) 이 약 또는 이 약의 성분에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.
- (2) 천식을 앓은 적이 있는 사람.
- (3) 임신부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 사람.
- (4) 15세 미만의 소아

2 다음 부위에는 사용하지 마십시오.

- (1) 눈 주변, 점막 등
- (2) 습진, 짓무름, 상처
- (3) 무좀, 백선 등 또는 화농성 환부

신중투여

1. 다음에 해당하는 사람은 사용 전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 사람
- (2) 약 등으로 인해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람

2. 사용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 사용을 중지하고 이 설명서를 가지고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

관련 부위	증상
피부	발진·발적, 가려움증, 부종, 따끔거림, 짓무름

간혹 아래와 같은 심각한 증상을 일으키는 경우가 있습니다. 그러한 경우는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

증상의 명칭	증상
쇼크(아나필락시스)	사용 후 바로 피부의 가려움증, 두드러기, 목이 쉼, 재채기, 목 간지러움, 호흡 곤란, 두근거림, 의식 혼탁 등이 나타납니다.

3. 1주일간 사용해도 증상이 개선되지 않는 경우는 사용을 중지하고 이 설명서를 가지고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

문의처

이 제제에 관하여 궁금하신 점이 있으시다면 구매하신 가게 혹은 아래 연락처로 문의해 주시기 바랍니다.

연락처 다이호 약품 공업 주식회사 고객상담실  
우편번호 101-8444 도쿄도 치요다구 간다니시키초 1-27  
전화번호 0120-4527-66  
접수시간 9:00 ~ 17:00 (토, 일, 공휴일 제외)  
홈페이지 <https://www.taiho.co.jp/>

제조 판매원  
미카사 제약 주식회사