명칭 Henseki 위험 카테고리 카테고리2 의약품 특징 ● 불필요한 지방을 줄이는 의약품 배합된 11종류의 생약이 복부 지방뿐만 아니라 몸 전체의 불필요한 지방을 줄여줍니다. 편작에 포함된 생약은 대소변과 혈중 노폐물, 수분 등을 몸 밖으로 배출하거나 신진대사를 활발하게 하는 작용을 합니다. ● 체질에 상관 없이 복용 가능 편작은 독자적인 처방전에 따라 조제된 생약 제제. 체질에 상관 없이 복용할 수 있으므로 불필요한 지방을 줄이고 싶으신 분께 권장합니다. ● 무첨가 천연 생약만으로 제조하고 있으므로 첨가물을 포함하고 있지 않습니다.							
성분 및 분량 이 약의 3포(6g) 중 아래의 생약을 함유하고 있습니다.				상세 정보			
				판매원		다이호 약품공업 주식회사	
벗풀 분말 ...0.86g		대황 분말 ...0.43g		제조 판매원		주식회사 타테바야시 쇼카쿠도	
생강 분말 ...0.43g		감초 분말 ...0.43g		제형		가루약	
계피 분말 ...0.43g		작약 분말 ...0.43g		포장 단위		2gx21포 2gx60포	
모란피 분말 ...0.43g		저령 분말 ...0.86g		제조업체 권장 소매 가격		2,404 엔 (세금 별도, 2,185 엔) 6,072 엔 (세금 별도, 5,520 엔)	
시호 분말 ...0.86g		반하 분말 ...0.43g		JAN 코드		4987117670448 4987117670417	
승마 분말 ...0.43g				사용 기한		5년	
첨가물은 함유되어 있지 않습니다. (성분 및 분량에 관한 주의사항) 이 약은 생약을 원료로 제조하였으므로 제품의 색과 맛 등에 다소 차이가 발생할 수 있으나, 품질에는 이상이 없습니다.				용법 및 용량 식간에 찬물 또는 따뜻한 물과 함께 복용합니다.			
				연령		1회 기준량	
				성인(16세 이상)		1포	
				7~15세		1/2포	
				7세 미만		복용하지 마십시오.	
효능 및 효과 지방과다증				식간이란 식사와 식사 사이를 의미하는 것으로 식후 2~3시간을 가리킵니다. [용법 및 용량에 관한 주의사항] 소아가 복용하는 경우는 보호자의 지도 감독 하에 복용하게 하십시오.			
사용상의 주의사항 금기 (지키지 않으면 현재 증상이 악화되거나 부작용이 발생하기 쉬워집니다) 수유 중인 사람은 이 약을 복용하지 않거나, 이 약을 복용하는 경우는 수유를 중단하십시오.							

신중투여

1. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 사람
- (2) 임신부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 사람
- (3) 몸이 허약한 사람(체력이 떨어진 사람, 몸이 약한 사람)
- (4) 위장이 약해 설사를 자주 하는 사람
- (5) 지금까지 약 등으로 인해 발진·발적, 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람
- (6) 다음과 같은 의약품을 복용하고 있는 사람

설사약

2. 복용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중지하고 이 설명서를 가지고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

관련 부위	증상
피부	발진·발적, 가려움증
소화기	심한 복통을 수반하는 설사, 복통, 변비, 구역질·구토
기타	부기(부종)

3. 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 경우가 있습니다. 이러한 증상이 지속되거나 심해지는 경우는 복용을 중지하고 이 설명서를 가지고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

물은 변, 설사

4. 1개월 정도 복용해도 증상이 개선되지 않는 경우는 복용을 중지하고 이 설명서를 가지고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

문의처

이 제제에 관하여 궁금하신 점이 있으시다면 구매하신 가게 혹은 아래 연락처로 문의해 주시기 바랍니다.

판매원

연락처 다이호 약품 공업 주식회사 고객센터
 우편번호 101-8444 도쿄도 치요다구 간다니시키초 1-27
 전화번호 0120-4527-66
 접수시간 9:00 ~ 17:00 (토, 일, 공휴일 제외)
 홈페이지 <https://www.taiho.co.jp/>
 제조 판매원
 주식회사 타테바야시 쇼카쿠도