

카테고리2 의약품

특징

●간 기능을 개선시키는 약

간 기능을 개선하는 생약, 담즙 분비를 촉진하는 생약, 양쪽의 기능을 모두 가지는 생약 등 12종류의 생약으로 만들어진 간생은 독자적인 처방전에 따라 조제된 생약 제제입니다.

건강 검진 등에서 가벼운 간기능 이상 소견을 받은 분께 권장합니다.



성분 및 부량

이 약의 3포(6g) 중 아래 생약으로 조제한 간생 건조 추출물 2g
을 함유하고 있습니다.

상세 정보

판매원	다이호 약품공업 주식회사		
제조 판매원	주식회사 타테바야시 쇼카쿠도		
제형	과립제		
포장 단위	2gx1포	2gx21포	2gx60포
제조업체 권장 소매 가격	253 엔 (세금 별도230 엔)	3,163 엔 (세금 별도2,875 엔)	7,590 엔 (세금 별도6,900 엔)
JAN 코드	49684360	4987117219104	4987117219005
사용 기한	5년		

산조인	...1.46g	인삼	...1.46g
산치자	...1.46g	차전자	...1.46g
상백피	...1.46g	지실	...1.46g
축사	...1.46g	계피	...0.37g
대황	...0.37g	오매	...1.46g
굴피	...1.46g	애엽	...1.46g

첨가물로서 유당 및 카복시메틸셀룰로오스나트륨을 함유하고 있습니다.

(성분 및 분량에 관한 주의사항)

이 약은 생약을 원료로 제조하였으므로 제품의 색과 맛 등에 다소 차이가 발생할 수 있으나, 품질에는 이상 없습니다.

효능 및 효과

간 기능 장애, 간비대, 급성·만성 간염, 황달, 담낭(쓸개)염

용법 및 용량

는 따뜻한 물과 함께 복용합니다.

연령	1회 기준량	1일 복용 횟수
성인(15세 이상)	1포(2g)	3회
15세 미만	복용하지 마십시오.	

식간이란 식사와 식사 사이를 의미하는 것으로 식후 2~3시간을 가리킵니다.

사용상의 주의사항

금기

(지키지 않으면 현재 증상이 악화되거나 부작용이 발생하기 쉬워집니다.)

수유 중인 사람은 이 약을 복용하지 않거나, 이 약을 복용하는 경우는 수유를 중단하십시오.

신중투여

1. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 사람
 - (2) 임산부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 사람
 - (3) 몸이 허약한 사람(체력이 떨어진 사람, 몸이 약한 사람)
 - (4) 위장이 약해 설사를 자주 하는 사람
 - (5) 지금까지 약 등으로 인해 발진·발적, 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람
 - (6) 다음과 같은 의약품을 복용하고 있는 사람
- 설사약

2. 복용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중지하고 이 설명서를 가지고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

관련 부위	증상
피부	발진 · 발적, 가려움증
소화기	심한 복통을 수반하는 설사, 복통

*간혹 다음과 같은 위독한 증상이 발생할 수 있습니다. 그 경우에는 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.

증상의 명칭	증상
장간막 정맥경화증	장기 복용에 의해 복통, 설사, 변비, 복부팽만 등이 반복하여 나타난다.

3. 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 경우가 있습니다. 이러한 증상이 지속되거나 심해지는 경우는 복용을 중지하고 이 설명서를 가지고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

뭉은 변, 설사

4. 1개월 정도 복용해도 증상이 개선되지 않는 경우는 복용을 중지하고 이 설명서를 가지고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

5. 장기간 연속 복용하는 경우에는 의사, 약사 또는 등록판매자와 상의하십시오.

문의처

이 제제에 관하여 궁금하신 점이 있으시다면 구매하신 가게 혹은 아래 연락처로 문의해 주시기 바랍니다.

판매원

연락처 다이호 약품 공업 주식회사 고객상담실

우편번호 101-8444 도쿄도 치요다구 간다니시키토 1-27

전화번호 0120-4527-66

접수시간 9:00 ~ 17:00 (토, 일, 공휴일 제외)

홈페이지 <https://www.taiho.co.jp/>

제조 판매원

주식회사 타테바야시 쇼카쿠도