

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|---------------|--|--|----|-----|--|--|-------|-----|--|--|---------------|------------------------|--|--|--------|----------|--|--|-------|----|--|--|
| 명칭 PITAS Throat Troche L (Lychee Flavor) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 위험 카테고리 의약외품 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 특징 목이 아프거나, 부었을 때 잘 들으며, 말할 때도 사용할 수 있는 점착성 트로키입니다. · 물 없이 복용할 수 있으므로, 회의 중에도 사용 가능 · 졸리는 성분이 들어있지 않으므로, 일하는 중에도 사용 가능 · 슬림한 형태이므로 지갑 등에 넣어서 휴대 가능 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 성분 · 함량 성분 함량(6개 중) 세틸피리디늄염화물수화물 8.28mg [첨가물] 하이드록시프로필셀룰로오스, 수크랄로스, 포비돈, 풀루란, 마크로글, I-멘톨, 탄닌산, D-솔비톨, 사카린 나트륨, 자당지방산에스터, 안식향산 벤질, 바닐린, 향료, 적색 102호, 황색 5호 | 상세 정보 <table border="1"> <tr> <td>판매제조원</td><td colspan="3">다이호 약품공업 주식회사</td></tr> <tr> <td>제형</td><td colspan="3">트로키</td></tr> <tr> <td>포장 단위</td><td>12개</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>제조업체 권장 소매 가격</td><td>633 엔 (세금 별도 575 엔)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>JAN 코드</td><td>45209611</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>유통 기한</td><td colspan="3">3년</td></tr> </table> | 판매제조원 | 다이호 약품공업 주식회사 | | | 제형 | 트로키 | | | 포장 단위 | 12개 | | | 제조업체 권장 소매 가격 | 633 엔 (세금 별도 575 엔) | | | JAN 코드 | 45209611 | | | 유통 기한 | 3년 | | |
| 판매제조원 | 다이호 약품공업 주식회사 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 제형 | 트로키 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 포장 단위 | 12개 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 제조업체 권장 소매 가격 | 633 엔 (세금 별도 575 엔) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAN 코드 | 45209611 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 유통 기한 | 3년 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 효능 · 효과 목의 염증에 의한 목의 통증, 목의 부기, 목의 따끔거림, 목의 불쾌감, 목이 쉼 구강 내의 살균 · 소독 구취 제거 | 용법 · 용량 다음 용량을 입 안에 넣고, 씹지 말고 천천히 녹여서 사용할 것. 성인(15세 이상) 1회 용량 1개 1일 사용 횟수 4~6회 15세 미만은 사용하지 말 것. <용법 · 용량 관련 주의사항> (1) 규정된 용량과 용법을 준수할 것. (2) 씹거나 삼키지 말 것. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사용상의 주의사항 상담이 필요한 경우 1. 다음 사람은 사용 전에 의사, 치과의사 또는 약사와 상담하십시오. ① 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람. ② 임산부 또는 임신 중으로 추정되는 사람. ③ 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람. ④ 약에 의해 알레르기 증상이 나타난 적이 있는 사람. 2. 다음 경우는, 즉시 사용을 중지하고, 이 설명서를 가지고 의사, 치과의사 또는 약사와 상담할 것 ① 사용 후, 다음 증상이 나타난 경우. 피부: 발진, 발적, 가려움 ② 1주일 정도 사용해도 증상이 개선되지 않는 경우. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

문의처

이 제제에 관하여 궁금하신 점이 있으시다면 구매하신 가게 혹은 아래 연락처로 문의해주시기 바랍니다.

판매원 연락처 다이호 약품 공업 주식회사 고객상담실
우편번호 101-8444 도쿄도 치요다구 간다니시키초 1-27
전화번호 0120-4527-66
접수시간 9:00 ~ 17:00 (토, 일, 공휴일 제외)
홈페이지 <https://www.taiho.co.jp/>