

명칭 Solmack EX2				
위험 카테고리 카테고리2 의약품				
특징 ●생약 배합 위장약 9종류의 생약 성분 효과 (연명초, 감초, 용담초, 황련, 계피, 강황, 정향, 인삼, 창출)+카르니틴 염화물 강황과 인삼을 배합하여 과식, 과음, 더부룩함, 식욕부진(식욕감퇴), 소화불량에 효과가 있는 의약품입니다.				
성분 및 분량 -1병(50mL) 중- () 안은 원생약 환산치		상세 정보		
연명초 추출물	30mg	(201mg)	제조 판매원	다이호약품공업 주식회사
강황 유동엑스제	0.3mL	(300mg)	제형	액상
감초 추출물	115mg	(1644.5mg)	포장 단위	50mLx1병 50mLx8병
정향 톱크제	0.126mL	(37.8mg)	제조업체 권장 소매 가격	638 엔 (세금 별도 580엔) 5,104 엔 (세금 별도 4,640엔)
용담초 톱크제	0.376mL	(112.8mg)	JAN 코드	45144639 4987117397895
인삼 유동엑스제	0.5mL	(500mg)	사용 기한	3년
황련 톱크제	0.792mL	(237.6mg)	용법 및 용량 성인(15세 이상) 1일 1회 1병(50mL)을 복용하십시오. ●소아(15세 미만)는 복용하지 마십시오. ●용법과 용량을 반드시 지켜 주십시오.	
창출 유동엑스제	1.2mL	(1200mg)		
계피 톱크제	0.25mL	(75mg)		
카르니틴 염화물	120mg			
첨가물: 백설탕, 벌꿀, 알코올, 프로필렌글리콜, 아라비 아고무, 에데테이트이나트륨칼슘, L멘톨, 벤조산나트륨, pH 조절제, 향료 (알코올 1.5mL 이하) ●생약 성분을 함유하고 있으므로 침전물이 생길 수 있습니다. 잘 흔들어 복용하십시오.				
효능 및 효과 과식, 과음, 더부룩함, 구역질(숙취, 음주 후 메스꺼림, 메스꺼림, 위의 메스꺼림, 욕지기, 오심), 구토, 위가 약함, 식욕부진(식욕감퇴), 위·복부 팽만감, 소화불량, 속쓰림, 체증				
사용상의 주의사항 금기 (지키지 않으면 현재 증상이 악화되거나 부작용이 발생하기 쉬워집니다) ●장기간 연속해서 복용하지 마십시오.				

신중투여

1. 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 사람
- (2) 고령자
- (3) 부종이 있는 사람
- (4) 고혈압, 신장병, 심장병의 진단을 받은 사람

2. 복용 후 간혹 아래와 같은 심각한 증상이 발생하는 경우가 있습니다. 그러한 경우는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중지하고 이 제품을 가지고 의사의 진찰을 받으십시오.

가성 알도스테론증, 근육병(손발의 나른함, 저림, 당기는 느낌이나 경직되는 느낌에 추가적으로 무력감과 근육통이 나타나며 서서히 증상이 심해진다.)

3. 5~6일간 복용해도 증상이 개선되지 않는 경우는 복용을 중지하고 이 제품을 가지고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

문의처

이 제제에 관하여 궁금하신 점이 있으시다면 구매하신 가게 혹은 아래 연락처로 문의해 주시기 바랍니다.

다이호 약품 공업 주식회사 고객상담실

우편번호 101-8444 도쿄도 치요다구 간다니시키초 1-27

전화번호 0120-4527-66

접수시간 9:00 ~ 17:00 (토, 일, 공휴일 제외)

홈페이지 <https://www.taiho.co.jp/>