

Urepearl Plus Cream															
위험 카테고리 카테고리2 의약품 특징 ●건조성 피부 치료제 - 보습 성분으로서 천연 보습 인자인 요소와 비타민 E(조산토코페롤)가 건조한 피부에 수분을 유지하게 하여 촉촉하고 부드럽게 가꾸어 줍니다. - 가려움증을 억제하는 성분으로서 3종류의 성분을 배합하였습니다. - 피부에 잘 흡수되고 끈적이지 않는 크림 타입입니다.															
성분 및 분량 [성분] 100g 중에 아래와 같은 성분을 함유하고 있는 크림 타입입니다. 요소 10.0g, 염산디펜히드라민 1.0g, d-캄파 1.0g, 리도카인 2.0g, 토코페롤아세테이트 0.3g 첨가물로서 메틸파라벤, 디부틸히드록시톨루엔, 트리아소옥탄산 글리세린, 옥틸도데실미리스테이트, 콜레스테롤, 메틸폴리시록산, 스테아릴알코올, 세탄올, 베헤닐알코올, 글리세릴스테아레이트, 소르비탄스테아레이트, 폴리옥시에틸렌베헤닐에테르, 마크로글스테아레이트, 폴리옥시에틸렌세틸에테르 인산나트륨, 글리신, DL-알라닌, 염화나트륨, 글리세린, 락트산나트륨, 락트산, 정제수를 함유하고 있습니다.	상세 정보 <table> <tr> <td>판매원</td><td>다이호 약품공업 주식회사</td></tr> <tr> <td>제조 판매원</td><td>주식회사 오오츠카 제약 공장</td></tr> <tr> <td>제형</td><td>크림</td></tr> <tr> <td>포장 단위</td><td>80 g</td></tr> <tr> <td>제조업체 권장 소매 가격</td><td>2,240 엔 (세금 별도1,840 엔)</td></tr> <tr> <td>JAN 코드</td><td>4987117140132</td></tr> <tr> <td>사용 기한</td><td>3년</td></tr> </table> 용법 및 용량 1일 1회~수 회 적당량을 환부에 바릅니다. [용법 및 용량에 관한 주의사항] (1) 눈에 들어가지 않도록 주의하십시오. 만일 눈에 들어간 경우에는 바로 찬물 또는 미지근한 물로 씻어내십시오. 증상이 심한 경우에는 안과 의사의 진찰을 받으십시오. (2) 소아가 사용하는 경우는 보호자의 지도 감독 하에 사용하게 하십시오. (3) 이 약은 외용으로만 사용하십시오. (4) 환부와 환부 주변을 깨끗이 한 후에 사용하십시오. (5) 규정된 용법과 용량을 지켜 주십시오. (6) 화장품이 아니므로 효능 및 효과에서 규정된 환부에만 사용하고 기초 화장 등의 목적으로 얼굴에는 사용하지 마십시오.	판매원	다이호 약품공업 주식회사	제조 판매원	주식회사 오오츠카 제약 공장	제형	크림	포장 단위	80 g	제조업체 권장 소매 가격	2,240 엔 (세금 별도1,840 엔)	JAN 코드	4987117140132	사용 기한	3년
판매원	다이호 약품공업 주식회사														
제조 판매원	주식회사 오오츠카 제약 공장														
제형	크림														
포장 단위	80 g														
제조업체 권장 소매 가격	2,240 엔 (세금 별도1,840 엔)														
JAN 코드	4987117140132														
사용 기한	3년														
효능 및 효과 가려움증을 수반하는 건조성 피부(노인 및 성인의 건피증, 소아의 건조성 피부)															
사용상의 주의사항 금기 (지키지 않으면 현재 증상이 악화되거나 부작용이 발생하기 쉬워진다) 다음 부위에는 사용하지 마십시오. (1) 눈 주변, 점막(예를 들어 구강, 비강, 질 등) 등 (2) 염증 또는 상처가 있는 환부 (3) 진무른 곳이나 손 등의 피부가 터서 갈라진 환부															

신중투여

1. 다음에 해당하는 사람은 사용 전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.

(1) 의사의 치료를 받고 있는 사람

(2) 약 등으로 인해 알레르기 증상(예를 들어 발진·발적, 가려움증, 짓무름 등)

또는 자극 증상을 일으킨 적이 있는 사람

2. 사용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 사용을 중지하고 이 첨부 문서를 가지고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

관련 부위

증상

피부

지트무름, 발진·발적, 가려움증, 자극감(통증, 열감, 따끔거림), 부종(부기), 부스럼이나 딱지처럼 피부가 벗겨진 상태

3. 2주간 사용해도 증상이 개선되지 않는 경우는 사용을 중지하고 이 첨부 문서를 가지고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

문의처

이 제제에 관하여 궁금하신 점이 있으시다면 구매하신 가게 혹은 아래 연락처로 문의해 주시기 바랍니다.

판매원

다이호 약품 공업 주식회사 고객상담실

우편번호 101-8444 도쿄도 치요다구 간다니시키초 1-27

전화번호 0120-4527-66

접수시간 9:00 ~ 17:00 (토, 일, 공휴일 제외)

홈페이지 <https://www.taiho.co.jp/>